

## **PASIENTKORT**

Dabigatran etexilate Sandoz kapsler  
dabigatraneteksilat

- Du/omsorgspersonen må alltid ha med dette kortet
- Forsikre deg om at du bruker nyeste versjon

### **Kjære pasient/omsorgsperson for et barn**

Din/barnets lege har startet behandling med Dabigatran etexilate Sandoz. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye slik at du bruker Dabigatran etexilate Sandoz på en sikker måte. Da dette pasientkortet inneholder viktig informasjon om din/barnets behandling, er det viktig at du/barnet alltid har kortet med for å informere helsepersonell om at du/barnet bruker Dabigatran etexilate Sandoz.

### **Informasjon om Dabigatran etexilate Sandoz til pasienter/omsorgspersoner for barn**

Om din/barnets behandling

- Dabigatran etexilate Sandoz fortynner blodet. Det brukes til å behandle eksisterende blodpropper eller forhindre dannelsen av farlige blodpropper.
- Bruk alltid Dabigatran etexilate Sandoz nøyaktig slik din/barnets lege har forklart deg. Du må aldri hoppe over en dose eller avbryte behandling med Dabigatran etexilate Sandoz uten først å rådføre deg med din/barnets lege.
- Informer din/barnets lege om alle andre legemidler du/barnet bruker.
- Informer din/barnets lege om at du bruker Dabigatran etexilate Sandoz før eventuelle kirurgiske inngrep/invasive prosedyrer.
- Dabigatran etexilate Sandoz kapsler kan tas med eller uten mat. Kapslene skal svelges hele med et glass vann. Kapselen må ikke knuses eller tygges, og innholdet må ikke tømmes ut av kapselen.

Når skal du søke medisinsk hjelp

- Inntak av Dabigatran etexilate Sandoz kan øke blødningsrisikoen. Snakk med din/barnets lege umiddelbart hvis du/barnet opplever tegn og symptomer på blødning, for eksempel: hevelse, ubehag, uvanlig smerte eller hodepine, svimmelhet, blekhet, svakhet, uvanlig dannelse av blåmerker, neseblødning, blødning i tannkjøtt, uvanlig langvarig blødning fra kutt, unormal menstruasjonsblødning eller vaginal blødning, blod i urinen som kan være rosa eller brunt, rød/sort avføring, opphosting av blod, oppkast av blod eller kaffegrutlignende stoff.
- Ved fall eller skader, spesielt slag mot hodet, må det umiddelbart søkes legehjelp.
- Du må ikke avbryte behandling med Dabigatran etexilate Sandoz uten først å rådføre deg med din/barnets lege hvis du/barnet opplever halsbrann, kvalme, oppkast, ubehag i magen, er oppblåst eller får smerter i øvre mageregion.

### **Informasjon om Dabigatran etexilate Sandoz til helsepersonell**

- Dabigatran etexilate Sandoz er et oralt antikoagulantium (direkte trombinhemmer).
- Dabigatran etexilate Sandoz må kanskje seponeres før kirurgiske inngrep eller andre invasive prosedyrer.
- Ved større blødninger må Dabigatran etexilate Sandoz seponeres umiddelbart.
- Et spesifikt reverserende middel (idarusizumab) er tilgjengelig for voksne pasienter. Effekt og sikkerhet av det reverserende midlet idarusizumab har ikke blitt fastslått hos barn. Se preparatomtalene for Dabigatran etexilate Sandoz og idarusizumab for detaljer og flere råd for å motvirke den koagulasjonshemmende virkningen av Dabigatran etexilate Sandoz.
- Dabigatran etexilate Sandoz skilles hovedsakelig ut gjennom nyrene, adekvat diurese må opprettholdes. Dabigatran etexilate Sandoz kan fjernes ved dialyse.

**Fyll ut informasjonen nedenfor eller be din/barnets lege om å gjøre det.**

08.09.2023

## **Pasientinformasjon**

---

Pasientens navn

---

Fødselsdato

---

Indikasjon for blodfortynning

---

Dose av Dabigatran etexilate Sandoz

09/2023