

VEILEDER FOR PASIENTER OG/ELLER OMSORGSPERONER

DENNE BROSJYREN ER KUN MENT SOM EN VEILEDER. FØR BRUK AV SULIQUA, MÅ DU HA FÅTT OPPLÆRING I BRUK AV SULIQUA SOLOSTAR PENN AV KVALIFISERT HELSEPERSONELL OG FØR DU BRUKER PENNEN MÅ DU LESE NØYE GJENNOM PAKNINGSVEDLEGGET OG INSTRUKSJONENE SOM MEDFØLGER.

Behold denne brosjyren. Du kan få behov for å se på det igjen.

Skriv navnet ditt på denne brosjyren: _____

SULIQUA ferdigfylte pennner avgir insulin glargin og lixisenatid i én enkel, daglig injeksjon.

SULIQUA er tilgjengelig som 2 ferdigfylte pennner inneholdende 2 ulike styrker av lixisenatid, og ulikt doseområde av insulin glargin 100 enheter/ml. Ditt helsepersonell har foreskrevet pennnen som er riktig for ditt insulinbehov.

SULIQUA 10-40 PENN

SULIQUA 100 ENHETER/ml + 50 MIKROGRAM/ml
INJEKSJONSVÆSKE, OPPLØSNING I FERDIGFYLT
PENN



SULIQUA 30-60 PENN

SULIQUA 100 ENHETER/ml + 33 MIKROGRAM/ml
INJEKSJONSVÆSKE, OPPLØSNING I FERDIGFYLT
PENN



- Begge ferdigfylte pennner inneholder insulin glargin i en styrke på 100 enheter/ml.
- SULIQUA (10-40) pennnen skal brukes til å avgi én daglig injeksjon på doser mellom 10 og 40 dosetrinn (styrke:100 enheter/ml insulin glargin og 50 mikrog/ml lixisenatid; doseområde: 10 til 40 enheter av insulin glargin i kombinasjon med 5 til 20 mikrog lixisenatid). Denne pennnen er ferskenfarget med en oransje injeksjonsknapp
- SULIQUA (30-60) pennnen skal brukes til å avgi én daglig injeksjon på doser mellom 30 og 60 dosetrinn (styrke:100 enheter/ml insulin glargin og 33 mikrog/ml lixisenatid; doseområde: 30 til 60 enheter av insulin glargin i kombinasjon med 10 til 20 mikrog lixisenatid). Denne pennnen er olivenfarget med en brun injeksjonsknapp.
- Resepten skal angi hvilken ferdigfylt penn du trenger (SULIQUA [10-40] pennnen eller SULIQUA [30-60] pennnen) og antall dosetrinn som skal injiseres.
- Din farmasøyt må avklare med legen din dersom resepten er ufullstendig.
- Ett dosetrinn inneholder én enhet med insulin glargin 100 enheter/ml pluss én korresponderende mengde av lixisenatid. Før bruk av SULIQUA, må det være klart hvor mange dosetrinn du skal ha.
- Doseangiveren til de ferdigfylte pennene viser antall dosetrinn som skal injiseres.



VEILEDER FOR PASIENTER OG/ELLER PÅRØRENDE

MERK DEG:

- SULIQUA leveres i én ferdigfylt penn og må kun brukes med denne enheten. Pasienter, omsorgspersoner og helsepersonell må aldri bruke en sprøyte for å trekke opp SULIQUA fra en ferdigfylt penn ellers kan feildosering og alvorlig skade oppstå. Det må alltid settes på en ny kanyle før hvert bruk. Kanyles må ikke brukes om igjen.
- SULIQUA inneholder ett doseringstrinn alltid én enhet insulin glargin 100 enheter/ml, uavhengig av hvilken SULIQUA ferdigfylt penn som brukes (SULIQUA [10-40] pennen eller SULIQUA [30-60] pennen).
- Ditt helsepersonell kan forklare designet og funksjonene til din SULIQUA SoloStar penn, inkludert hvordan doseangiveren i den ferdigfylte pennen viser antall dosetrinn som skal injiseres.
- Under bytte til denne type kombinasjonsmedisin og i ukene etter byttet, bør du måle blodsukkernivået ditt oftere.
- Hvis du har spørsmål om behandlingen, snakk med ditt helsepersonell.

FØR INJEKSJON AV SULIQUA



Les instruksjonene og pasientinformasjonen som følger pakningsvedlegget nøye før bruk.



Les instruksjonene og pasientinformasjonen som følger pakningsvedlegget nøye før bruk.

Hvis du opplever bivirkninger, snakk med din lege eller farmasøyt. Dette inkluderer mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Du kan også rapportere bivirkninger til Sanofi via telefon 469 18 001 (kl 10-14) eller via e-post medinfo-norge@sanofi.com. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

sanofi

sanofi-aventis Norge AS
Postboks 133, 1325
Lysaker Tlf: 67107100