

IV-jern

brukes til å behandle jernmangel når preparater til å ta gjennom munnen ikke kan brukes.

IV-jern

kan forårsake allergiske reaksjoner og må gis av personer som er opplært til å vurdere og håndtere slike reaksjoner.

Enkelte pasienter kan få alvorlige eller livstruende allergiske reaksjoner (anafylaktiske reaksjoner), som kan forårsake problemer med hjerte og blodtrykk og/eller gjøre at du besvimer eller mister bevisstheten.

Rapportering av bivirkninger

Dersom du opplever bivirkninger, må du snakke med lege eller sykepleier.

Det gjelder også for andre bivirkninger enn de som står oppført i denne brosjyren eller i pakningsvedlegget.

Det er også mulig å rapportere om bivirkninger direkte til: Direktoratet for medisinske produkter www.dmp.no



Intravenøst (IV) jernpreparat

VIKTIG INFORMASJON TIL PASIENTER

Mulig risiko for alvorlige allergiske reaksjoner ved bruk av IV-jern (medisinsk behandling gitt via nål gjennom vene)

Denne informasjonen er lagd av produsentene av IV-jern i Europa.

Vennligst les denne brosjyren nøye og diskuter eventuelle spørsmål med din lege.

Du kan ha en økt risiko for å få en allergisk reaksjon hvis du har:

- kjente allergier, inkludert medikamentallergier
- medisinsk historie med alvorlig astma, eksem eller andre allergier (for eksempel støv, pollen, dyrehår)
eller
- immun- eller betennelsestilstander (f.eks. revmatoid artritt, lupus erythematosus og andre)

Dersom du har noen av disse allergiene eller plagene, **må du informere legen din før du eventuelt blir gitt IV-jern.**

Det vil være opp til legen din å vurdere om fordelene anses for å veie opp for den potensielle risikoen.

Du bør ikke gis IV-jern dersom:

- du er allergisk (overfølsom) overfor produktet eller et av de andre innholdstoffene i dette legemidlet
- du har opplevd alvorlige allergiske (overfølsomhet) reaksjoner på andre behandlinger med IV-jern tidligere*
- du har jernoverskudd (for mye jern i kroppen)
- anemien ikke er forårsaket av jernmangel

Dersom du har noen av disse allergiene eller plagene, **må du informere legen din før du eventuelt blir gitt IV-jern.**

* **Det er viktig at du er klar over at en reaksjon kan oppstå selv om du ikke har hatt noen problemer med IV-jern tidligere.**

Graviditet:

IV-jern bør ikke brukes under graviditet med mindre det er helt nødvendig. Hvis du er gravid eller tror at du kan være gravid, er det viktig at du tar dette opp med legen din.

Du bør ta umiddelbar kontakt med lege eller sykepleier dersom:

- du viser tegn eller symptomer på en allergisk reaksjon under eller kort tid etter å ha startet behandling med IV-jern

For eksempel: elveblest eller utslett, kløe, svimmelhet, ørhet, hevelse i lepper, tunge, hals eller kropp, pustevansker, kortpustethet eller tungpustethet.

Legen din vil overvåke deg for tegn og symptomer på en allergisk reaksjon i minst 30 minutter etter injisering, hver gang du blir gitt IV-jern.