


Legens referansesjekkliste for dosering og biologisk monitorering ved deferasiroks-behandling

Dette dokumentet fremhever viktig informasjon om dosering og behov for dosejustering og biologisk monitorering ved Exjadebehandling. Det vises til Exjade SmPC for fullstendig informasjon om dosering, dosejustering og biologisk monitorering. Den er tilgjengelig på www.legemiddelsok.no eller på www.felleskatalogen.no.



* Ytterligere eksempler på beregning av dose og dosejustering gis i produktinformasjonen. Merknad: Et bytte fra deferasiroks DT til Exjade filmdrasjerte tabletter krever en dosejustering. Som referert i preparatomtalen (SPC): På grunn av ulike farmakokinetiske profiler er det nødvendig med en 30 % lavere dose av EX-JADE filmdrasjerte tabletter sammenlignet med anbefalt dose for deferasiroks dispergerbare tabletter.

** Dosereduksjon kan vurderes

§ Se produktinformasjonen for anbefalinger om andre dosejusteringer/behandlingsavbrudd ved nyre- og leveravvik, metabolsk acidose, SCARs (alvorlige hudbivirkninger), hypersensitivitetsreaksjoner.

LIC = jernkonsentrasjon i lever (Liver Iron Concentration), LLN = nedre grense av normalområdet (Lower Limit of Normal), DT = dispergbare tabletter