

Pasientkort

Side 1 (front)

For behandling av pulmonal arteriell hypertensjon

Dette kortet inneholder viktig sikkerhetsinformasjon som du må kjenne til når du behandles med Opsumit. Ha alltid dette kortet med deg, og vis det til alle leger som er involvert i din behandling.

Opsumit 10 mg
macitentan
filmdrasjerte tabletter

NO

Side 2

Det er viktig at du umiddelbart rapporterer til forskrivende lege graviditet eller eventuelle bivirkninger som kan forekomme under behandling med Opsumit.

Behandlingssenter: _____

Forskrivende leges navn: _____

Forskrivende leges telefonnummer: _____

Side 3 (innside, venstre)

Graviditet

Opsumit kan skade et foster under utvikling. Du skal derfor ikke ta Opsumit dersom du er gravid, og du må heller ikke bli gravid mens du tar Opsumit. Dersom du lider av pulmonal arteriell hypertensjon, kan dessuten graviditet gjøre sykdomssymptomene mye verre.

Prevensjon

Du må bruke en sikker form for prevensjon mens du tar Opsumit. Ta opp alle spørsmål du måtte ha, med legen din.

Side 4 (innside, midten)

Du må ta en graviditetstest før behandlingen med Opsumit igangsettes og månedlig under behandlingen, også om du tror du ikke er gravid.

I likhet med andre legemidler fra denne klassen, kan Opsumit påvirke leveren. Legen din vil ta en blodprøve før du starter behandlingen med Opsumit og under behandlingen for å undersøke om leveren din fungerer skikkelig.

Side 5 (innside, høyre)

Tegn på at leveren din ikke fungerer skikkelig, omfatter:

- kvalme
- oppkast
- feber
- smerter i magen (buken)
- gulsott (gulfarging av huden eller det hvite i øynene)
- mørk urin
- kløe i huden
- uvanlig tretthet eller utmattelse
- influensalignende syndrom (ledd- og muskelsmerter med feber)

Informér legen din umiddelbart dersom du oppdager noen av disse tegnene. Kontakt lege eller apotek dersom du har spørsmål om behandlingen.