

- Vis dette kortet til alle leger som behandler deg, ikke bare til nevrologen. **4**
- Les pakningsvedlegget for TYSABRI nøye før du begynner å bruke dette legemidlet.
- Behold dette kortet under behandlingen med TYSABRI og i 6 måneder etter siste dose med TYSABRI, fordi bivirkninger kan oppstå også etter at du har avsluttet behandlingen med TYSABRI.
- Vis dette kortet til din partner eller dine omsorgspersoner. Det kan hende de ser symptomer på PML som du selv ikke legger merke til, f.eks. endringer i humør eller atferd, hukommelsessvikt eller vanskeligheter med å snakke og kommunisere. Du bør være oppmerksom på symptomer som kan oppstå i opptil 6 måneder etter at behandlingen med TYSABRI er avsluttet.

Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Bivirkninger kan også meldes på elektronisk skjema til Direktoratet for medisinske produkter: [www.dmp.no/pasientmelding](http://www.dmp.no/pasientmelding). Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.



Versjon 16, april 2024

Biogen-168185

## Pasientkort

Dette pasientkortet inneholder viktig sikkerhetsinformasjon som du må være oppmerksom på før du får behandling med TYSABRI, under behandlingen og etter at behandlingen er avsluttet.



## Før behandling med TYSABRI

- Du skal ikke behandles med TYSABRI dersom du har alvorlige problemer med immunforsvaret.
- Du skal ikke få langvarig behandling med andre legemidler for multippel sklerose mens du får TYSABRI.

## Under behandling med TYSABRI

### Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)

Det har forekommet tilfeller av en sjelden hjerneinfeksjon som kalles PML (progressiv multifokal leukoencefalopati) hos pasienter som har fått TYSABRI. PML fører vanligvis til alvorlig uførhet eller død. Risiko for PML ser ut til å øke jo lenger du får behandling, særlig hvis du har fått behandling i mer enn 2 år.

1

Symptomene på PML kan ligne et MS-anfall. Det er derfor veldig viktig at du kontakter legen din så snart som mulig hvis du tror at MS-sykdommen din blir verre eller hvis du legger merke til nye symptomer mens du får behandling med TYSABRI og i opptil 6 måneder etter at behandlingen er avsluttet.

PML-symptomer oppstår gjerne langsommere (i løpet av noen dager eller uker) enn symptomene som er forbundet med et MS-anfall, og de kan ligne MS-symptomene.

Tegn kan være:

- endring i mental tilstand og konsentrasjonsevne
- endringer i atferd
- svekkelse i den ene siden av kroppen
- synsproblemer
- nye neurologiske symptomer som er uvanlige for deg.

2

Hvis det oppstår PML må behandlingen med TYSABRI stoppes umiddelbart.

### Alvorlige infeksjoner

Andre alvorlige infeksjoner kan oppstå ved bruk av TYSABRI. Kontakt lege så snart som mulig dersom du tror du har en alvorlig og vedvarende infeksjon, for eksempel vedvarende feber.

Pasientens navn: \_\_\_\_\_

Legens navn: \_\_\_\_\_

Legens telefonnummer: \_\_\_\_\_

Dato for oppstart av TYSABRI: \_\_\_\_\_

3