

Prevensjon

Bruker du prevensjonsmidler nå?

Ja Nei

Hvis ja, skriv navnet på dem her: _____

Ta dette kortet med neste gang du skal til legen/gynekologen din. Da kan han/hun gi deg råd om hvorvidt du trenger flere eller alternative sikre prevensjonsmetoder.

accord

Viktige sikkerhetsadvarsler for pasienter som bruker Bosentan Accord (bosentan)

Dette pasientkortet inneholder viktig informasjon om Bosentan Accord. Les dette kortet nøye før du starter behandlingen med Bosentan Accord.

Navn: _____

Behandlerende lege: _____

Spør legen din hvis du har spørsmål om Bosentan Accord.

Accord Healthcare Ltd
INL080 10 00000 0 000000

accord

Les denne siden nøye hvis du er en kvinne i fruktbar alder

Graviditet

Bosentan Accord kan skade fosterets utvikling. Derfor må du ikke ta Bosentan Accord hvis du er gravid. Du må heller ikke bli gravid mens du tar Bosentan Accord. En graviditet kan føre til alvorlig forverring i tilstanden din hvis du lider av lungearteriehypertensjon. Informer legen eller gynekologen din hvis du mistenker at du er gravid.

Prevensjon

Prevensjon basert på hormoner – som oralprevensjon eller p-piller, hormoninjeksjoner (p-spreyter), implantater eller p-plaster er ikke sikre nok til å forhindre graviditet hos kvinner som bruker Bosentan Accord. Du må bruke en barrieremetode som prevensjonsmiddel – som kondom, pessar eller p-pute – i tillegg til noen av disse hormonelle prevensjonsmidlene. Sørg for at du tar opp alt du måtte lure på med legen eller gynekologen – fyll ut detaljene på baksiden av dette kortet og ta det med neste gang du skal til legen eller gynekologen.

Du bør ta en graviditetstest før du starter behandling med Bosentan Accord, og hver måned under behandlingen selv om du ikke tror at du er gravid

Dato for første månedlige test: _____

Blodprøve for leverfunksjon

Noen pasienter som bruker Bosentan Accord får unormale leverfunksjonsverdier. Legen din vil sørge for regelmessige blodprøver under behandlingen med Bosentan Accord for å kontrollere om det er endringer i leverfunksjonen.

Husk å gjennomføre leverfunksjonsblodprøven hver måned. Etter en doseøkning vil det bli tatt en ny prøve etter to uker.

Dato for første månedlige prøve: _____

Oversikt over de månedlige leverfunksjonsblodprøvene:

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Jan | <input type="checkbox"/> Mai | <input type="checkbox"/> Sep |
| <input type="checkbox"/> Feb | <input type="checkbox"/> Jun | <input type="checkbox"/> Okt |
| <input type="checkbox"/> Mar | <input type="checkbox"/> Jul | <input type="checkbox"/> Nov |
| <input type="checkbox"/> Apr | <input type="checkbox"/> Aug | <input type="checkbox"/> Des |

accord