


Legens referansesjekkliste for dosering og biologisk monitorering ved deferasiroks-behandling

Dette dokumentet fremhever viktig informasjon om dosering og behov for dosejustering og biologisk monitorering ved Exjadebehandling. Se oppdatert preparatomtale (SPC) og opplæringsmateriell på www.felleskatalogen.no.



* Ytterligere eksempler på beregning av dose og dosejustering gis i produktinformasjonen. Merknad: Et bytte fra deferasiroks DT til Exjade filmdrasjerte tabletter krever en dosejustering. Som referert i preparatomtalen (SPC): På grunn av ulike farmakokinetiske profiler er det nødvendig med en 30 % lavere dose av EX-JADE filmdrasjerte tabletter sammenlignet med anbefalt dose for deferasiroks dispergerbare tabletter.

** Dosereduksjon kan vurderes

§ Se produktinformasjonen for anbefalinger om andre dosejusteringer/behandlingsavbrudd ved nyre- og leveravvik, metabolsk acidose, SCARs (alvorlige hudbivirkninger), hypersensitivitetsreaksjoner.

LIC = jernkonsentrasjon i lever (Liver Iron Concentration), LLN = nedre grense av normalområdet (Lower Limit of Normal), DT = dispergbare tabletter