

PASIENTKORT

<p>((Back cover))</p> <p>GRAVIDITET, FERTILITET, AMMING</p> <p>Ta ikke Ferriprox hvis du er gravid, prøver å bli gravid eller ammer. Ferriprox kan forårsake alvorlige skader på spedbarnet. Hvis du er gravid eller ammer under behandlingen med Ferriprox, må du gi beskjed til legen din og oppsøke legehjelp med én gang.</p> <p>Det anbefales at kvinner som kan bli gravide bruker en effektiv prevensjonsmetode under behandlingen med Ferriprox, og i minst 6 måneder etter den siste dosen. Det anbefales at menn bruker en effektiv prevensjonsmetode under behandling og i 3 måneder etter den siste dosen. Spør legen om hvilken metode som er best for deg.</p> <p style="text-align: right;">4</p>	<p>((Front Cover))</p> <p>PASIENTKORT</p> <p>Viktige sikkerhetspåminnelser for pasienter som tar Ferriprox (deferipron)</p> <p>Foreskrivende lege: _____</p> <p>Tlf.: _____</p> <p style="text-align: right;">1</p>
<p>((Inside 1))</p> <p>MÅLE ANTALLET HVITE BLODLEGEMER MED FERRIPROX</p> <p>Det er en liten mulighet for at du kan utvikle agranulocytose (veldig lavt antall hvite blodlegemer) under bruk av Ferriprox, som kan føre til en alvorlig infeksjon. Selv om agranulocytose bare oppstår hos 1 til 2 av 100 brukere, er det viktig å kontrollere blodet regelmessig.</p> <p style="text-align: right;">2</p>	<p>((Inside 2))</p> <p>Sørg for å gjøre følgende:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Få blodet ditt kontrollert hver uke i det første året med behandling med Ferriprox og deretter så ofte legen anbefaler det.2. Hvis du får symptomer på infeksjon, slik som feber, sår hals eller influensalignende symptomer, må du øyeblikkelig oppsøke helsepersonell. Ditt hvite blodcelletall må undersøkes i løpet av 24 timer for å oppdage mulig agranulocytose. <p style="text-align: right;">3</p>