

Pasientnavn:

Legens navn:

Legens telefonnummer:

Ha dette kortet med deg i fire måneder etter din siste dose med Flixabi, eller ved graviditet, i minst 12 måneder etter fødselen av barnet ditt. Bivirkninger kan oppstå i lang tid etter din siste dose.

Dato for oppstart av Flixabi-behandling:

Nåværende administrering:

Lag deg også en liste over alle andre legemidler som du bruker og ta denne med til ethvert besøk hos lege.

Liste over andre legemidler:

Liste over allergier:

Be legen din notere type og dato for den/de siste undersøkelsen(e) for tuberkulose (TB) under:

Test:

Dato:

Resultat:

06/2022, FLX-(PAC)-NO-v3.0

Dette informasjonskortet er utarbeidet av Biogen Norway AS på vegne av Samsung Bioepis.

SAMSUNG BIOEPIS

53535-06



Pasientkort

 **Flixabi™ 100 mg**  
**infliximab**

NO

Vis dette kortet til enhver lege som er involvert i din behandling.

Dette pasientkortet inneholder viktig sikkerhetsinformasjon som du må være oppmerksom på før og under behandling med Flixabi.

Vennligst les pakningsvedlegget til Flixabi nøye før du starter å bruke dette legemidlet.

Det er viktig at du og legen din noterer ned handelsnavnet og produksjonsnummeret til legemidlene dine.

## Infeksjoner

### Før Flixabi-behandling

- Informer legen din dersom du har en infeksjon, selv om den er mindre alvorlig.
- Det er veldig viktig at du informerer legen din dersom du noen gang har hatt TB, eller hvis du har vært i nær kontakt med noen som har hatt TB. Legen din vil teste deg for å se om du har TB. Be legen din notere type og dato for din(e) siste undersøkelse(r) for TB på kortet.

- Informer legen din dersom du har hepatitt B eller hvis du vet eller mistenker at du er bærer av hepatitt B-viruset.

### Under Flixabi-behandling

- Informer legen din umiddelbart dersom du har tegn på en infeksjon. Tegnene inkluderer feber, tretthetsfølelse, (vedvarende) hoste, kortpustethet, vekttap, nattesvette, diaré, sår, tannproblemer, svie ved vannlating eller influensalignende symptomer.

## Graviditet, amming og vaksiner

- Hvis du fikk Flixabi da du var gravid eller hvis du ammer, er det viktig at du informerer legen til barnet ditt om dette før barnet ditt får noen vaksiner. Barnet ditt bør ikke få en "levende vaksine", slik som BCG (brukes til å forebygge tuberkulose), før 12 måneder etter fødselen eller så lenge du ammer, med mindre ditt barns lege anbefaler noe annet.