

Viktig kontaktinformasjon

Legens navn

Legens tlf. nr.

Pasientens navn

Pasientens tlf. nr.

Pasientens nødkontakt

Nødkontaktens tlf. nr.

REGENERON | SANOFI GENZYME 

Sanofi og Regeneron samarbeider i et globalt forsknings- og utviklingsprogram samt med markedsføringsen av LIBTAYO® (cemiplimab).

© 2020 sanofi-aventis Norge AS og Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Alle rettigheter forbeholdt. MAT-GL-2000289 04/20 | VV-REG-0951757_10.2020

Kontakt lege umiddelbart dersom følgende tegn eller symptomer oppstår, eller om de blir verre (forts.):

Problemer i andre deler av kroppen (forts.)

- Problemer i sentralnervesystemet
 - Kraftig muskelsvakhet
 - Prikking, nummenhet, svakhet eller brennende smerte i armer eller ben
 - Lammelse i armer og ben
- Muskel- og leddproblemer
 - Smerte eller hevelse i ledd
 - Muskelsmerte, -svakhet eller -stivhet
- Øyeproblemer
 - Synsendringer
 - Smerter eller rødhet i øyet
 - Lysømfintlighet
- Problemer med hjerte og sirkulasjon
 - Endringer i hjerterytme, hjertet slår fort, hopper over et slag eller hamrer
 - Brystsmerter
 - Kortpustethet
- Øvrige
 - Tørrhet flere steder på kroppen, fra munn til øyne, nese, hals og de øverste hudlagene
 - Blåmerker i huden eller blødninger

Viktig sikkerhetsinformasjon til annet helsepersonell som behandler pasienten, gjelder også akutsituasjoner som legevakt

Denne pasienten har blitt forskrevet LIBTAYO, et PD-1 blokkerende antistoff. LIBTAYO kan gi immunrelaterte bivirkninger som påvirker hud, lunger, tarm, lever, hormonkjertler, nyrer og andre deler av kroppen. Det er viktig å oppdage og behandle bivirkninger så tidlig som mulig for å minimere konsekvensen av disse. Vennligst se preparatomtalen til LIBTAYO for mer informasjon om påvisning og håndtering av eventuelle bivirkninger.

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema.

Pasientkort

LIBTAYO® ▼
(cemiplimab)

Viktig sikkerhetsinformasjon for å minimere risikoen for immunrelaterte bivirkninger

Dette pasientkortet vil hjelpe deg å identifisere og rapportere bivirkningssymptomer under behandling med LIBTAYO® (cemiplimab).

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på www.felleskatalogen.no. Vennligst se pakningsvedlegget for mer informasjon eller ta kontakt med Sanofi via telefon 46 91 80 01 (kl 10-14) eller via e-post medinfo-norge@sanofi.com.

▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning, se www.legemiddelverket.no/pasientmelding.

Viktig informasjon

- Informer din lege om alle dine medisinske tilstander og om alle legemidler du tar før du bruker LIBTAYO.
- LIBTAYO kan gi alvorlige bivirkninger som kan forverres.
- Rapportert alle symptomer på bivirkninger til din lege, selv om de ikke er listet opp i dette pasientkortet.
- Ikke utsett rapportering av bivirkninger, selv om du ikke er hjemme.
- Ikke prøv å behandle noen av disse symptomene selv, rådfør deg først med legen din.
- Ha med deg dette pasientkortet til enhver tid under behandling.
- Vis dette pasientkortet til alt helsepersonell som behandler deg, (f eks. legevakt).

Kontakt lege umiddelbart dersom følgende tegn eller symptomer oppstår, eller om de forverres:

Hudproblemer

- Utslett eller kløe
- Hudblemmer
- Sår i munnen eller på andre slimhinner

Lungeproblemer (pneumonitt)

- Ny eller forverret hoste
- Kortpustethet
- Brystsmerter

Tarmproblemer (kolitt)

- Hyppig diaré, ofte med blod eller slim
- Mer tarmbevegelser enn vanlig
- Svart eller tjæreaktig avføring
- Kraftige magesmerter eller -ømhet

Leverproblemer (hepatitt)

- Gulfarging av huden eller det hvite i øynene
- Kraftig kvalme eller oppkast
- Smerter på høyre side av magen
- Søvnighet
- Mørk urin (te-farget)
- Ofte blødninger eller flere blåmerker enn normalt
- Mindre sultfølelse enn vanlig

Hormonkjertelproblemer

- Hodepine som ikke går over eller uvanlig hodepine
- Rask hjerterytme
- Økt svetting
- Føler deg kaldere eller varmere enn vanlig
- Veldig trett

- Blir svimmel eller besvimer
- Vektøkning eller vekttap
- Føler deg mer sulten eller tørst enn vanlig
- Hårtap
- Forstoppelse
- Dypere stemme
- Svært lavt blodtrykk
- Vannlatning oftere enn vanlig
- Kvalme eller oppkast
- Magesmerter
- Endring i humør eller oppførsel (som nedsatt sexlyst, mer irritabel eller glemsom)

Symptomer på type 1-diabetes

- Føler deg mer sulten eller tørst enn vanlig
- Har behov for å urinere oftere
- Vekttap
- Tretthet

Nyreproblemer (nyrebetennelse og nyresvikt)

- Vannlating sjeldnere enn normalt
- Blod i urinen
- Hovne ankler
- Mindre sultfølelse enn normalt

Infusjonsrelaterte reaksjoner (som noen ganger kan være alvorlige eller livstruende)

- Frysninger
- Skjelving eller feber
- Kløe eller utslett
- Rødmende eller hovent ansikt
- Kortpustethet eller tungpustethet
- Svimmelhet eller besvimelse
- Rygg- eller nakkesmerter
- Kvalme
- Oppkast
- Magesmerter

Problemer i andre deler av kroppen

- Problemer i sentralnervesystemet
 - Hodepine eller stiv nakke
 - Feber
 - Tretthet eller kraftløshet
 - Frysninger
 - Oppkast
 - Forvirring
 - Hukommelsesproblemer eller søvnighet
 - Krampetrekninger (krampeanfallet)
 - Se og hør ting som i virkeligheten ikke er der (hallusinasjoner)