

## Pasientveiledning

# LIBTAYO® ▼ (cemiplimab)

## Viktig sikkerhetsinformasjon for å minimere komplikasjoner fra immunrelaterede bivirkninger

Denne pasientveiledningen vil hjelpe deg med å identifisere og rapportere bivirkningssymptomer under behandling med LIBTAYO® (cemiplimab).

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på [www.felleskatalogen.no](http://www.felleskatalogen.no). Vennligst se pakningsvedlegget for mer informasjon eller ta kontakt med Sanofi via telefon 46 91 80 01 (kl 10-14) eller via e-post [medinfo-norge@sanofi.com](mailto:medinfo-norge@sanofi.com).

### Viktig informasjon

- Informer din lege om alle dine medisinske tilstander og om alle legemidler du tar før du bruker LIBTAYO.
  - LIBTAYO kan gi alvorlige bivirkninger som kan forverres.
  - Rapportert alle symptomer på bivirkninger til din lege, selv om de ikke er listet opp i denne pasientveiledningen.
  - Ikke utsett rapportering av bivirkninger, selv om du ikke er hjemme.
  - Ikke prøv å behandle noen av disse symptomene selv, rådfør deg først med legen din.
  - **Ha med deg pasientkortet til enhver tid under behandling.**
  - **Vis pasientkortet til alt helsepersonell som behandler deg, (f.eks. legevakt).**
- ▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning, se [www.legemiddelverket.no/pasientmelding](http://www.legemiddelverket.no/pasientmelding).

## Kontakt lege umiddelbart dersom følgende tegn eller symptomer oppstår, eller om de blir verre:

### Hudproblemer

- Utslett eller kløe
- Hudblemmer
- Sår i munnen eller på andre slimhinner

### Lungeproblemer (pneumonitt)

- Ny eller forverret hoste
- Kortpustethet
- Brystsmerter

### Tarmproblemer (kolitt)

- Hyppig diaré, ofte med blod eller slim
- Mer tarmbevegelser enn vanlig
- Svart eller tjæreaktig avføring
- Kraftige magesmerter eller -ømheth

### Leverproblemer (hepatitt)

- Gulfarging av huden eller det hvite i øynene
- Kraftig kvalme eller oppkast
- Smerter på høyre side av magen
- Søvnighet
- Mørk urin (te-farget)
- Ofte blødninger eller fler blåmerker enn normalt
- Mindre sultfølelse enn vanlig

### Hormonkjertelproblemer

- Hodepine som ikke går over eller uvanlig hodepine
- Rask hjerterytme
- Økt svetting
- Føler deg kaldere eller varmere enn vanlig
- Veldig trett
- Blir svimmel eller besvimer
- Vektøkning eller vekttap
- Føler deg mer sulten eller tørst enn vanlig
- Hårtap
- Forstoppelse
- Dypere stemme
- Svært lavt blodtrykk
- Vannlating oftere enn vanlig
- Kvalme eller oppkast
- Magesmerter
- Endring i humør eller oppførsel (som nedsatt sexlyst, mer irritabel eller glemsom)

### Symptomer på type 1 diabetes

- Føler deg mer sulten eller tørst enn vanlig

- Har behov for å urinere oftere
- Vekttap
- Tretthet

### **Nyreproblemer (nyrebetennelse og nyresvikt)**

- Vannlating sjeldnere enn normalt
- Blod i urinen
- Hovne ankler
- Mindre sulfølelse enn normalt

### **Infusjonsrelaterte reaksjoner (som noen ganger kan være alvorlige eller livstruende)**

- Frysninger
- Skjelving eller feber
- Kløe eller utslett
- Rødmende eller hovent ansikt
- Kortpustethet eller tungpustethet
- Svimmelhet eller besvimelse
- Rygg- eller nakkesmerter
- Kvalme
- Oppkast
- Magesmerter

### **Problemer i andre deler av kroppen**

- Problemer i sentralnervesystemet
  - Hodepine eller stiv nakke
  - Feber

- Tretthet eller kraftløshet
- Frysninger
- Oppkast
- Forvirring
- Hukommelsesproblemer eller søvnighet
- Krampetrekninger (krampeanfoll)
- Se og høre ting som i virkeligheten ikke er der (hallusinasjoner)
- Kraftig muskelsvakhet
- Prikking, nummenhet, svakhet eller brennende smerte i armer eller ben
- Lammelse i armer og ben

- Muskel- og leddproblemer
  - Smerte eller hevelse i ledd
  - Muskelsmerter, -svakhet eller -stivhet

- Øyeproblemer
  - Synsendringer
  - Smerter eller rødhet i øyet
  - Lysømfintlighet

- Problemer med hjerte og sirkulasjon
  - Endringer i hjerterytme, hjertet slår fort, hopper over et slag eller hamrer
  - Brystsmerter
  - Kortpustethet

- Øvrige
  - Tørrhet flere steder på kroppen, fra munn til øyne, nese, hals og de øverste hudlagene
  - Blåmerker i huden eller blødninger

## Viktig kontaktinformasjon

Legens navn. \_\_\_\_\_

Legens tlf.nr. \_\_\_\_\_

Pasientens navn \_\_\_\_\_

Pasientens tlf.nr. \_\_\_\_\_

Pasientens nødkontakt \_\_\_\_\_

Nødkontaktens tlf.nr. \_\_\_\_\_

**REGENERON | SANOFI GENZYME** 

Sanofi og Regeneron samarbeider i et globalt forsknings- og utviklingsprogram samt med markedsføringen av LIBTAYO® (cemiplimab).

© 2020 sanofi-aventis Norge AS og Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Alle rettigheter forbeholdt. MAT-GL-2000288 04/20 | VV-REG\_0951756\_10.2020