

OM DIN BEHANDLING

Du har fått forskrevet Lixiana, et antikoagulasjonsmiddel, som fortynner blodet og bidrar til å forebygge at du får blodpropper. Det er viktig at du tar legemiddelet ditt nøyaktig slik legen din har fortalt deg.

- Dersom du har glemt en dose, ta den umiddelbart og fortsett påfølgende dag som vanlig – ikke ta det doble av forskrevet dose på én dag.
- Ikke begynn å bruke andre legemidler (inkludert reseptfrie) uten å rådføre deg med legen din.

- Ikke slutt å ta Lixiana uten å rådføre deg med legen din da dette kan øke risikoen for å få en blodpropp.
- Les pakningsvedlegget som ligger i hver pakning med Lixiana.

NÅR DU SKAL OPPSØKE LEGEHJELP

BLØDNINGSRISIKO

Å bruke et antikoagulasjons-
legemiddel som Lixiana kan øke
blødningsrisikoen din. Det er
derfor viktig å være oppmerksom
på mulige tegn og symptomer på
blødning, og kontakte legen din
umiddelbart dersom du får noe
av følgende:

- Blåmerker eller blødning under huden
- Blod i urinen
- Opphosting av blod
- Oppkast av blod eller noe som ser ut som malt kaffe

- Neseblødning eller kutt som bruker lang tid på å stoppe å blø
- Tjærefarget avføring
- Svimmelhet eller plutselig hodepine
- Uforklarlig tretthet
- Unormal skjedeblødning, inkludert kraftigere eller forlenget menstruasjon

Snakk med legen din dersom du opplever noen uvanlige symptomer.

PASIENTKORT

Lixiana®

filmdrasjerte tabletter

edoksaban

Ha alltid med deg
dette kortet.

Vis det til helsepersonell,
farmasøyt, lege eller
tannlege, før medisinske
behandlinger eller prosedyrer.

PASIENTINFORMASJON

Pasientnavn:

.....

Fødselsdato:

I en akutt situasjon, vennligst kontakt:

Navn:

Telefonnummer:

.....

BEHANDLINGSINFORMASJON

(Fylles ut av legen)

Lixiana har blitt foreskrevet i en

dose én gang daglig på: mg

Startet den: / (mm/åå)

Blodtype:

Andre legemidler/tilstander:

.....

.....

.....

.....

FORSKRIVNINGSPASJON

For mer informasjon eller i en akutt situasjon, vennligst kontakt:

Legens navn:

.....

Telefonnummer, stempel:

.....

Legens signatur:

.....

INFORMASJON TIL HELSEPERSONELL

- Lixiana er en oral antikoagulant faktor Xahemmer.
- Ved behov for en invasiv prosedyre skal Lixiana seponeres minst 24 timer på forhånd, og det skal utvises nødvendig forsiktighet.
- Lixiana kan øke blødningsrisikoen. Seponer behandlingen umiddelbart ved klinisk signifikant blødning.

- Koagulasjonstester som internasjonal normalisert ratio (INR), protrombintid (PT) og aktivert partiell tromboplastintid (aPTT), er ikke anvendelige mål for effekten av Lixiana. En kalibrert antifaktor Xatest kan imidlertid gi informasjon til kliniske beslutninger.

Se preparatomtale (PO) for mer informasjon.

 **ORGANON** Tlf. +47 32 88 48 00
organon.com/no

 **Daiichi-Sankyo**

Product under license
of Daiichi Sankyo Europe GmbH
Copyright © 2020 Daiichi Sankyo.
NO-OCP-110006 05/2021