

Sjekkliste ved forskrivning av MYCAMINE™ (micafungin)

Denne sjekklisten gir forskriver informasjon om visse aspekter ved MYCAMINE, dette for å sikre hensiktsmessig forskrivning av preparatet.

Ved avgjørelse om bruk av MYCAMINE bør potensiell risiko for utvikling av leversvulster tas med i vurderingen.

Hos rotter ble det observert utvikling av foci med endrede hepatocytter og hepatocellulære svulster etter en behandlingsperiode på 3 måneder eller lenger. Den antatte terskelverdien for svulstutvikling hos rotter var omtrent i samme størrelsesorden som klinisk eksponering. Den kliniske relevansen av dette funnet er ikke kjent.

MYCAMINE bør derfor kun brukes når andre antimykotika ikke er hensiktsmessige.

Kryss av i de aktuelle rutene. Arkiver den utfylte sjekklisten i pasientjournalen.

PASIENTOPPLYSNINGER:	FORSKRIVER:	
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	Forskrivers navn: _____ Forskrivers signatur: _____ Dato: _____	
• Finnes det andre antimykotika som er hensiktsmessige?	Ja <input type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;"> MYCAMINE bør kun brukes når andre antimykotika ikke er hensiktsmessige. </div>		
Kryss av dersom noen av de følgende tilstandene er aktuelle for din pasient:		
1) Alvorlig nedsatt leverfunksjon	Ja <input type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>
2) Kroniske leversykdommer kjent for å være preneoplastiske tilstander, slik som: fremskreden leverfibrose, virushepatitt, medfødte enzymdefekter, cirrhose, neonatal leversykdom	Ja <input type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>
3) Samtidig behandling med legemidler som har hepatotoksiske og/eller gentoksiske egenskaper	Ja <input type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;"> Pasientene bør overvåkes nøye mhp. leverskade. Tidlig seponering av MYCAMINE anbefales ved signifikant og vedvarende forhøyede verdier av ALAT/ASAT for å minimere risikoen for adaptiv regenerering og mulig påfølgende leversvulster. </div>		
4) Sykdomshistorie med hemolyse eller hemolytisk anemi	Ja <input type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;"> Pasienter som utvikler kliniske tegn eller har laboratorieprøver som viser hemolyse under MYCAMINE-behandling, bør overvåkes nøye for tegn på forverring av disse tilstandene, og nytte/risiko av å fortsette behandling med MYCAMINE bør vurderes. </div>		
5) Sykdomshistorie med nedsatt nyrefunksjon	Ja <input type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;"> Pasientene bør overvåkes nøye mhp. forverring av nyrefunksjon. </div>		
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #f2f2f2;"> Dersom noen av spørsmålene (1–5) er besvart med "Ja", skal MYCAMINE <u>kun forskrives</u> etter en nøye nytte-/risikovurdering. </div>		