

Informasjon til pasienter om OLUMIANT® (baricitinib)

Dette dokumentet inneholder viktig informasjon du bør være oppmerksom på før og under behandling med Olumiant.

Ha denne informasjonen med deg og vis den til helsepersonell involvert i behandlingen din.

Legens telefonnummer:

Legens navn (forskriver av Olumiant):

Ditt navn:

Graviditet

- Ta ikke Olumiant dersom du er gravid eller tror du kan være gravid.
- Bruk sikker prevensjon mens du tar Olumiant (og i 1 uke etterpå hvis du avbryter behandlingen).
- Fortell legen din umiddelbart dersom du blir (eller ønsker å bli) gravid.

Infeksjoner

Olumiant kan gjøre en eksisterende infeksjon verre eller øke risikoen for at du får en ny infeksjon, eller øke risikoen for reaktivering av virusinfeksjon. Informer legen din umiddelbart dersom du får symptomer på infeksjon, slik som:

- Feber, sår, mer enn vanlig tretthetsfølelse eller tannproblemer.
- Hoste som ikke går bort, nattesvette og vekttap. Dette kan være symptomer på tuberkulose (en infeksjonssykdom i lungene).
- Smertefullt hudutslett med blemmer. Dette kan være tegn på herpes zoster infeksjon.

Fettinnhold i blodet

Legen kan måle nivåer av fett i blodet ditt, slik som kolesterol, når du bruker Olumiant.

Blodpropp

Olumiant kan forårsake en tilstand hvor en blodpropp dannes i benet ditt og kan fraktes til lungene dine. Informer lege umiddelbart dersom du får noen av følgende symptomer:

- Hevelse eller smerte i ett ben
- Varme eller rødhet i ett ben
- Uventet kortpustethet
- Hurtig pust
- Smerter i brystet