

SPRAVATO® – Sjekkliste for helsepersonell før pasienten reiser hjem

Ved hver behandlingsrunde skal pasientene ha tilsyn av helsepersonell under og etter administrasjon av Spravato (esketamin) nespray inntil de er stabile, basert på klinisk vurdering

Behandlerne er ansvarlig for å fastslå om pasienten er klar for hjemreise basert på denne sjekklisten og sin kliniske vurdering.

Klinisk vurdering

- 1. Forbigående dissosiative tilstander og persepsjonsforstyrrelser (dissosiasjon):** Har du sjekket at pasienten ikke har tegn på dissosiasjon eller persepsjonsforandringer som kan påvirke funksjonsevnen?
- 2. Bevissthetsforstyrrelser (sedasjon):** Har du sjekket at pasienten er helt våken og responderer på stimuli (dvs. ikke har sedasjon)?
- 3. Blodtrykksøkning:** Er pasientens blodtrykksverdier på akseptabelt nivå?
- 4. Andre bivirkninger:** Har eventuelle andre bivirkninger opphørt?

Pasienten

- 5.** Har du informert pasienten om at vedkommende ikke skal kjøre eller bruke maskiner før neste dag, etter en god natts søvn?
- 6.** Har pasienten planlagt hjemreise med offentlig transportmiddel eller fått noen til å kjøre seg hjem?

Klar for hjemreise

- 7.** Anser du, som behandlerne og basert på din kliniske vurdering, at pasienten er klar for hjemreise fra helseinstitusjonen?



ADVARSEL: Instruer pasientene om å ikke utøve potensielt risikofylte aktiviteter, slik som å føre et kjøretøy eller bruke maskiner, før neste dag, etter en god natts søvn.

Hva som skal gjøres i en akuttsituasjon

