



***REVOLADE®* (eltrombopag)** **Behandlingsveileder**

Din veileder til behandling av kronisk
immun (idiopatisk) trombocytopeni (ITP)



Informasjon om pasient

Navn: _____

Adresse: _____

Telefon/mobil: _____

Fødselsdato: _____

Dose av REVOLADE (eltrombopag): _____

Informasjon om lege og sykehus

Lege: _____

Sykepleier: _____

Sykehus/avdeling: _____

Telefon/fax: _____

e-post: _____

Apotek: _____

Telefon/fax: _____

Ved nødstilfelle, kontakt: _____

Denne veilederen vil gi deg følgende informasjon

Denne veilederen forklarer hvordan *REVOLADE* virker, hvordan du skal ta *REVOLADE* og hvilke bivirkninger du bør være oppmerksom på.

Om behandlingen din	4
Hvordan <i>REVOLADE</i> virker	5
Å få riktig behandling fra dag én	6
Din daglige dose <i>REVOLADE</i>	8
Måltidsplanlegger for <i>REVOLADE</i>	9
Spørsmål som kan komme opp under behandlingen	11
Bivirkninger du bør være oppmerksom på	13
Hvordan oppbevare og kassere <i>REVOLADE</i>	17
Din personlige behandlingsdagbok	17
Om behandlingsdagboken	17

Om behandlingen din

REVOLADE - Hva brukes det mot?

REVOLADE brukes til å behandle en blødersykdom som kalles immun (idiopatisk) trombocytopeni (ITP) hos voksne pasienter som har fjernet milten, og som tidligere har fått kortikosteroid eller immunoglobulinbehandling uten effekt hvor denne behandlingen ikke har fungert. Behandling med *REVOLADE* kan også gis til voksne pasienter (over 18 år) som tidligere er behandlet for ITP, men hvor milten ikke kan fjernes.

ITP skyldes lavt antall blodplater (trombocytopeni). Blodplater hjelper til med å redusere eller forebygge blødninger. Pasienter med ITP har en økt risiko for blødninger, og kan oppleve symptomer som petekkier (små røde flekker under huden), blåmerker, neseblødninger, blødende gommer, og oppleve ukontrollert blødning dersom kutt eller skader skulle oppstå.

REVOLADE øker antall blodplater. Denne veiledningen vil gi deg nyttig informasjon om *REVOLADE* og inneholder en behandlingsdagbok som hjelper deg i behandlingen.

Viktig informasjon om deg

Fortell legen din om du...

- har eller har hatt leverproblemer. Du vil da bli fulgt opp tett mens du tar *REVOLADE*
- tar medisiner som forhindrer blodpropp, som antikoagulantia eller blodplatehemmende behandling
- har risiko for blodpropp (f.eks. røyker, tar p-piller, får hormonbehandling eller har hatt en operasjon/traume), eller om en i din familie har hatt blodpropp
- har hatt katarakt (grå stær)
- er gravid, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid
- ammer eller planlegger å amme
- tar eller planlegger å ta syrenøytraliserende midler (medisiner mot fordøyelsesbesvær, halsbrann eller magesår) som inneholder metallioner, som aluminium, kalsium eller magnesium
- tar medisiner eller tilskudd som inneholder kalsium, aluminium, jern, magnesium, selen eller sink. Dette gjelder noen reseptfrie legemidler, naturlegemidler, mineraler og multivitamintilskudd og proteindrikker
- tar eller planlegger å ta andre medisiner, inkludert statiner (for å redusere kolesterolet), eller kreftmedisiner (metotreksat eller topotekan)
- er av østasiatisk opprinnelse (som fra Kina, Japan, Taiwan eller Korea). Dette betyr at du må starte med en lavere dose av *REVOLADE*
- tar andre medisiner mot ITP, som kortikosteroider, danazol eller azatioprin

Du skal ikke ta *REVOLADE* hvis du:

- er allergisk (hypersensitiv) overfor virkestoffet i *REVOLADE* eller noen av de andre innholdsstoffene
 - snakk med legen din dersom du tror dette gjelder deg


Hvordan virker *REVOLADE*

Det antas at ITP skyldes økt nedbrytning av blodplater i blodet og av at kroppen ikke er i stand til å produsere nok blodplater. *REVOLADE* tilhører en gruppe medisiner som kalles trombopoietin (TPO) reseptor agonister.

REVOLADE virker ved å stimulere kroppens system til å lage flere blodplater. Hormonet TPO gir signaler til celler (som kalles megakaryocytter) om at de skal produsere blodplater ved å binde seg til TPO reseptoren (TPO-R). *REVOLADE* stimulerer også blodplateproduksjonen ved å binde seg til TPO-R, men på en annen måte enn kroppens TPO.

Studier viste at pasienter med ITP som får *REVOLADE* fikk signifikant økning i antall blodplater og færre problemer med blødning enn de pasientene som fikk placebo.

Aktivering av TPO-reseptoren fører til økt produksjon av blodplater



Binding av *REVOLADE* aktiverer reseptoren



Megakaryocyttene utvikler seg



Økt produksjon av blodplater



Å få riktig behandling fra dag én

For å sikre at ITP behandlingen din skal fungere, må du ta korrekt dose av *REVOLADE* hver dag, og helst til samme tid hver dag. Du trenger også å planlegge nøye hva du spiser og drikker 4 timer før og 4 timer etter at du tar *REVOLADE*. Dette fordi enkelte matvarer, drikker og andre medisiner kan hindre *REVOLADE* i å virke som det skal.

Det er nyttig at du lager deg huskereglene for hvordan du skal ta *REVOLADE*. Snakk med din lege om hva som er den beste tiden på dagen for deg å ta *REVOLADE*. På slutten av dette heftet finner du en personlig behandlingsdagbok som kan hjelpe deg å huske på dette.



***REVOLADE* 25 mg**



***REVOLADE* 50 mg**

Riktig dose til riktig tid

REVOLADE skal:

- tas en gang daglig. Du kan behøve å ta mer enn én tablett daglig, men de skal tas samtidig
- svelges hel med vann
- tas til samme tid hver dag

Bruk alltid *REVOLADE* slik legen har fortalt deg.

REVOLADE påvirkes av noen mineraler (metallkationer) i mat. Dette er en ufarlig reaksjon, men den reduserer kroppens evne til å ta opp *REVOLADE* fra tarmen. *REVOLADE* vil derfor ikke virke tilstrekkelig. Det er derfor viktig at du følger veiledningen om hvordan du skal ta *REVOLADE* sammen med mat, drikke, mineraltilskudd og syrenøytraliserende midler.

Følgende matvarer, drikker og medisiner må unngås 4 timer før og 4 timer etter din daglige dose *REVOLADE*:

- Melkeprodukter som smør, ost, yoghurt og iskrem
- Melk, milkshake eller drikker laget av melk, yoghurt eller fløte.
- Matvarer og drikker som naturlig er kalsiumrike (mer enn 50 mg) eller beriket med kalsium, som noen typer juice, frokostblandinger og energibarer
- Kalsiumrik mat som inneholder bein (f.eks. sardiner eller laks)
- Syrenøytraliserende midler (som er basert på metallkationer som aluminium, kalsium og magnesium), som er legemidler mot fordøyelsesbesvær, halsbrann eller magesår
- Medisiner eller kosttilskudd som inneholder kalsium, aluminium, jern, magnesium, selen eller sink. Dette gjelder noen reseptfrie legemidler, mineral- og multivitamintilskudd og proteindrikker.

4 timer før du tar Revolade


Unngå melkeprodukter, kalsiumrike eller kalsiumberikede matvarer, syrenøytraliserende midler





...og 4 timer etter

Mat med lite kalsium kan spises



Du kan ta *REVOLADE* med mat som inneholder lite kalsium (mindre enn 50 mg). Mat og drikke som inneholder lite kalsium kan være frukt (som jordbær eller ananas), nøtter, rosiner, kylling, skinke, storfekjøtt eller grønnsaker. Soyamelk, fruktjuice og frokostblandinger, brød og havregrøt kan tas sammen med *REVOLADE* dersom de ikke er beriket med kalsium. Dersom du må ta et syrenøytraliserende middel, vil legen din enten anbefale å ta det på et annet tidspunkt på dagen eller et annet legemiddel som ikke er basert på metallkationer (feks. H₂-blokker eller protonpumpehemmer) og som ikke påvirker Revolade. Det er mindre sannsynlig at disse påvirker *REVOLADE*. Snakk med lege eller apotek dersom du trenger ytterligere råd om mat, drikke eller medisiner som kan tas sammen med *REVOLADE*.

Din daglige dose **REVOLADE**

Den vanlige startdosen for *REVOLADE* er én 50 mg tablett én gang daglig. Personer av østasiatisk opphav (fra Kina, Japan, Taiwan eller Korea) kan starte med en redusert dose (25 mg daglig). *REVOLADE*-dosen kan økes til maksimalt 75 mg daglig dersom legen finner det nødvendig.

REVOLADE påvirkes av mineraler (metallkationer) som finnes i noen matvarer. Du bør derfor ta dosen på et tidspunkt om er passende for deg for å unngå påvirkninger. Se "Måltidsplanlegger for *REVOLADE*" for ytterligere informasjon.

Det kan ta 1 - 2 uker før *REVOLADE* begynner å virke. Avhengig av hvordan kroppen din reagerer på *REVOLADE* kan legen din anbefale at du endrer dosen. Du skal ikke endre dosen uten å snakke med legen din først.

REVOLADE skal tas sammen med vann

_____ x 25 mg tablett



_____ x 50 mg tablett



Tidspunkt: _____

Husk å unngå melkeprodukter, kalsiumrike eller kalsiumberikede matvarer, syrenøytraliserende midler, mineraler og vitamintilskudd 4 timer før og 4 timer etter du tar *REVOLADE*.

Merk

Be legen din om å fylle inn dosen her og i behandlingsdagboken. Dette bør inkludere både antall tabletter du skal ta, og når på dagen du skal ta disse.

Legen din vil fortelle deg om du trenger å endre behandlingsplanen. Du må ikke endre dosen eller tidspunktet du tar uten i samråd med legen. Snakk med legen din om du har spørsmål eller bekymringer angående behandlingen. Når du starter behandlingen med *REVOLADE* må du ta blodprøver ukentlig for å sjekke blodplateantallet. Basert på resultatene av prøvene vil legen din kunne endre dosen *REVOLADE*. Leverfunksjonen vil også undersøkes før og under behandlingen. Når legen har funnet den optimale dosen for deg, trenger du å ta blodprøver en gang i måneden.


Måltidsplanlegger for *REVOLADE*

Visse matvarer, drikker og medisiner kan forhindre *REVOLADE* i å virke som det skal. Du må derfor planlegge nøye med hva du skal spise og drikke 4 timer før og 4 timer etter du har tatt medisinen. Snakk med lege eller apotek for å lage en plan som passer deg. Mange pasienter synes det er passende å ta *REVOLADE* enten morgen ELLER kveld, men det er viktig at du tar *REVOLADE* kun en gang daglig og helst til samme tid hver dag.

REVOLADE tatt om morgenen

Dersom det beste for deg er å ta *REVOLADE* om morgenen:


Du må unngå melkeprodukter, kalsiumrike eller kalsiumberikede matvarer, syrenøytraliserende midler og kosttilskudd til frokost. Lunch, middag og kveldsmat kan du fortsatt spise som normalt.



REVOLADE tatt på kvelden

Dersom det beste for deg er å ta *REVOLADE* på kvelden:

Du må unngå melkeprodukter, kalsiumrike eller kalsiumberikede matvarer, syrenøytraliserende midler og kosttilskudd til kvelds. Frokost, lunch og middag kan du fortsatt spise som normalt.



Disse forslagene er kun eksempler. Snakk med lege eller apotek for å lage en plan som passer deg.

Spørsmål som kan komme opp under behandling

Hva hvis dette skjer?	Dette skal du gjøre
Du glemmer å ta <i>REVOLADE</i> tabletten(e) eller du kan ikke huske om du har tatt tabletten(e)	Ta neste dose til vanlig tid. Du må ikke ta dobbel dose som erstatning for den glemte dosen.
Du tar for mye <i>REVOLADE</i>	Kontakt lege, apotek eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) umiddelbart. Vis dem pakken eller pakningsvedlegget som fulgte med medisinen.
Du kaster opp tabletten	Vent til neste dag og ta neste tablett til vanlig tid.

Andre ting du bør være klar over mens du tar *REVOLADE*

Undersøkelse for katarakt (grå stær)

Det ble observert katarakt ved bruk av *REVOLADE* i dyrestudier, men det er ikke kjent hva dette har å si for mennesker. Så langt er det ikke funnet økt risiko for katarakt i kliniske studier på mennesker. Legen din kan anbefale at du blir sjekket for katarakt som en del av en rutinemessig øyetest.

Blodprøver

Før du begynner med *REVOLADE* vil legen din ta blodprøver for å undersøke blant annet blodplater og leverfunksjon. Disse prøvene vil bli gjentatt under behandlingen.

Bruk av andre legemidler

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller starter opp behandling med andre legemidler. Dette gjelder:

- Syrenøytraliserende legemidler for å behandle magesår eller halsbrann
- Legemidler som statiner, brukes til å redusere kolesterolet
- Kjemoterapi-legemidler som topotekan eller metotreksat, brukt til å behandle kreft
- P-piller eller hormonbehandling
- Mineraler som jern, kalsium, magnesium, aluminium, selen og sink som kan finnes i vitaminer og mineraltilskudd
- Naturlegemidler og andre legemidler som kan kjøpes uten resept

Graviditet og amming

Bruk ikke *REVOLADE* mens du er gravid med mindre legen din spesifikt anbefaler det. Effekten av *REVOLADE* under graviditet er ikke kjent.

- Fortell legen din om du er gravid eller planlegger å bli gravid
- Bruk sikker prevensjon mens du tar *REVOLADE*
- Dersom du blir gravid mens du tar *REVOLADE*, må du fortelle dette til legen din

Det er ikke anbefalt å amme mens du tar *REVOLADE*. Det er ikke kjent om *REVOLADE* går over i morsmelk. Dersom du ammer eller planlegger å amme, må du fortelle dette til legen din.

GJØR DETTE	IKKE GJØR DETTE
Ta tablettene slik legen har fortalt deg	Ta tablettene du har glemt sammen med dosen neste dag
Husk å fortelle legen din dersom du har glemt å ta noen tabletter	Ta tablettene ut av blisteren før du har tenkt å ta dem
Fortell til legen din om du tror du har for få tabletter til neste legebeseøk	Slutte å ta medisinen din uten å snakke med legen din først. Når du slutter å ta <i>REVOLADE</i> vil du behøve å ta blodprøver hver uke i 4 uker for å sjekke blodplateantallet
Fortell legen din om du opplever bivirkninger eller føler deg uvel på noen måte	Ta annen ny medisin uten å snakke med legen først
Ta tablettene hele	Dele tablettene før du svelger dem

Bivirkninger du bør være oppmerksom på

Som alle legemidler kan *REVOLADE* gi bivirkninger, men ikke alle får det. Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene nevnt nedenfor blir alvorlige eller plagsomme, eller du merker andre bivirkninger som ikke er nevnt nedenfor. Legen din vil også undersøke deg nøye for bivirkninger under behandling med *REVOLADE*.

Svært vanlige bivirkninger (disse kan berøre mer enn 1 av 10 personer)

Hodepine

Bemerkning fra lege/helsepersonell

Vanlige bivirkninger (disse kan berøre opptil 1 av 10 personer)

Kvalme

Diaré

Andre bivirkninger du kan oppleve mens du tar *REVOLADE*

Blødning (etter å ha sluttet med behandling)

Høyt antall blodplater

Blodpropp

Leverproblemer

Benmargsproblemer

Snakk med lege umiddelbart dersom noen av bivirkningene blir alvorlige eller plagsomme.



Legens telefonnummer

Ikke slutt å ta medisinen uten å ha snakket med legen først.

Hvordan håndtere bivirkninger

Hodepine

- Drikk mye vann
- Begrens koffeininntaket (som. kaffe, te og koffeinholdig mineralvann)
- Unngå sterkt lys, høye lyder og sterke lukter
- Snakk med lege eller apotek om hvilke medisiner du kan bruke mot hodepine
- Prøv å legge deg og stå opp til samme tid hver dag
- Prøv å spise måltider til samme tid hver dag (husk; unngå kalsiumrik mat 4 timer før og 4 timer etter du tar *REVOLADE*)

Kvalme

Prøv å endre matvanene dine:

- Spis før du føler deg sulten (husk; unngå å spise kalsiumrike matvarer 4 timer før og 4 timer etter du tar *REVOLADE*)
- Spis små måltider gjennom hele dagen (husk; unngå å spise kalsiumrike matvarer 4 timer før og 4 timer etter du tar *REVOLADE*)
- Spis mat som holder romtemperatur
- Ta små slurker væske gjennom hele dagen
- Gå til et annet rom dersom lukt fra matlaging gjør deg kvalm
- Unngå mat som er fettrik, veldig søt eller sterkt krydret

Diaré

Prøv å endre matvanene dine:

- Drikk mye vann
- Drikk 8 til 10 glass daglig av sportsdrikker, buljong eller andre klare væsker for å erstatte væske og mineraler som du taper ved diaré
- Spis mat som inneholder lite fett og mye protein som magert kjøtt og egg i stedet for fritert, fettrik og sterkt krydret mat (husk; å unngå å spise kalsiumrike matvarer 4 timer før og 4 timer etter du tar *REVOLADE*)
- Unngå melk og melkeprodukter, inkludert iskrem
- Spis kokte i stedet for rå grønnsaker og skrell skallet av frukten
- Unngå urtebasert kosttilskudd siden noen av dem kan forårsake diaré

Blødning (etter avsluttet behandling)

Innen 2 uker etter at du slutter å ta *REVOLADE*, vil antallet av blodplater vanligvis falle tilbake til nivået det var på før du begynte å ta *REVOLADE*. Dette kan gi økt risiko for blødning.

- Legen din vil sjekke blodplateantallet i minst 4 uker etter at du har sluttet å ta *REVOLADE*
- Fortell legen din om du får blødninger i løpet av de 4 ukene etter at du slutter å ta *REVOLADE*

Høyt antall blodplater

- Legen din vil undersøke antallet av blodplater under behandling med *REVOLADE*
- Dersom blodplateantallet blir for høyt, kan legen finne det nødvendig å endre doseringen av *REVOLADE*, eller du må avslutte behandlingen

Risiko for blodpropp

- Personer med ITP har en høyere risiko for å få blodpropp, og medisiner som *REVOLADE* kan øke denne risikoen
- Risiko for blodpropp kan være økt i følgende tilfeller:
 - øker med alderen
 - om du er sengeliggende i en lengre periode
 - om du tar p-piller eller får hormonbehandling
 - om du har gjennomgått en operasjon eller hatt en fysisk skade (traume)
 - hvis du er overvektig
 - hvis du røyker
 - hvis noen i nærmeste familie har hatt historier med blodpropp - arvelig betinget
- Kontakt legen din umiddelbart dersom du får symptomer på blodpropp, som:
 - hevelse, smerte eller ømhet i en fot (dyp venetrombose)
 - plutselig kortpustethet, særlig når det oppstår sammen med en skarp smerte i brystet og/eller hurtig puls (lunge emboli)
 - smerter i magen, forstørret mage eller blod i avføringen (portvenetrombose)

Leverproblemer

- Hos noen personer kan *REVOLADE* påvirke leveren og forårsake en økning i leverenzymene
- Du må ta regelmessige blodprøver for å undersøke leverfunksjonen
- Kontakte legen din umiddelbart dersom du får symptomer på leverproblemer, som gulfarging av huden eller det hvite i øyet (gulsott) eller uvanlig mørkfarget urin

Benmargsproblemer

- Personer med ITP har problemer med benmargen og medisiner som *REVOLADE* kan forverre dette
- Legen kan undersøke benmargen din under behandlingen

Forverring av blodkreft

- *REVOLADE* skal ikke brukes av pasienter med blodkreft eller som har en tidlig tilstand som kan føre til kreft (myelodysplastisk syndrom (MDS)). Det er en teoretisk risiko at medisiner som *REVOLADE* kan føre til utviklingen av blodkreft. Mens du tar *REVOLADE* vil legen din ta blodprøver og justere dosen på bakgrunn av disse.

Hvordan oppbevare og kassere *REVOLADE*

- Oppbevares utilgjengelig for barn
- Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser
- Bruk ikke *REVOLADE* etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen og blisteren
- Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Lever inn legemidler som du ikke lenger skal/kan bruke på apoteket.

Din personlige behandlingsdagbok

Du må ta *REVOLADE* som foreskrevet av legen din.

Behandlingsdagboken hjelper deg å huske å ta tablettene:

- Legen din kan skrive inn dosen og tidspunkt for når du skal ta *REVOLADE*
- Hver gang du har tatt *REVOLADE* kan du krysse av og notere eventuelle kommentarer om behandlingen (f.eks. bivirkninger)

Om behandlingsdagboken

Din daglige dose

Legen din kan bruke denne boksen til å skrive inn *REVOLADE*-dosen din, og når på dagen du skal ta *REVOLADE*. Be legen din om å fylle inn din *REVOLADE* dose her.

Ukeregister

Hver dag du tar *REVOLADE* kan du krysse av for den daglige dosen *REVOLADE*. Bruk denne tabellen som en påminnelse for din daglige behandling. I tillegg kan du skrive inn kommentarer, som eventuelle bivirkninger du får underveis eller din neste legetime.

Din daglige dose
REVOLADE®:

Tidspunkt: _____
_____ x 25 mg tablett 
_____ x 50 mg tablett 

	Uke 1: fra _____ til _____		Uke 2: fra _____ til _____		Uke 3: fra _____ til _____	
	<i>REVOLADE</i>	Notater/legetime:	<i>REVOLADE</i>	Notater/legetime:	<i>REVOLADE</i>	Notater/legetime:
Dag 1						
Dag 2						
Dag 3						
Dag 4						
Dag 5						
Dag 6						
Dag 7						

Din daglige dose
REVOLADE®:

Tidspunkt: _____
_____ x 25 mg tablett 
_____ x 50 mg tablett 

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6

Dag 7

Uke 1: fra _____ til _____	
REVOLADE:	Notater/legetime:

Uke 2: fra _____ til _____	
REVOLADE:	Notater/legetime:

Uke 3: fra _____ til _____	
REVOLADE:	Notater/legetime:

Din daglige dose
REVOLADE®:

Tidspunkt: _____
_____ x 25 mg tablett 
_____ x 50 mg tablett 

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6

Dag 7

Uke 1: fra _____ til _____	
REVOLADE:	Notater/lege­time:

Uke 2: fra _____ til _____	
REVOLADE:	Notater/lege­time:

Uke 3: fra _____ til _____	
REVOLADE:	Notater/lege­time:

Tidspunkt: _____
_____ x 25 mg tablett
_____ x 50 mg tablett

	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7	
	REVOLADE:	REVOLADE:	REVOLADE:	REVOLADE:	REVOLADE:	REVOLADE:	REVOLADE:	Notater/legetime:
Uke 7								
Uke 8								
Uke 9								
Uke 10								
Uke 11								
Uke 12								
Uke 13								

Din daglige dose
REVOLADE®:

Tidspunkt: _____
_____ x 25 mg tablett 
_____ x 50 mg tablett 

Uke 14

Uke 15

Uke 16

Uke 17

Uke 18

Uke 19

Uke 20

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7	
REVOLADE:	REVOLADE:	REVOLADE:	REVOLADE:	REVOLADE:	REVOLADE:	REVOLADE:	Notater/legeime:

Tidspunkt: _____
_____ x 25 mg tablett
_____ x 50 mg tablett

	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7	
	REVOLADE:	REVOLADE:	REVOLADE:	REVOLADE:	REVOLADE:	REVOLADE:	REVOLADE:	Notater/legetime:
Uke 21								
Uke 22								
Uke 23								
Uke 24								
Uke 25								
Uke 26								
Uke 27								

Ytterligere informasjon fra legen

Spørsmål jeg vil stille legen



XXXXXXXXXXXX



GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline As
Postboks 180 Vinderen
0319 Oslo
www.gsk.no