

## Abacavir/Lamivudin «Mylan»

C *Antiviralt middel.* ATC-nr.: J05A R02

H **TABLETTER, filmdrasjerte 600/300:** Hver tablett inneholder: Abacavirhydroklorid tilsv. abakavir 600 mg, lamivudin 300 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172), paraoransje (E 110), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Del av antiretroviral kombinasjonsbehandling for behandling av humant immunsvikt-virus (HIV)-infeksjon hos voksne, ungdom og barn som veier  $\geq 25$  kg. Før oppstart av behandling bør screening for bærere av HLA-B\*5701-allelet foretas hos enhver hiv-smittet pasient, uavhengig av etnisk opphav, se SPC. Abakavir bør ikke brukes hos kjente bærere av HLA-B\*5701-allelet.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas med eller uten mat. Svelges hele med litt vann.

**Pakninger og priser:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 4307,40.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>H-resept: J05A R02\_1 Lamivudin og abakavir

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Kivexa «ViiV Healthcare»

## Acetylcystein Sandoz «Sandoz»

C *Mukolytikum.* ATC-nr.: R05C B01

T **BRUSETABLETTER 200 mg:** Hver brusetablett inneholder: Acetylcystein 200 mg, laktose, sorbitol, hjelpestoffer. Bjørnebærsmak og villbærsmak.

**Indikasjoner:** Kronisk bronkitt. Forsøksvis ved cystisk fibrose.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan deles i 2 like deler. Tas oppløst i 1/2 glass vann.

**Pakninger og priser:** 25 stk.<sup>1</sup> (tabletrør) kr 80,50. 100 stk.<sup>1</sup> (tabletrør) kr 213,30.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se R05C B01\_2 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Bronkyl «Karo Pharma»

## Acetylsalisylsyre «Actavis»

C *Tromboseprofylaktikum.* ATC-nr.: B01A C06

**ENTEROTABLETTER 75 mg og 160 mg:** Hver enterotablett inneholder: Acetylsalisylsyre 75 mg, resp. 160 mg, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** Sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt. Profylakse av kardiovaskulær morbiditet hos pasienter med stabil angina pectoris. Pasienter med sykehistorie med ustabil angina pectoris, med unntak av i akutfasen. Profylakse mot graftokklusjon etter koronar bypass-operasjon (CABG). Koronar angioplastikk, med unntak av i akutfasen. Sekundærprofylakse etter transitoriske iskemiske anfall (TIA) og iskemiske cerebrovaskulære hendelser (CVA), forutsatt at intracerebrale blødninger er utelukket. Preparatet er ikke anbefalt i akuttsituasjoner. Det er begrenset til sekundærprofylakse under kronisk behandling.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Svelges hele med rikelig væske (1/2 glass vann). Skal ikke knuses, deles eller tygges.

**Pakninger og priser:** 75 mg: 100 stk. (blister) kr 104,80 (trinnspris: kr 80,80). 160 mg: 100 stk. (boks) kr 104,80 (trinnspris: kr 80,80).

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Albyl-E «Takeda»

## Acetylsalisylsyre Norfri «Evolan Pharma»

CF *Analgetikum. Antipyretikum.* ATC-nr.: N02B A01

**TABLETTER 500 mg:** Hver tablett inneholder: Acetylsalisylsyre 500 mg, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** Voksne og barn  $> 12$  år ( $> 40$  kg): Symptomatisk behandling av feber og/eller milde til moderate smerter. Vis forsiktighet ved behandling av barn  $< 18$  år med febersykdom. **Reseptfri bruk:** Voksne og barn  $> 12$  år ( $\geq 40$  kg): Korttidsbehandling av milde til moderate smerter, f.eks. hodepine, menstruasjonsmerter, tannpine og muskel- og leddsmerter. Voksne  $> 18$  år: Korttidsbehandling av feber ved forkjølelse og influensa.

**Pakninger uten resept:** 20 stk. er unntatt fra reseptplikt.

**Pakninger og priser:** 20 stk. (blistre) kr \*.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Aspirin «Bayer AB»

## ▼ Acitretin Orifarm «Orifarm Generics»

C *Middel mot psoriasis.* ATC-nr.: D05B B02

T **KAPSLER, harde 10 mg og 25 mg:** Hver kapsel inneh.: Acitretin 10 mg, resp. 25 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt, gult og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Alvorlig psoriasis, hovedsakelig av pustuløs og erytrodermisk type. Invaliderende pustuløs psoriasis på hender og føtter. Invaliderende Darriers sykdom hos voksne.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas 1 gang daglig med mat eller et glass melk. Skal svelges hele.

**Utleveringsbestemmelser:** Skal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra dermatologisk sykehusavdeling eller spesialist i dermatologi. Til fertile kvinner skal det kun utleveres legemiddel tilstrekkelig for 30 dagers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensningen for fertile kvinner.

**Pakninger og priser:** 10 mg: 100 stk.<sup>1</sup> (blistre) kr 614,90. 25 mg: 100 stk.<sup>1</sup> (blistre) kr 1340,30.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se D05B B02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Neotigason «Actavis»

## Actelsar HCT «Actavis»

C *Angiotensin II-reseptorantagonist og diuretikum.* ATC-nr.: C09D A07

T **TABLETTER 80 mg/12,5 mg og 80 mg/25 mg:** Hver tablett inneh.: Telmisartan 80 mg, hydroklortiazid 12,5 mg, resp. 25 mg, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** Behandling av essensiell hypertensjon. Tablett 80 mg/12,5 mg er beregnet til voksne som ikke oppnår tilfredsstillende blodtrykkskontroll med telmisartan alene. Tablett 80 mg/25 mg er beregnet til voksne som ikke oppnår tilfredsstillende blodtrykkskontroll med tablett 80 mg/12,5 mg eller som tidligere har vært stabilisert med telmisartan og hydroklortiazid gitt separat.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør tas til samme tid hver dag. Tas med eller uten mat. Svelges hele med vann eller annen alkoholfri drikke.

**Pakninger og priser:** 80 mg/12,5 mg: 98 stk.<sup>1</sup> (blistre) kr 764,30 (trinnpris: kr 334,70). 80 mg/25 mg: 28 stk.<sup>1</sup> (blistre) kr 267,70 (trinnpris: kr 131,10).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C09D A07\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

MicardisPlus «Boehringer Ingelheim»

## Adport Sandoz «Sandoz»

C *Immunsuppressivt middel.* ATC-nr.: L04A D02

T **KAPSLER, harde 0,5 mg, 1 mg og 5 mg:** Hver kapsel inneh.: Takrolimus (som monohydrat) 0,5 mg, resp. 1 mg og 5 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 0,5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 1 mg: Gult, rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 5 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Profylakse mot avstøtning av transplantat hos mottakere av lever-, nyre- eller hjerteallograft. Behandling av avstøtning av allograft ved resistens mot andre immunsuppressiver.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Det anbefales at daglig dose deles i 2 doser, f.eks. morgen og kveld. Bør tas umiddelbart etter at de er tatt ut av blisterbrettet. Skal svelges med væske (helst vann). Bør tas på tom mage eller minst 1 time før eller 2-3 timer etter mat for å oppnå maks. absorpsjon. Hvis nødvendig, kan kapselinholdet suspenderes i vann og gis via nasogastrisk sonde.

**Pakninger og priser:** 0,5 mg: 50 stk.<sup>1</sup> (blistre) kr 570,90. 1 mg: 50 stk.<sup>1</sup> (blistre) kr 902,20. 5 mg: 50 stk.<sup>1</sup> (blistre) kr 3308,60.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se L04A D02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Prograf «Astellas»

## Alendronat 70 mg «Mylan»

C *Benresorpsjonshemmer.* ATC-nr.: M05B A04

T **TABLETTER 70 mg:** Hver tablett inneh.: Natriumalendronat tilsv. alendronsyre 70 mg, laktose, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** Behandling av postmenopausal osteoporose. Alendronat reduserer risikoen for vertebrale frakturer og hoftefrakturer.

**Dosering:** 1 tablett (70 mg) 1 gang pr. uke, se SPC. **Administrering:** Tabletten skal tas like etter at pasienten har stått opp om morgenen (i oppreist stilling), sammen med et helt glass vanlig vann (minst 200 ml) på fastende mage, minst 1/2 time før inntak av annen drikk, mat eller andre legemidler. For å lette transporten av tabletten til magesekken, og derved redusere risikoen for øsofageal irritasjon, skal pasienten ikke legge seg ned før dagens første måltid er inntatt, og tidligst 1/2 time etter tablettinntak. Skal ikke tas ved sengetid eller før en står opp. For å redusere risikoen for sår i munnhule og svelg må følgende punkter følges: Tabletten skal svelges hel. Skal ikke knuses, tygges eller løses opp i munnen.

**Pakninger og priser:** 4 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 151,90 (trinnspris: kr 72,90). 12 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 383,10 (trinnspris: kr 144,70).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se M05B A04\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Fosamax 70 mg «MSD»

## Alendronat Bluefish «Bluefish»

C *Benresorpsjonshemmer.* ATC-nr.: M05B A04

T **TABLETTER, filmdrasjerte 70 mg:** Hver tablett inneh.: Natriumalendronat tilsv. alendronsyre 70 mg, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** Behandling av postmenopausal osteoporose. Alendronat reduserer risikoen for virvel- og hoftefrakturer.

**Dosering:** 1 tablett (70 mg) 1 gang pr. uke, se SPC. **Administrering:** Tabletten skal tas når en står opp om morgenen (i oppreist stilling), sammen med et fullt glass vann på fastende mage, minst 1/2 time før inntak av annen drikk, mat eller andre medisiner. For å lette transporten av tabletten til magesekken, og derved redusere risikoen for øsofageal irritasjon, skal pasienten ikke legge seg ned før dagens første måltid er inntatt, og tidligst 1/2 time etter tablettinntak. Tabletten skal ikke tas ved sengetid eller før en står opp. For å redusere risikoen for sår i munnhule/svelg må følgende punkter følges: Tabletten skal svelges hel. Skal ikke knuses, tygges eller løses opp i munnen.

**Pakninger og priser:** 4 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 151,90 (trinnspris: kr 72,90). 12 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 383,10 (trinnspris: kr 144,70).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se M05B A04\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Fosamax 70 mg «MSD»

## Alendronat Sandoz «Sandoz»

C *Benresorpsjonshemmer.* ATC-nr.: M05B A04

T **TABLETTER, filmdrasjerte 70 mg:** Hver tablett inneh.: Alendronsyre (som natriumtrihydrat) 70 mg, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** Behandling av postmenopausal osteoporose. Alendronat reduserer risikoen for virvel- og hoftefrakturer.

**Dosering:** 1 tablett (70 mg) 1 gang pr. uke, se SPC. **Administrering:** Tabletten skal tas umiddelbart når en står opp om morgenen, sammen med et fullt glass vann på fastende (tom) mage, minst 1/2 time før dagens første inntak av mat, drikk eller andre medisiner. Andre drikkevarer (inkl. mineralvann/brus), mat og enkelte legemidler kan redusere absorpsjonen av alendronat. For å lette transporten av tabletten til magesekken, og derved redusere risikoen for øsofageal irritasjon/bivirkning, skal pasienten sitte oppreist eller stå de første 30 minuttene etter inntak, inntil dagens første måltid er inntatt (dvs. minst 1/2 time etter tablettinntak). Tabletten skal ikke tas ved sengetid eller før en står

opp. For å redusere risikoen for sår i orofarynks må følgende punkter følges: Tabletten skal svelges hel. Skal ikke tygges. Skal ikke suges. Skal ikke knuses, deles eller løses opp i munnen.

**Pakninger og priser:** 4 stk.<sup>1</sup> (bliste) kr 151,90 (trinnspris: kr 72,90). 12 stk.<sup>1</sup> (bliste) kr 383,10 (trinnspris: kr 144,70).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se M05B A04\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Fosamax 70 mg «MSD»

## Allopurinol Sandoz «Sandoz»

C *Xantinoksidasehemmer, hemmer av urinsyreproduksjonen.* ATC-nr.: M04A A01

T **TABLETTER 100 mg og 300 mg:** *Hver tablett inneh.:* Allopurinol 100 mg, resp. 300 mg, laktose, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** *Voksne:* Alle former av hyperurikemi som ikke kan kontrolleres vha. diett, inkl. sekundær hyperurikemi av varierende årsaker og ved kliniske komplikasjoner av hyperurikemistilstander, særlig manifestert gikt, urinsyrenefropati og for å løse opp og forebygge nyresten. Tilbakvendende nyresten av kalsiumoksalat ved hyperurikosuri, når væske, diett og lignende tiltak har mislyktes. *Barn og ungdom <15 år:* Sekundær hyperurikemi av varierende årsaker. Urinsyrenefropati under behandling av leukemi. Arvelige enzymmangelsykdommer, Lesch-Nyhan syndrom (partiell eller total hypoksantin-guanin-fosforibosyltransferase-mangel) og adeninfosforibosyltransferase-mangel.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas 1 gang daglig etter mat (minsker risikoen for gastrointestinale bivirkninger). Ved døgndoser >300 mg og ved tydelig gastrointestinal intoleranse, kan det være nødvendig å dele dosen. Kan deles (delestrek), men delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tablettene og ikke for å dele den i like doser.

**Pakninger og priser:** 100 mg: 105 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 82,40. 300 mg: 105 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 180,10.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se M04A A01\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Allopurinol «Orion»

## Almina 28 «CampusPharma»

C *Antikonsepsjonsmiddel.* ATC-nr.: G03A A07

**TABLETTER, filmdrasjerte:** *Hver aktiv tablett inneh.:* Levonorgestrel 100 µg, etinylostradiol 20 µg, laktose, soyalecitin, hjelpestoffer. Fargestoff: Blå aluminiumlakk (E1329), rødt jernoksid (E 172), rød aluminiumlakk (E129), titandioksid (E 171). *Hver inaktiv tablett inneh.:* Laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Peroral antikonsepsjon.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tablettene skal tas i den rekkefølge som er angitt på brettet. Inntas hver dag til omtrent samme tid, og sammen med drikke.

**Pakninger og priser:** 3 × 28 stk. (kalenderpakn.) kr 196,10 (trinnspris: kr 113,50).

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Loette 28 «Pfizer»

## Almotriptan Orifarm «Orifarm Generics»

C *Migrenemiddel.* ATC-nr.: N02C C05

T **TABLETTER, filmdrasjerte 12,5 mg:** *Hver tablett inneh.:* Almotriptanmalat tilsv. almotriptan 12,5 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Akutt behandling av hodepinefasen av migreneanfall med eller uten aura.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør tas med væske. Kan tas med eller uten mat.

**Pakninger og priser:** 6 stk.<sup>1</sup> (bliste) kr 293,00 (trinnspris: kr 203,10). 9 stk.<sup>1</sup> (bliste) kr 421,30 (trinnspris: kr 286,50).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N02C C05\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Almogran «Almirall»

## Altermol «Alternova»

**B** *Analgetikum.* ATC-nr.: N02A J06

**T** **TABLETTER 500 mg/30 mg:** Hver tablett inneh.: Paracetamol 500 mg, kodeinfosfathemihydrat 30 mg, laktose 18 mg, hjelpestoffer.

△ **Indikasjoner:** Opioid-sensitiv smerte når analgetika med kun perifer effekt ikke er tilstrekkelig. Kodein er indisert hos voksne, ungdom og barn  $\geq 12$  år til behandling av akutte, moderate smerter som ikke anses for lindret med andre analgetika som paracetamol eller ibuprofen (alene).

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Svelges med væske. Tas med eller uten mat. Delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tablettene, og ikke for å dele den i like doser.

**Pakninger og priser:** 10 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 83,30 (trinnpris: kr 74,40). 20 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 106,50 (trinnpris: kr 88,80). 50 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 138,20 (trinnpris: kr 105,40). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 216,40 (trinnpris: kr 150,80).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N02A J06\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Pinex Forte «Actavis»

## Amiodaron Hameln «Hameln»

**C** *Antiarytmikum, klasse III.* ATC-nr.: C01B D01

**KONSENTRAT TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg/ml:** 1 ml inneh.: Amiodaronhydroklorid 50 mg, polysorbat 80, benzylalkohol, vann til injeksjonsvæsker.

**Indikasjoner:** Behandling av alvorlig hjertearytmi, i tilfeller der andre behandlingsformer ikke er effektive eller kontraindisert: Arterielle arytmier, inkl. atrieflimmer eller flutter; AV-nodale arytmier og AV-reentrant takykardi, f.eks. som en manifestasjon av Wolff-Parkinson-White syndrom; livstruende ventrikulære arytmier, inkl. vedvarende eller ikke-vedvarende ventrikulær takykardi eller episoder av ventrikulær fibrillasjon. Kan brukes der det kreves hurtig respons eller hvor oral administrering ikke er mulig. Kan brukes før DC-kardioversjon.

**Pakninger og priser:** 10 × 3 ml (glassamp.) kr 155,10.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Cordarone «sanofi-aventis»

## Amitriptylin Orifarm «Orifarm Generics»

**C** *Trisyklisk antidepressiv (TCA).* ATC-nr.: N06A A09

**T** **TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 25 mg:** Hver tablett inneh.: Amitriptylinhydroklorid tils. amitriptylin 10 mg, resp. 25 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** *Voksne:* Depressiv lidelse. Nevropatisk smerte. Profylaktisk behandling av kronisk spenningshodepine. Profylaktisk behandling av migrene. *Barn  $\geq 6$  år:* Behandling av nattlig enurese når organpatologi, inkl. spina bifida og relaterte sykdommer, er blitt utelukket og ingen respons er oppnådd med alle andre ikke-medikamentelle og medikamentelle behandlinger, inkl. antispasmodikum og vasopressinrelaterte preparater. Dette legemidlet skal bare forskrives av helsepersonell med ekspertise i håndtering av vedvarende enurese.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Svelges med 1 glass vann. Kan tas med eller uten mat. Skal ikke tygges.

**Pakninger og priser:** 10 mg: 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 71,60. 25 mg: 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 101,70.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N06A A09\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Sarotex «Lundbeck»

## Amlodipin Accord «Accord»

**C** *Kalsiumantagonist.* ATC-nr.: C08C A01

- T** **TABLETTER 5 mg og 10 mg:** Hver tablett inneh.: Amlodipinbesilat tilsv. amlodipin 5 mg, resp. 10 mg, hjelpestoffer.  
**Indikasjoner:** Hypertensjon. Kronisk stabil angina pectoris. Vasopastisk (Prinzmetals) angina.  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør tas til samme tid hver dag. Svelges med et glass vann. Kan tas med eller uten mat. Skal ikke tas sammen med grapefrukt/grapefruktjuice.  
**Pakninger og priser:** **5 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (bliste) kr 69,80 (trinnspris: kr 63,10). 100 stk.<sup>1</sup> (bliste) kr 119,00 (trinnspris: kr 89,90). **10 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (bliste) kr 202,20 (trinnspris: kr 129,10).  
**Refusjon:**  
<sup>1</sup>Se C08C A01\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Norvasc «Pfizer»

## Amlodipin Sandoz «Sandoz»

- C** **Kalsiumantagonist.** ATC-nr.: C08C A01
- T** **TABLETTER 5 mg og 10 mg:** Hver tablett inneh.: Amlodipinbesilat tilsv. amlodipin 5 mg, resp. 10 mg, hjelpestoffer.  
**Indikasjoner:** Essensiell hypertensjon. Kronisk stabil og vasospastisk angina pectoris.  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør tas til samme tid hver dag, med et glass vann. Kan tas før eller etter mat og annen drikk. Skal ikke tas med grapefruktjuice. Kan deles (delestrek).  
**Pakninger og priser:** **5 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (bliste) kr 69,80 (trinnspris: kr 63,10). 90 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 110,70 (trinnspris: kr 84,50). 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 119,00 (trinnspris: kr 89,90). 250 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 243,10 (trinnspris: kr 176,50). **10 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (bliste) kr 86,00 (trinnspris: kr 76,00). 90 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 185,60 (trinnspris: kr 119,80). 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 202,20 (trinnspris: kr 129,10). 250 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 451,10 (trinnspris: kr 274,50).  
**Refusjon:**  
<sup>1</sup>Se C08C A01\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Norvasc «Pfizer»

## Amoxicillin Sandoz «Sandoz»

- C** **Aminopenicillin.** ATC-nr.: J01C A04
- T** **PULVER TIL MIKSTUR, suspensjon 100 mg/ml:** 1 ml ferdigblandet mikstur inneh.: Amoksicillintrihydrat tilsv. amoksicillin 100 mg, aspartam (E 951), natriumbenzoat (E 211), hjelpestoffer. Fruktsmak (sitron, fersken, aprikos og appelsin).  
**Indikasjoner:** *Behandling av følgende infeksjoner hos voksne og barn:* Akutt bakteriell sinusitt. Akutt otitis media. Akutt streptokokkisk tonsillitt og faryngitt. Akutte eksaserbasjoner ved kronisk bronkitt. Samfunnsvervet pneumoni. Akutt cystitt. Asymptomatisk bakteriuri under svangerskap. Akutt pyelonefritt. Tyfoid- og paratyfoidfeber. Dental abscess med spredning av cellulitt. Infeksjoner i kunstige ledd. Helicobacter pylori-eradikering. Lymes sykdom. Profylakse mot endokarditt. Offentlige retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler skal tas i betraktning.  
**Dosering:** Se SPC. **Tilberedning/Håndtering:** Tilberedes umiddelbart før utlevering/bruk. Mål først opp korrekt mengde renset vann som skal tilsettes; til 60 ml-pakningen skal 51 ml renset vann tilsettes. Til 100 ml-pakningen skal 85 ml renset vann tilsettes. Tilsetningen av renset vann fordeles på 2 omganger; flasken fylles først til ca. 1 cm nedenfor markeringen, deretter lukkes den og ristes godt umiddelbart. Etter at skummet har lagt seg i flasken, etterfylles det med renset vann sakte og nøyaktig opp til markeringen hvorpå flasken igjen ristes kraftig. **Administrering:** Til peroral bruk. Ristes godt for hver dose tas. Bruk medfølgende måleskje eller annet medisinnål. Kan tas med eller uten mat.  
**Oppbevaring og holdbarhet:** *Ferdig tilberedt mikstur:* Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Holdbar i 14 dager.  
**Pakninger og priser:** 60 ml<sup>1</sup> kr 122,10. 100 ml<sup>1</sup> kr 179,30.  
**Refusjon:**  
<sup>1</sup>Se J01C A04\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Imacillin «Teva»

## Amoxicillin Sandoz «Sandoz»

- C** **Aminopenicillin.** ATC-nr.: J01C A04

**T DISPERGERBARE TABLETTER 750 mg og 1 g:** Hver dispergerbar tablett inneh.: Amoksicillintrihydrat tilsv. amoksicillin 750 mg, resp. 1 g, aspartam (E 951), mannitol, sorbitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Behandling av følgende infeksjoner hos voksne og barn: Akutt bakteriell sinusitt. Akutt otitis media. Akutt streptokokkisk tonsillitt og faryngitt. Akutte eksaserbasjoner ved kronisk bronkitt. Samfunnservrevet pneumoni. Akutt cystitt. Asymptomatisk bakteriuri under svangerskap. Akutt pyelonefritt. Tyfoid- og paratyfoidfeber. Dental abscess med spredning av cellulitt. Proteseinfeksjoner. *Helicobacter pylori*-eradikering. Lymes sykdom. Profylakse mot endokarditt. Offentlige retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler skal tas i betraktning.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan enten svelges direkte med vann eller dispergeres i vann og drikkes. Kan tas med eller uten mat. Kan deles (delestrek) for å lette svelging, men delestreken er ikke ment for å dele den i like doser.

**Pakninger og priser:** **750 mg:** 4 stk.<sup>1</sup> (blistre) kr 70,50 (trinnpris: kr 50,00). 14 stk.<sup>1</sup> (blistre) kr 156,30 (trinnpris: kr 81,50). 20 stk.<sup>1</sup> (blistre) kr 207,70 (trinnpris: kr 105,40). **1 g:** 14 stk.<sup>1</sup> (blistre) kr 160,30 (trinnpris: kr 99,30).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se J01C A04\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Imacillin «Teva»

## Anagrelide Bluefish «Bluefish»

**C Blodplatereduserende middel, cytostatikum.** ATC-nr.: L01X X35

**H KAPSLER, harde 0,5 mg:** Hver kapsel inneh.: Anagrelid 0,5 mg (som anagrelidhydroklorid), laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Reduksjon av forhøyede blodplattetall hos risikopasienter med essensiell trombocytomi (ET) som er intolerante overfor nåværende behandling, eller som ikke har oppnådd reduksjon i blodplattetall til et akseptabelt nivå i løpet av nåværende behandling.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas med eller uten mat. Skal svelges hele. Kapselinnholdet skal ikke knuses/fortynnes.

**Pakninger og priser:** 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 5267,00.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>H-resept: L01X X35\_1 Anagrelid

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Xagrid «Shire»

## Anagrelide Sandoz «Sandoz»

**C Blodplatereduserende middel, cytostatikum.** ATC-nr.: L01X X35

**H KAPSLER, harde 0,5 mg:** Hver kapsel inneh.: Anagrelid 0,5 mg (som anagrelidhydroklorid 0,61 mg), laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Reduksjon av forhøyede blodplattetall hos risikopasienter med essensiell trombocytomi som er intolerante overfor nåværende behandling, eller som ikke har oppnådd reduksjon i blodplattetall til et akseptabelt nivå i løpet av nåværende behandling.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas med eller uten mat. Skal svelges hele. Ikke knus eller bland ut kapselinnholdet med væske.

**Pakninger og priser:** 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 5267,00.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>H-resept: L01X X35\_1 Anagrelid

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Xagrid «Shire»

## Anastrozole «Teva»

**C Aromatasehemmer.** ATC-nr.: L02B G03

**T TABLETTER, filmdrasjerte 1 mg:** Hver tablett inneh.: Anastrozol 1 mg, laktosemonohydrat 77 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Behandling av hormonell reseptorpositiv avansert brystkreft hos postmenopausale kvinner. Tilleggsbehandling ved hormonell reseptorpositiv tidlig invasiv brystkreft hos postmeno-

pausale kvinner. Tilleggsbehandling ved hormonell reseptorpositiv tidlig invasiv brystkreft hos postmenopausale kvinner som har mottatt 2-3 års tilleggsbehandling med tamoksifen.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør tas til samme tid hver dag. Kan tas med eller uten mat. Svelges hele med et glass vann. Kan om nødvendig deles/knuses.

**Pakninger og priser:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 705,20 (trinnspris: kr 427,20). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 2017,40 (trinnspris: kr 1313,00).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se L02B G03\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Arimidex «AstraZeneca»

## Apomorfin PharmSwed «PharmSwed»

C *Antiparkinsonmiddel, dopaminagonist.*

ATC-nr.: N04B C07

**INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml: 1 ml inneh.:** Apomorfinhydrokloridhemihydrat 5 mg, natriumklorid, natriummetabisulfitt (E 223), saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker. pH: 2,6-4,0.

**Indikasjoner:** Behandling av motoriske fluktuasjoner (on-off-fenomen) hos pasienter med Parkinsons sykdom, som ikke blir tilstrekkelig kontrollert med orale antiparkinsonmidler.

**Oppbevaring og holdbarhet:** Fra et mikrobiologisk synspunkt bør preparatet brukes omgående etter åpning. Preparatet kan oppbevares i minipumpe og/eller sprøytepumpe og administreres i løpet av inntil 24 timer uten begrensninger mht. oppbevaringstemperatur. Bruker er ansvarlig ved andre lagringstider og -forhold.

**Pakninger og priser:** 5 × 20 ml (hettegl.) kr 1957,20.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Dacepton «EVER Pharma»

## Aripiprazole «Sandoz»

C *Antipsykotikum.*

ATC-nr.: N05A X12

T **TABLETTER 5 mg, 10 mg, 15 mg og 30 mg: Hver tablett inneh.:** Aripiprazol 5 mg, resp. 10 mg, 15 mg og 30 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 5 mg: Indigokarmin (E 132). 10 mg og 30 mg: Rødt jernoksid (E 172). 15 mg: Gult jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** Schizofreni hos voksne og ungdom ≥15 år. Moderat til alvorlig manisk episode ved bipolar I lidelse og forebygging av tilbakefall med nye maniske episoder hos voksne som i hovedsak tidligere har hatt maniske episoder, hvor de maniske episodene responderte på aripiprazolbehandling. Opptil 12 ukers behandling av moderat til alvorlig manisk episode ved bipolar I lidelse hos ungdom ≥13 år.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør tas til samme tid hver dag. Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele sammen med vann.

**Pakninger og priser:** **5 mg:** 14 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 283,40 (trinnspris: kr 197,80). 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 530,60 (trinnspris: kr 359,40). 56 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 969,20 (trinnspris: kr 682,60). **10 mg:** 14 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 283,40 (trinnspris: kr 197,80). 56 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 969,20 (trinnspris: kr 682,60). **15 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 559,80 (trinnspris: kr 363,00). 56 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1073,70 (trinnspris: kr 689,80). **30 mg:** 56 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 2006,90 (trinnspris: kr 1298,20).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N05A X12\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Abilify «Otsuka Pharmaceutical»

## Aripiprazole Accord «Accord»

C *Antipsykotikum.*

ATC-nr.: N05A X12

T **TABLETTER 5 mg, 10 mg, 15 mg og 30 mg: Hver tablett inneh.:** Aripiprazol 5 mg, resp. 10 mg, 15 mg og 30 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: 5 mg: Indigotin (E 132). 10 mg og 30 mg: Rødt jernoksid (E 172). 15 mg: Gult jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** Schizofreni hos voksne og ungdom ≥15 år. Moderat til alvorlig manisk episode ved bipolar I lidelse og forebygging av tilbakefall med nye maniske episoder hos voksne som i hovedsak tidligere har hatt maniske episoder, hvor de maniske episodene responderte på aripiprazolbe-



handling. Opptil 12-ukers behandling av moderat til alvorlig manisk episode ved bipolar I lidelse hos ungdom  $\geq 13$  år.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat.

**Pakninger og priser:** **5 mg:** 14 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 283,40 (trinnspris: kr 197,80). 28 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 530,60 (trinnspris: kr 359,40). 56 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 969,20 (trinnspris: kr 682,60). **10 mg:** 14 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 283,40 (trinnspris: kr 197,80). 56 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 969,20 (trinnspris: kr 682,60). **15 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 559,80 (trinnspris: kr 363,00). 56 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 1073,70 (trinnspris: kr 689,80). **30 mg:** 56 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 2006,90 (trinnspris: kr 1298,20).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N05A X12\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Abilify «Otsuka Pharmaceutical»

## Atazanavir Accord «Accord»

C **Antiviralt middel, proteasehemmer.** ATC-nr.: J05A E08

H **KAPSLER, harde 200 mg og 300 mg:** Hver kapsel inneh.: Atazanavirsulfat tilsv. atazanavir 200 mg og 300 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Paraoransje FCF (E 110).

**Indikasjoner:** Behandling av hiv-1-infiserte voksne og barn  $\geq 6$  år, gitt sammen med lavdose ritonavir og i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Skal tas med mat. Skal svelges hele.

**Pakninger og priser:** **200 mg:** 60 stk.<sup>1</sup> (bister) kr 4686,90. **300 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (bister) kr 4621,50.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>H-resept: J05A E08\_1 Atazanavir

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Reyataz «Bristol-Myers Squibb»

## Atomoxetine «Sandoz»

C **Sentralt virkende sympatomimetikum.** ATC-nr.: N06B A09

T **KAPSLER, harde 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg og 100 mg:** Hver kapsel inneh.: Atomoksetin tilsv. atomoksetinhydroklorid 11,43 mg, resp. 20,57 mg, 28,57 mg, 45,71 mg, 68,57 mg, 91,42 mg og 114,28 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigotin (E 132), jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Behandling av «Attention Deficit/Hyperactivity Disorder» (ADHD) hos barn  $\geq 6$  år, ungdom og voksne som del av et omfattende behandlingsprogram. Behandlingen skal startes av lege med relevant kompetanse og erfaring i behandling av ADHD, f.eks. barnelege, barne-/ungdomspsykiater eller psykiater. Diagnosen bør stilles iht. gjeldende DSM-kriterier eller ICD-retningslinjer. Hos voksne skal det bekreftes at symptomer på ADHD var tilstede i barndommen. Tredjeparts bekreftelse er ønskelig og behandling med preparatet bør ikke startes når verifisering av ADHD-symptomer i barndommen er usikker. Diagnosen kan ikke stilles utelukkende på grunnlag av ett eller flere symptomer på ADHD. Basert på klinisk vurdering, skal pasientene minimum ha ADHD av moderat alvorlighetsgrad indikert av minst moderat nedsatt funksjon i 2 eller flere situasjoner (f.eks. sosial, akademisk og/eller yrkesmessig funksjon), som påvirker flere aspekter av vedkommendes liv. Et omfattende behandlingsprogram bør innebære psykologiske, pedagogiske og sosiale tiltak. Dette bør være rettet mot å stabilisere pasienter med atferdssyndrom karakterisert ved symptomer som kan inkludere kroniske problemer med å beholde konsentrasjonen over tid, at man blir lett distraheret, følelsesmessig labilitet, impulsivitet, moderat til alvorlig hyperaktivitet, mindre nevrologiske tegn og unormal EEG. Læringsevnen kan, men behøver ikke være svekket. Medikamentell behandling er ikke indisert for alle pasienter med dette syndromet, og beslutningen om å benytte legemidler må baseres på grundig vurdering av alvorlighetsgrad av den enkelte pasients symptomer og reduksjon i funksjon, i forhold til pasientens alder og varighet av symptomene.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan gis som engangsdosering om morgenen. Ved utilstrekkelig klinisk respons (tolerabilitet (f.eks. kvalme eller søvnighet) eller effekt), kan dosen deles og tas morgen og sen ettermiddag eller tidlig kveld. Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele. Skal ikke åpnes.

**Pakninger og priser:** **10 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (bliester) kr 762,00 (trinnspris: kr 371,90). **18 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (bliester) kr 762,00 (trinnspris: kr 371,90). **25 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (bliester) kr 762,00 (trinnspris: kr 376,50). **40 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (bliester) kr 772,70 (trinnspris: kr 376,50). **60 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (bliester) kr 772,70 (trinnspris: kr 381,40). **80 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (bliester) kr 916,30 (trinnspris: kr 493,50). **100 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (bliester) kr 1024,00 (trinnspris: kr 504,20).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N06B A09\_1 i Refusjonslisten.

Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Strattera «Lilly»

## Atomoxetine Teva «Teva»

C *Sentralt virkende sympatomimetikum.*

ATC-nr.: N06B A09

T **KAPSLER, harde 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg og 100 mg:** Hver kapsel inneholder Atomoksetinhydroklorid tilsv. atomoksetin 10 mg, resp. 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg og 100 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 18 mg: Gult jernoksid (E 172). 25 mg og 40 mg: Indigotin (E 132), svart jernoksid (E 172). 60 mg: Indigotin (E 132), gult og svart jernoksid (E 172). 80 mg og 100 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172). Alle styrker: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Behandling av «Attention Deficit/Hyperactivity Disorder» (ADHD) hos barn  $\geq 6$  år, ungdom og voksne som del av et omfattende behandlingsprogram. Behandlingen skal startes av lege med relevant kompetanse og erfaring i behandling av ADHD, f.eks. barnelege, barne-/ungdomspsykiater eller psykiater. Diagnosen bør stilles iht. gjeldende DSM-kriterier eller ICD-retningslinjer. Hos voksne skal det bekreftes at symptomer på ADHD var tilstede i barndommen. Tredjeparts bekreftelse er ønskelig, og behandling bør ikke startes når verifisering av ADHD-symptomer i barndommen er usikker. Diagnosen kan ikke stilles utelukkende på grunnlag av ett eller flere symptomer på ADHD. Basert på klinisk vurdering skal pasienten minimum ha ADHD av moderat alvorlighetsgrad indikert av minst moderat nedsatt funksjon i 2 eller flere situasjoner (f.eks. sosial, akademisk og/eller yrkesmessig funksjon), som påvirker flere aspekter av vedkommendes liv. Et omfattende behandlingsprogram bør innebære psykologiske, pedagogiske og sosiale tiltak. Dette bør være rettet mot å stabilisere pasienter med atferdssyndrom karakterisert ved kroniske problemer med å beholde konsentrasjonen over tid, at man blir lett distrauert, følelsesmessig labilitet, impulsivitet, moderat til alvorlig hyperaktivitet, mindre nevrologiske tegn og unormal EEG. Læringsevnen kan, men behøver ikke være svekket. Medikamentell behandling er ikke indisert for alle pasienter med dette syndromet, og beslutningen om å benytte legemidler må baseres på grundig vurdering av alvorlighetsgrad av den enkelte pasients symptomer og reduksjon i funksjon, i forhold til pasientens alder og varighet av symptomene.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan gis som engangsdosering om morgenen. Ved utilstrekkelig klinisk respons (toleranse (f.eks. kvalme eller søvnighet) eller effekt), kan dosen deles og tas morgen og sen ettermiddag eller tidlig kveld. Barn bør ikke ta legemidlet uten hjelp fra en voksen. Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele. Skal ikke åpnes, og innholdet skal ikke tas ut og inntas på annen måte.

**Pakninger og priser:** **10 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 762,00 (trinnpris: kr 371,90). **18 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 762,00 (trinnpris: kr 371,90). **25 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 762,00 (trinnpris: kr 376,50). **40 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 772,70 (trinnpris: kr 376,50). **60 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 772,70 (trinnpris: kr 381,40). **80 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 916,30 (trinnpris: kr 493,50). **100 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1024,00 (trinnpris: kr 504,20).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N06B A09\_1 i Refusjonslisten.

Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Strattera «Lilly»

## Atorvastatin «Mylan»

C *Lipidmodifiserende middel, HMG-CoA-reduktasehemmer.*

ATC-nr.: C10A A05

T **TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg, 20 mg, 40 mg og 80 mg:** Hver tablett inneholder Atorvastatinkalsiumtrihydrat tilsv. atorvastatin 10 mg, resp. 20 mg, 40 mg og 80 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** *Hyperkolesterolemi:* Indisert som tillegg til diett for reduksjon av forhøyet total kolesterol (total-C), LDL-kolesterol (LDL-C), apolipoprotein B og triglyserider hos voksne, ungdom og barn  $\geq 10$  år med primær hyperkolesterolemi, inkl. familiær hyperkolesterolemi (heterozygot type) eller kombinert (blandet) hyperlipidemi (tilsv. type IIa og IIb i Fredricksons klassifisering), når respons på diett og andre ikke-farmakologiske tiltak er utilstrekkelig. Atorvastatin er også indisert for reduksjon av total-C og LDL-C hos voksne med homozygot familiær hyperkolesterolemi som tillegg til annen lipidsenkende behandling (f.eks. LDL-aferease), eller hvis slik behandling ikke er tilgjengelig. *Forebygging av kardiovaskulær sykdom:* Forebygging av kardiovaskulære hendelser hos voksne med antatt høy risiko for en første kardiovaskulær komplikasjon, som et tillegg til korrigering av andre risikofaktorer.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas 1 gang daglig når som helst på dagen, men helst til samme tid hver dag. Tas med eller uten mat. Samtidig inntak av grapefrukt eller grapefruktjuice bør unngås. Skal svelges hele med litt vann.

**Pakninger og priser:** **10 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 88,20 (trinnpris: kr 50,20). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 209,40 (trinnpris: kr 82,20). **20 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 113,60 (trinnpris: kr 57,30). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 209,40 (trinnpris: kr 82,20).

ter) kr 294,10 (trinnpris: kr 106,60). **40 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 143,10 (trinnpris: kr 60,20). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 392,40 (trinnpris: kr 116,30). **80 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 706,70 (trinnpris: kr 169,70).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C10A A05\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Lipitor «Pfizer»

## Atorvastatin Krka «KRKA»

C *Lipidmodifiserende middel, HMG-CoA-reduktasehemmer.* ATC-nr.: C10A A05

T **TABLETTER, filmdrasjerte 80 mg:** Hver tablett inneh.: Atorvastatinkalsium tilsv. atorvastatin 80 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** *Hyperkolesterolemi:* Indisert som tillegg til diett for reduksjon av forhøyet total kolesterol, LDL-kolesterol, apolipoprotein B og triglyserider hos voksne, ungdom og barn >10 år med primær hyperkolesterolemi, inkl. familiær hyperkolesterolemi (heterozygot variant) eller kombinert (blandet) hyperlipidemi (tilsvarende type IIa og IIb i Fredricksons klassifisering), når respons på diett og andre ikke-farmakologiske tiltak er utilstrekkelig. Atorvastatin Krka er også indisert for å redusere total kolesterol og LDL-kolesterol hos pasienter med homozygot familiær hyperkolesterolemi som tillegg til annen lipidsenkende behandling (f.eks. LDL-aferease) eller hvis slik behandling ikke er tilgjengelig. *Forebygging av kardiovaskulær sykdom:* Forebygging av kardiovaskulære hendelser hos voksne med antatt høy risiko for en første kardiovaskulær hendelse, som tillegg til korrigering av andre risikofaktorer.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Hele døgndosen kan tas på en gang når som helst på dagen. Tas med eller uten mat. Samtidig inntak av grapefrukt eller grapefruktjuice bør unngås. Skal svelges hele med vann.

**Pakninger og priser:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 706,70 (trinnpris: kr 169,70).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C10A A05\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Lipitor «Pfizer»

## Atosiban «Stragen»

C *Oksytocinantagonist.* ATC-nr.: G02C X01

**INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 6,75 mg/0,9 ml: 1 ml inneh.:** Atosiban 7,5 mg, mannitol, saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.

**KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 37,5 mg/5 ml: 1 ml inneh.:** Atosiban 7,5 mg, mannitol, saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.

**Indikasjoner:** Utsettelse av truende prematur fødsel hos gravide voksne med regelmessige uteruskontraksjoner med minst 30 sekunders varighet og hyppighet på ≥4 pr. 30 minutter, cervikal dilatasjon på 1-3 cm (0-3 hos nullipara) og utflating på ≥50%, gestasjonsalder fra 24-33 fullgatte uker og normal føtal hjerterefrekvens.

**Pakninger og priser:** *Injeksjonsvæske:* 0,9 ml (hettegl.) kr 324,50. *Konsentrat til infusjonsvæske:* 5 ml (hettegl.) kr 1031,70.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Tractocile «Ferring Pharmaceuticals A/S»

## Atosiban Accord «Accord»

C *Oksytocinantagonist.* ATC-nr.: G02C X01

**KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 37,5 mg/5 ml: 1 ml inneh.:** Atosiban (som acetat) 7,5 mg, mannitol, saltsyrekonsentrat og vann til injeksjonsvæsker.

**Indikasjoner:** Indisert for å forsinke overhengende prematur forløsning hos gravide voksne med regelmessige uteruskontraksjoner av minst 30 sekunders varighet med en rate på ≥4 pr. 30 minutter, en livmorhalsutvidelse på 1-3 cm (0-3 hos nulliparas) og en utflating på ≥50%, en gestasjonsalder fra 24-33 fullgatte uker og en normal føtal hjerterefrekvens.

**Pakninger og priser:** 5 ml (hettegl.) kr 1031,70.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Tractocile «Ferring Pharmaceuticals A/S»

## Atosiban SUN «SUN Pharma»

C *Oksytocinantagonist.* ATC-nr.: G02C X01

**INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 6,75 mg/0,9 ml: 1 ml inneh.:** Atosiban 7,5 mg, mannitol, saltsyre 1 M, vann til injeksjonsvæsker.

**KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 37,5 mg/5 ml: 1 ml inneh.:** Atosiban 7,5 mg, mannitol, saltsyre 1 M, vann til injeksjonsvæsker.

**Indikasjoner:** Utsettelse av truende prematur fødsel hos gravide voksne med regelmessige uteruskontraksjoner med minst 30 sekunders varighet og en hyppighet på  $\geq 4$  pr. 30 minutter, cervikal dilatasjon på 1-3 cm (0-3 hos nullipara) og utflating på  $\geq 50\%$ , gestasjonsalder fra 24-33 fullgatte uker og en normal føtal hjerterefrekvens.

**Pakninger og priser:** *Injeksjonsvæske:* 0,9 ml (hettegl.) kr 329,20. *Konsentrat til infusjonsvæske:* 5 ml (hettegl.) kr 1031,70.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Tractocile «Ferring Pharmaceuticals A/S»

## Baklofen «Mylan»

C *Spasmolytikum.* ATC-nr.: M03B X01

T **TABLETTER 10 mg og 25 mg:** Hver tablett inneh.: Baklofen 10 mg, resp. 25 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer.

△ **Indikasjoner:** Spastisitet i skjelettmuskulaturen som skyldes sykdommer eller skader i medulla spinalis, f.eks. multipl sklerose og traumatisk myelopati. Cerebral spastisitet. *Barn og ungdom <18 år:* Symptomatisk behandling av spastisitet av cerebral årsak, spesielt pga. infantil cerebral parese, samt etter cerebrovaskulære hendelser eller ved tilstedeværelse av neoplastiske eller degenerative hjernesykdommer. Symptomatisk behandling av muskelspasmer som oppstår ved ryggmargssykdommer av infeksjons, degenerativ, traumatisk, neoplastisk eller ukjent årsak slik som multipl sklerose, spastisk spinalparalyse, amyotrofisk lateralsklerose, syringomyeli, transvers myelitt, traumatisk paraplegi eller paraparese, og kompresjon av ryggmargen.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør tas med mat eller melk, for å unngå gastrointestinale bivirkninger. Kan deles (delestrek).

**Pakninger og priser:** **10 mg:** 50 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 86,50. **25 mg:** 50 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 154,90.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se M03B X01\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Lioresal «Novartis»

## Bendamustine Accord «Accord»

C *Cytostatikum.* ATC-nr.: L01A A09

**PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 25 mg og 100 mg:** Hvert hetteglass inneh.: Bendamustinhidroklorid 25 mg, resp. 100 mg, mannitol.

**Indikasjoner:** Førstelinjbehandling av kronisk lymfatisk leukemi (Binetstadium B eller C) hos pasienter, hvor kombinasjonsbehandling med fludarabin ikke er egnet. Indolent non-Hodgkin lymfom som monoterapi hos pasienter som har progrediert under eller innen 6 måneder etter behandling med rituksimab eller et regime med rituksimab. Førstelinjbehandling av myelomatose (Durie-Salmon stadium II med progresjon eller stadium III) i kombinasjon med prednison til pasienter >65 år hvor autolog stamcelletransplantasjon ikke er aktuelt, og som har klinisk nevropati ved diagnostetidspunktet som utelukker bruk av behandling som inneholder talidomid eller bortezomib.

**Pakninger og priser:** **25 mg:** 5 stk. (hettegl.) kr 3943,60. **100 mg:** 5 stk. (hettegl.) kr 15665,50.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Levact «Astellas»

## Bendamustine Fresenius Kabi «Fresenius Kabi»

C *Cytostatikum.* ATC-nr.: L01A A09

**PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 25 mg og 100 mg:**  
*Hvert hetteglass inneh.:* Bendamustinhidroklorid 25 mg, resp. 100 mg, mannitol.

**Indikasjoner:** Førstelinjebehandling av kronisk lymfatisk leukemi (Binetstadium B eller C) hos pasienter, hvor kombinasjonsbehandling med fludarabin ikke er egnet. Indolent non-Hodgkins lymfom som monoterapi hos pasienter som har progrediert under eller innen 6 måneder etter behandling med rituksimab eller et rituksimabholdig regime. Førstelinjebehandling av myelomatose (Durie-Salmon stadium II med progresjon eller stadium III) i kombinasjon med prednison hos pasienter >65 år hvor autolog stamcelletransplantasjon ikke er aktuelt, og som har klinisk nevropati ved diagnosetidspunktet som utelukker bruk av talidomid eller bortezomib.

**Pakninger og priser:** 25 mg: 5 stk. (hettegl.) kr 3943,60. 100 mg: 5 stk. (hettegl.) kr 15665,50.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Levact «Astellas»

## Benzylpenicillin «Panpharma»

C *Antibiotikum.* ATC-nr.: J01C E01

T **PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,6 g, 1,2 g og 3 g:** *Hvert hetteglass inneh.:* Benzylpenicillinnatrium 0,6 g (1 mill. IE), resp. 1,2 g (2 mill. IE) og 3 g (5 mill. IE).  
**Indikasjoner:** Infeksjoner forårsaket av benzylpenicillinfølsomme bakterier. Offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler bør også følges.

**Pakninger og priser:** 0,6 g: 10 × 0,6 g<sup>1</sup> (hettegl.) kr 130,20. 1,2 g: 10 × 1,2 g<sup>1</sup> (hettegl.) kr 169,60. 3 g: 10 × 3 g<sup>1</sup> (hettegl.) kr 405,50.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se J01C E01\_2 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Penicillin «Actavis»

## Bevacomb «Actavis»

C *Kalsiumantagonist og angiotensin II-antagonist.* ATC-nr.: C09D B01

T **TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg/80 mg, 5 mg/160 mg og 10 mg/160 mg:** *Hver tablett inneh.:* Amlodipinbesilat tilsv. amlodipin 5 mg, resp. 5 mg og 10 mg, valsartan 80 mg, resp. 160 mg og 160 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Titandioksid (E 171). 5 mg/80 mg og 5 mg/160 mg: Gult jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** Behandling av essensiell hypertensjon hos voksne som ikke oppnår tilstrekkelig blodtrykkskontroll med amlodipin eller valsartan monoterapi.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas med eller uten mat, men ikke sammen med grapefrukt/grapefruktjuice. Anbefalt å svelge tablettene hel med et glass vann, helst til samme tid hver dag.

**Pakninger og priser:** 5 mg/80 mg: 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 166,00. 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 464,70. 5 mg/160 mg: 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 178,70. 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 571,10. 10 mg/160 mg: 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 192,30. 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 625,20.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C09D B01\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Exforge «Novartis»

## Bicalutamide Bluefish 150 mg «Bluefish»

C *Antiandrogen.* ATC-nr.: L02B B03

T **TABLETTER, filmdrasjerte 150 mg:** *Hver tablett inneh.:* Bicalutamid 150 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Alene eller som adjuvans til radikal prostatektomi eller strålebehandling av pasienter med lokal prostatakraft med høy risiko for sykdomsprogresjon.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Svelges hele med væske. Skal ikke knuses/deles.

**Pakninger og priser:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1554,30 (trinnspris: kr 521,50). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 5096,40 (trinnspris: kr 1653,80).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se L02B B03\_2 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Casodex 150 mg «AstraZeneca»

## Bicalutamide Bluefish 50 mg «Bluefish»

- C** *Antiandrogen.* ATC-nr.: L02B B03
- T** **TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg:** Hver tablett inneholder: Bicalutamid 50 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).  
**Indikasjoner:** Behandling av avansert prostatakreft i kombinasjon med behandling med luteiniserende, hormonfrigjørende hormonanalog (LHRH) eller kirurgisk kastrasjon.  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Svelges hele med væske. Skal ikke knuses/deles.  
**Pakninger og priser:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1554,30 (trinnpris: kr 223,50). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 5096,40 (trinnpris: kr 660,40).  
**Refusjon:**  
<sup>1</sup>Se L02B B03\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Casodex 50 mg «AstraZeneca»

## Bloxazoc «KRKA»

- C** *Selektiv betablokker.* ATC-nr.: C07A B02
- T** **DEPOTTABLETTER, filmdrasjerte 25 mg, 50 mg og 100 mg:** Hver depottablett inneholder: Metoprololsuksinat tilsv. metoprololtartrat 25 mg, resp. 50 mg og 100 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).  
**Indikasjoner:** *Voksne:* Hypertensjon. Angina pectoris. Hjerterytmier, særlig inkl. supraventrikulær takykardi, reduksjon av ventrikulær frekvens ved atrieflimmer og ved ventrikulære ekstrasystoler. Funksjonell hjertesykdom med palpitasjoner. Forebygging av hjertedød og gjentatt infarkt etter akutt fase av myokardinfarkt. Migreneprofylakse. Stabil, kronisk, symptomatisk hjertesvikt med nedsatt systolisk venstre ventrikelfunksjon. *Barn og ungdom 6-18 år:* Behandling av hypertensjon.  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas 1 gang daglig, fortrinnsvis om morgenen. Svelges med minst 1/2 glass væske. Kan tas med eller uten mat. Skal ikke tygges eller knuses (gjelder for både hele og delte depottabletter). *25 mg:* Kan deles i like doser (delestrek). *50 mg og 100 mg:* Har delestrek, men den er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge depottabletten, og ikke for å dele den i like doser.  
**Pakninger og priser:** *25 mg:* 100 stk. (blister) kr 173,40. *50 mg:* 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 173,40 (trinnpris: kr 98,70). *100 mg:* 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 188,90 (trinnpris: kr 108,90).  
**Refusjon:**  
<sup>1</sup>Se C07A B02\_3 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Selo-Zok «Recordati»

## Bosentan Accord «Accord»

- C** *Endotelinreseptorantagonist.* ATC-nr.: C02K X01
- H** **TABLETTER, filmdrasjerte 62,5 mg og 125 mg:** Hver tablett inneholder: Bosentanmonohydrat tilsv. bosentan 62,5 mg, resp. 125 mg. Fargestoff: Jernoksider (E 172), titandioksid (E 171).  
**Indikasjoner:** Behandling av pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) for å forbedre treningskapasiteten og symptomer hos pasienter med WHO funksjonsklasse III. Effekt er vist ved primær (idiopatisk og arvelig) PAH, PAH sekundært til skleroderma uten signifikant interstitiell lungesykdom og PAH forbundet med medfødte systemisk-til-lunge-shunter og Eisenmengers fysiologi. Noen forbedringer er også påvist hos pasienter med PAH WHO funksjonsklasse II. Også indisert for å minske antall nye digitale sår hos pasienter med systemisk sklerose og aktive digitale sår.  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Skal svelges med vann.  
**Pakninger og priser:** *62,5 mg:* 56 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 15310,20. *125 mg:* 56 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 15310,20.  
**Refusjon:**  
<sup>1</sup>H-resept: C02K X01\_1 Bosentan

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Tracleer «Janssen»

## Bosentan Aurobindo «Aurobindo»

C *Endotelinreseptorantagonist.* ATC-nr.: C02K X01

H **TABLETTER, filmdrasjerte 62,5 mg og 125 mg:** Hver tablett inneh.: Bosentanmonohydrat tilsv. bosentan 62,5 mg, resp. 125 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksider (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Behandling av pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) for å forbedre treningskapasiteten og symptomer hos pasienter med WHO funksjonsklasse III. Effekt er vist ved primær (idiopatisk og arvelig) PAH, PAH sekundært til skleroderma uten signifikant interstitiell pulmonal sykdom og PAH forbundet med medfødte systemisk-til-pulmonal shunter og Eisenmenger fysiologi. En viss bedring er også vist hos pasienter med PAH, WHO funksjonsgruppe II. Også indisert for reduksjon av antall nye digitale sår hos pasienter med systemisk sklerose og aktiv digitalsårildelse.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas morgen og kveld, med eller uten mat. Svelges med vann. **Pakninger og priser:** 62,5 mg: 56 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 11491,70. 125 mg: 56 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 11491,70.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>H-resept: C02K X01\_1 Bosentan

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Tracleer «Janssen»

## Bosentan Sandoz «Sandoz»

C *Endotelinreseptorantagonist.* ATC-nr.: C02K X01

H **TABLETTER, filmdrasjerte 62,5 mg og 125 mg:** Hver tablett inneh.: Bosentan 62,5 mg, resp. 125 mg (tilsv. 64,541 mg, resp. 129,082 mg bosentan monohydrat), hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E171), gult, rødt og svart jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** Behandling av pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) for å forbedre treningskapasiteten og symptomer hos pasienter med WHO funksjonsklasse III. Effekten er vist ved: Primær (idiopatisk og arvelig) pulmonal arteriell hypertensjon, pulmonal arteriell hypertensjon sekundært til skleroderma uten signifikant interstitiell pulmonal lidelse og ved pulmonal arteriell hypertensjon forbundet med medfødte systemisk-til-pulmonal shunter og Eisenmengers fysiologi. *Generelt:* En viss bedring er også vist hos pasienter med pulmonal arteriell hypertensjon WHO funksjonsklasse II, se SPC. Preparatet er også indisert for å redusere antall nye digitale sår hos pasienter med systemisk sklerose og aktiv digitalsårildelse, se SPC.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Skal svelges med vann og tas morgen og kveld. Kan tas med eller uten mat.

**Pakninger og priser:** 62,5 mg: 56 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 15310,20. 125 mg: 56 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 15310,20.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>H-resept: C02K X01\_1 Bosentan

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Tracleer «Janssen»

## Bromheksin Norfri «Evolan Pharma»

CF *Ekspektorerende middel.* ATC-nr.: R05C B02

**MIKSTUR 0,8 mg/ml og 1,6 mg/ml: 1 ml inneh.:** Bromheksinhydroklorid 0,8 mg, resp. 1,6 mg, metyl- og propylparahydroksibenzoat (E 218 og E 216), sorbitol, sakkarinatrium, hjelpestoffer, renset vann. Kirsebærsmak.

**Indikasjoner:** Luftveislidelser med patologisk seig slimdannelse: Trakeobronkitt, bronkittisk emfysem, astmatisk bronkitt, pneumokonioser og kronisk betennelsesaktige lungesykdommer, bronkiektasier. Ved sputumprovokasjon for undersøkning på TB eller tumorceller. **Re-septfri bruk:** Korttidsbehandling av seigt slim (bronkialsekret) i forbindelse med vedvarende luftveissykdommer.

**Pakninger uten resept:** Mikstur 0,8 mg/ml 125 ml og 1,6 mg/ml inntil 250 ml er unntatt fra reseptplikt.

**Pakninger og priser:** 0,8 mg/ml: 125 ml kr \*. 1,6 mg/ml: 250 ml kr \*.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Bisolvon «sanofi-aventis»

## Bugnanto «Sandoz»

- A *Opioidanalgetikum.* ATC-nr.: N02A E01
- T **DEPOTPLASTER 15 µg/time:** Hvert depotplaster inneh.: Buprenorfin 15 mg (18,75 cm<sup>2</sup>), hjelpestoffer.
- △ **Indikasjoner:** Behandling av moderate, ikke-maligne smerter hos voksne der opioidbehandling er nødvendig for å oppnå adekvat smertelindring. Ikke egnet til behandling av akutte smerter.
- Pakninger og priser:** 4 stk.<sup>1</sup> kr 428,00 (trinnspris: kr 320,30).
- Refusjon:**  
<sup>1</sup>Se N02A E01\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Norspan «Mundipharma»

## Bunaliect «Sandoz»

- A *Substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet.* ATC-nr.: N07B C51
- SUBLINGVALTABLETTER 2 mg/0,5 mg og 8 mg/2 mg:** Hver sublingvaltablett inneh.: Buprenorfin (som hydroklorid) 2 mg, resp. 8 mg, nalokson (som hydrokloriddihydrat) 0,5 mg, resp. 2 mg, laktose, hjelpestoffer.
- △ **Indikasjoner:** Substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet, i sammenheng med medisinsk, sosial og psykologisk behandling. Hensikten med komponenten nalokson er å hindre i.v. misbruk. Behandlingen er beregnet for bruk hos voksne og ungdom >15 år som har samtykket i behandling av sin avhengighet.
- Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Pasienten må opplyses om at sublingval bruk er den eneste effektive og trygge administreringsmåten. Tablettene skal plasseres under tungen til den er helt oppløst. Ikke svelg eller innta mat/drikke før tablettene er fullstendig oppløst. Dosen kan bestå av flere tabletter av ulik styrke, som kan tas samtidig eller i 2 doser. 2. dose skal da tas like etter at 1. dose er oppløst.
- Pakninger og priser:** 2 mg/0,5 mg: 28 stk. (endose) kr 309,30. 8 mg/2 mg: 28 stk. (endose) kr 863,10.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Suboxone «Indivior»

## Bupivacaine Accord «Accord»

- C *Lokalanestetikum.* ATC-nr.: N01B B01
- INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 2,5 mg/ml og 5 mg/ml: 1 ml inneh.:** Bupivakainhydroklorid-monohydrat tilsv. bupivakainhydroklorid 2,5 mg, resp. 5 mg, natriumklorid, natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.
- Indikasjoner:** Kirurgisk anestesi hos voksne og barn >12 år. Akutt smertelindring hos voksne, spedbarn og barn >1 år. Bupivakain brukes for å produsere langvarig lokalanestesi ved bruk av perikutan infiltrasjon, intraartikulær blokkade, perifer(e) nerveblokkade(r) og sentral nerveblokkade (kaudal eller epidural). Bupivakain brukes også til smertelindring under fødsel.
- Pakninger og priser:** 2,5 mg/ml: 20 ml (hettegl.) kr 69,70. 5 mg/ml: 5 × 4 ml (amp.) kr 297,60. 20 ml (hettegl.) kr 73,10.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Marcain «Aspen»

## Buprefarm «Orifarm Generics»

- A *Analgetikum.* ATC-nr.: N02A E01
- T **DEPOTPLASTER 5 µg/time, 10 µg/time og 20 µg/time:** Hvert depotplaster inneh.: Buprenorfin 5 mg (6,25 cm<sup>2</sup>), resp. 10 mg (12,5 cm<sup>2</sup>) og 20 mg (25 cm<sup>2</sup>), hjelpestoffer.
- △ **Indikasjoner:** *Voksne:* Behandling av ikke-malign smerte av moderat intensitet når opioidbehandling er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig smertelindring. Ikke egnet til behandling av akutte smerter.



**Pakninger og priser:** 5 µg/time: 4 stk.<sup>1</sup> kr 164,50 (trinnspris: kr 148,50). 10 µg/time: 4 stk.<sup>1</sup> kr 237,90 (trinnspris: kr 223,20). 20 µg/time: 4 stk.<sup>1</sup> kr 415,80 (trinnspris: kr 360,70).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N02A E01\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Norspan «Mundipharma»

## Buprenorphine Orifarm «Orifarm Generics»

A *Substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet.* ATC-nr.: N07B C01

**SUBLINGVALTABLETTER 2 mg og 8 mg:** Hver sublingvaltablett inneh.: Buprenorfinhydroklorid tilsv. buprenorfin 2 mg, resp. 8 mg, laktose 19 mg, resp. 76 mg, hjelpestoffer.

△ **Indikasjoner:** Substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet, som en del av medisinsk, sosial og psykologisk behandling.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Administreres sublingvalt. Pasienten skal informeres om at sublingval administrering er eneste effektive og sikre administreringsmåte for dette legemidlet. Sublingvaltabletten skal holdes under tungen til den oppløses, vanligvis 5-10 minutter. Skal ikke tas samtidig med mat eller drikke. Skal ikke svelges hel. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses.

**Pakninger og priser:** 2 mg: 7 stk. (blister) kr 131,70. 8 mg: 7 stk. (blister) kr 256,40.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Subutex «Indivior»

## Buprenorphine Sandoz «Sandoz»

A *Substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet.* ATC-nr.: N07B C01

**SUBLINGVALTABLETTER 2 mg og 8 mg:** Hver sublingvaltablett inneh.: Buprenorfin (som buprenorfinhydroklorid) 2 mg, resp. 8 mg, laktose, mannitol, hjelpestoffer.

△ **Indikasjoner:** Substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet, i kombinasjon med medisinsk, sosial og psykologisk behandling. Preparatet er indisert hos voksne og ungdom fra alderen 15 år som har samtykket i behandling av sin avhengighet.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Til sublingval bruk. Legen må opplyse pasienten om at sublingval administrering er eneste effektive og sikre administreringsmåte for dette legemidlet. Skal legges under tungen inntil den oppløses, vanligvis 5-10 minutter. Ikke ta sublingvaltabletten sammen med mat eller drikke. Skal ikke svelges hele. Skal ikke tygges. Skal ikke suges på. Skal ikke knuses. Kan deles i 2 like deler (delestrek).

**Pakninger og priser:** 2 mg: 7 stk. (blister) kr 131,70. 8 mg: 7 stk. (blister) kr 256,40.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Subutex «Indivior»

## Busulfan Fresenius Kabi «Fresenius Kabi»

C *Cytostatikum.* ATC-nr.: L01A B01

**KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 6 mg/ml: 1 ml inneh.:** Busulfan 6 mg, dimetylacetamid, makrogol 400.

**Indikasjoner:** Busulfan fulgt av syklofosfamid (BuCy2) er indisert som forberedende behandling for konvensjonell transplantasjon av hematopoetiske stamceller (HPCT) hos voksne pasienter når kombinasjonen anses som det beste tilgjengelige alternativet. Fludarabin fulgt av Busulfan er indisert som forberedende behandling for transplantasjon av hematopoetiske stamceller (HPCT) hos voksne pasienter som er kandidater for et RIC-regime (kondisjonering med redusert intensitet). Busulfan etterfulgt av syklofosfamid (BuCy4) eller melfalan (BuMel) er indisert som forberedende behandling for konvensjonell transplantasjon av hematopoetiske stamceller hos barn/ungdom.

**Pakninger og priser:** 8 × 10 ml (hettegl.) kr 24622,40.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Busilvex «Pierre Fabre»

## Candemox Comp «Sandoz»

C **Angiotensin II-antagonist og diuretikum.** ATC-nr.: C09D A06

T **TABLETTER 8 mg/12,5 mg, 16 mg/12,5 mg og 32 mg/12,5 mg:** Hver tablett inneholder: Kandesartancileksetil 8 mg, resp. 16 mg og 32 mg, hydroklortiazid 12,5 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: 16/12,5 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172). 32/12,5 mg: Gult, rødt og sort jernoksid (E172).

**Indikasjoner:** Behandling av primær hypertensjon hos voksne med blodtrykk som ikke er optimalt kontrollert med kandesartancileksetil eller hydroklortiazid alene.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Svelges med et glass vann. Bør tas til samme tid hver dag. Kan tas med eller uten mat. Kan deles, men delestreken er kun for å lette delingen som gjør det enklere å svelge tablettene, og ikke for å dele den i like doser.

**Pakninger og priser:** **8 mg/12,5 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 187,80 (trinnspris: kr 61,20). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 541,40 (trinnspris: kr 116,90). **16 mg/12,5 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 187,80 (trinnspris: kr 61,20). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 541,40 (trinnspris: kr 116,90). **32 mg/12,5 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1012,80 (trinnspris: kr 148,10).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C09D A06\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Atacand Plus, Atacand Plus Mite «AstraZeneca»

## Candesartan Krka «KRKA»

C **Angiotensin II-reseptorantagonist.** ATC-nr.: C09C A06

T **TABLETTER 4 mg, 8 mg, 16 mg og 32 mg:** Hver tablett inneholder: Kandesartancileksetil 4 mg, resp. 8 mg, 16 mg og 32 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: 8 mg, 16 mg og 32 mg: Rødt jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** Behandling av essensiell hypertensjon hos voksne. Behandling av voksne hjertesviktpasienter med nedsatt systolisk venstre ventrikkelfunksjon (venstre ventrikkel ejectionsfraksjon ≤40%) som tilleggsbehandling til ACE-hemmere eller når ACE-hemmere ikke tolereres.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Svelges med vann. Kan deles for å lette svelging (delestrek), ikke for å dele i like doser.

**Pakninger og priser:** **4 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 102,10 (trinnspris: kr 51,40). 50 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 153,80 (trinnspris: kr 62,10). **8 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 102,10 (trinnspris: kr 54,00). 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 266,60 (trinnspris: kr 97,10). **16 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 118,30 (trinnspris: kr 58,90). 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 323,60 (trinnspris: kr 111,90). **32 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 163,90 (trinnspris: kr 65,30). 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 483,10 (trinnspris: kr 138,00).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C09C A06\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Atacand «AstraZeneca»

## Candesartan Orion «Orion»

C **Angiotensin II-reseptorantagonist.** ATC-nr.: C09C A06

T **TABLETTER 4 mg, 8 mg, 16 mg og 32 mg:** Hver tablett inneholder: Kandesartancileksetil 4 mg, resp. 8 mg, 16 mg og 32 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 8 mg, 16 mg og 32 mg: Rødt jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** Behandling av essensiell hypertensjon hos voksne. Behandling av voksne hjertesviktpasienter med nedsatt systolisk venstre ventrikkelfunksjon (venstre ventrikkel ejectionsfraksjon ≤40%) når ACE-hemmere ikke tolereres, eller som tilleggsbehandling til ACE-hemmere hos pasienter med symptomatisk hjertesvikt til tross for optimal behandling når mineralokortikoidreseptorantagonister ikke tolereres. Behandling av hypertensjon hos barn og ungdom 6-<18 år.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør tas 1 gang daglig. Kan tas med eller uten mat. Kan deles i 2 like doser (delestrek).

**Pakninger og priser:** **4 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 102,10 (trinnspris: kr 51,40). 50 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 153,80 (trinnspris: kr 62,10). **8 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 102,10 (trinnspris: kr 54,00). 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 266,60 (trinnspris: kr 97,10). **16 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 118,30 (trinnspris: kr 58,90). 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 323,60 (trinnspris: kr 111,90). **32 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 163,90 (trinnspris: kr 65,30). 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 483,10 (trinnspris: kr 138,00).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C09C A06\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Atacand «AstraZeneca»

## Candesartan Sandoz «Sandoz»

C *Angiotensin II-reseptorantagonist.* ATC-nr.: C09C A06

T **TABLETTER 4 mg, 8 mg, 16 mg og 32 mg:** Hver tablett inneholder: Kandesartancileksetil 4 mg, resp. 8 mg, 16 mg og 32 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 8 mg, 16 mg og 32 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Behandling av primær hypertensjon hos voksne. Behandling av hypertensjon hos ungdom og barn >6 år. Behandling av voksne pasienter med hjertesvikt og nedsatt systolisk venstre ventrikkelfunksjon (venstre ventrikkels ejeleksjonsfraksjon ≤40%) når ACE-hemmere ikke tolereres, eller som tilleggshandling til ACE-hemmere hos pasienter med symptomatisk hjertesvikt til tross for optimal behandling når mineralokortikoidreseptorantagonister ikke tolereres.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Skal tas 1 gang daglig med eller uten mat.

**Pakninger og priser:** **4 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 106,80 (trinnspris: kr 52,70). 50 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 153,80 (trinnspris: kr 62,10). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 87,90. **8 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 106,80 (trinnspris: kr 55,50). 50 stk. (endose) kr 153,80. 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 271,30 (trinnspris: kr 98,40). **16 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 124,20 (trinnspris: kr 60,70). 50 stk. (endose) kr 182,80. 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 329,40 (trinnspris: kr 113,50). **32 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 173,00 (trinnspris: kr 67,60). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 492,20 (trinnspris: kr 140,10).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C09C A06\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Atacand «AstraZeneca»

## Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka «KRKA»

C *Angiotensin II-reseptorantagonist og diuretikum.* ATC-nr.: C09D A06

T **TABLETTER 8 mg/12,5 mg, 16 mg/12,5 mg og 32 mg/12,5 mg:** Hver tablett inneholder: Kandesartancileksetil 8 mg, resp. 16 mg og 32 mg, hydroklortiazid 12,5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 16 mg/12,5 mg: Rødt jernoksid (E 172). 32 mg/12,5 mg: Gult jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** Hypertensjon hos voksne med blodtrykk som ikke er optimalt kontrollert med kandesartancileksetil eller hydroklortiazid monoterapi.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Kan deles for å lette svelging (delestrek), ikke for å dele i like doser.

**Pakninger og priser:** **8 mg/12,5 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 177,70 (trinnspris: kr 59,40). 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 531,30 (trinnspris: kr 115,20). **16 mg/12,5 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 177,70 (trinnspris: kr 59,40). 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 531,30 (trinnspris: kr 115,20). **32 mg/12,5 mg:** 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 993,30 (trinnspris: kr 145,80).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C09D A06\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Atacand Plus, Atacand Plus Mite «AstraZeneca»

## Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion «Orion»

C *Angiotensin II-reseptorantagonist og diuretikum.* ATC-nr.: C09D A06

T **TABLETTER 8/12,5 mg og 16/12,5 mg:** Hver tablett inneholder: Kandesartancileksetil 8 mg, resp. 16 mg, hydroklortiazid 12,5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 16/12,5 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** Behandling av essensiell hypertensjon hos voksne der man ikke får optimal kontroll av blodtrykket med kandesartancileksetil- eller hydroklortiazid-monoterapi.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Kan deles i 2 like doser (delestrek).

**Pakninger og priser:** **8/12,5 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 177,70 (trinnspris: kr 59,40). 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 531,30 (trinnspris: kr 115,20). **16/12,5 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 177,70 (trinnspris: kr 59,40). 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 531,30 (trinnspris: kr 115,20).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C09D A06\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Atacand Plus, Atacand Plus Mite «AstraZeneca»

## Capecitabine Accord «Accord»

C *Cytostatikum.* ATC-nr.: L01B C06

H **TABLETTER, filmdrasjerte 150 mg og 500 mg:** Hver tablett inneh.: Kapecitabin 150 mg, resp. 500 mg, vannfri laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), gult og rødt jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** Adjuvant behandling etter kirurgi hos pasienter med stadium III (Duke's stadium C) kolonkreft. Behandling ved metastaserende kolorektalkreft. Førstelinjebehandling ved fremskreden ventrikelkreft i kombinasjon med et platinumbasert regime. I kombinasjon med docetaxel til behandling av pasienter med lokalavansert eller metastaserende brystkreft når behandling med cytotoxisk kjemoterapi har feilet. Tidligere behandling skal ha inkludert et antrasyklin. Som monoterapi til behandling av pasienter med lokalavansert eller metastatisk brystkreft hvor kjemoterapi med taksaner og antrasykliner har sviktet eller ikke er indisert.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Skal svelges hele med vann innen 30 minutter etter mat.

**Pakninger og priser:** 150 mg: 60 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 362,40. 500 mg: 120 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 2193,20.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>H-resept: L01B C06\_2 Kapecitabin

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Xeloda «Roche»

## Carbimazole Orifarm «Orifarm Generics»

C *Tyreostatikum.* ATC-nr.: H03B B01

T **TABLETTER 5 mg:** Hver tablett inneh.: Karbimazol 5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** Langtidsbehandling av tyreotoksikose, Basedows sykdom (Graves' sykdom), særlig tilfeller med mindre, diffus struma eller uten struma. Forbehandling til behandling med radioaktivt jod eller til tyreoidektomi.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas med et glass vann. Kan tas med eller uten mat.

**Pakninger og priser:** 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 186,60.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se H03B B01\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Neo-Mercazole «Amdipharm»

## Carboplatin Fresenius Kabi «Fresenius Kabi»

C *Cytostatikum.* ATC-nr.: L01X A02

**KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml: 1 ml inneh.:** Carboplatin 10 mg, vann til injeksjonsvæsker. pH 5-7. Osmolalitet: 200-300 mosmol/kg.

**Indikasjoner:** Behandling av avansert ovariekarsinom av epitelial opprinnelse som førstelinjebehandling, eller som andrelinjebehandling hvis annen behandling har mislyktes. Behandling av småcellet lungekarsinom.

**Pakninger og priser:** 5 ml (hettegl.) kr 343,40. 15 ml (hettegl.) kr 957,80. 45 ml (hettegl.) kr 2800,90. 60 ml (hettegl.) kr 3722,50.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Carboplatin Accord «Accord»

## Carvedilol Aurobindo «Aurobindo»

C *Alfa- og betablokker.* ATC-nr.: C07A G02

T **TABLETTER, filmdrasjerte 6,25 mg, 12,5 mg og 25 mg:** Hver tablett inneh.: Karvedilol 6,25 mg, resp. 12,5 mg og 25 mg, laktose, sukrose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Høyt blodtrykk. Kronisk angina pectoris (hjertekrampe). Adjuvant behandling av moderat til alvorlig stabil kronisk hjertesvikt.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Ved hjertesvikt bør tablettene tas med mat, for saktere absorpsjon og redusert risiko for ortostatisk hypotensjon. Bør tas med tilstrekkelig væske. Kan deles (delestrek).

**Pakninger og priser:** 6,25 mg: 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 81,60 (trinnpris: kr 50,20). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 187,30 (trinnpris: kr 94,10). 12,5 mg: 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 315,10 (trinnpris: kr 129,30). 25 mg: 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 370,20 (trinnpris: kr 169,40).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C07A G02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Carvedilol HEXAL «HEXAL»

## Caspofungin Lorien «Laboratorios Lorien»

C *Antimykotikum.* ATC-nr.: J02A X04

**PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg og 70 mg:** Hvert hetteglass inneh.: Kaspofungin (som acetat) 50 mg, resp. 70 mg, sukrose, mannitol, saltsyre, natriumhydroksid.

**Indikasjoner:** Behandling av invasiv candidainfeksjon hos voksne eller barn. Behandling av invasiv aspergillose hos voksne eller barn som ikke responderer på eller ikke tåler amfotericin B, lipidformuleringer av amfotericin B og/eller itraconazol. Ingen respons er definert som progresjon av infeksjonen eller ingen bedring etter minst 7 dager med tidligere behandling med terapeutiske doser av effektive antimykotika. Empirisk terapi av antatte soppinfeksjoner (som Candida eller Aspergillus) hos febrile, nøytropene voksne eller barn.

**Pakninger og priser:** 50 mg: 1 stk. (hettegl.) kr 5498,90. 70 mg: 1 stk. (hettegl.) kr 6970,40.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Candidas «MSD»

## Caspofungin Mylan «Mylan Ireland Ltd.»

C *Antimykotikum.* ATC-nr.: J02A X04

**PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg og 70 mg:** Hvert hetteglass inneh.: Kaspofungin (som acetat) 50 mg, resp. 70 mg, sukrose, mannitol, saltsyre, natriumhydroksid og karbondioksid (til pH-justering). Etter rekonstituering med 10,5 ml vann til injeksjonsvæsker inneholder 1 ml med konsentrat 5,2 mg, resp. 7,2 mg kaspofungin.

**Indikasjoner:** -Behandling av invasiv candidainfeksjon hos voksne eller barn. -Behandling av invasiv aspergillose hos voksne eller barn som ikke responderer på eller ikke tåler amfotericin B, lipidformuleringer av amfotericin B og/eller itraconazol. Ingen respons er definert som progresjon av infeksjonen eller ingen bedring etter minst 7 dager med tidligere behandling med terapeutiske doser av effektive antimykotika. -Empirisk terapi av antatte soppinfeksjoner (som Candida eller Aspergillus) hos febrile, nøytropene voksne eller barn.

**Pakninger og priser:** 50 mg: 1 stk. (hettegl.) kr 5498,90. 70 mg: 1 stk. (hettegl.) kr 6970,40.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Candidas «MSD»

## Ceftriaxon Fresenius Kabi «Fresenius Kabi»

C *Antibiotikum.* ATC-nr.: J01D D04

T **PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1 g:** Hvert hetteglass inneh.: Ceftriaksonnatrium tilsv. ceftriakson 1 g.

T **PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 2 g:** Hvert hetteglass inneh.: Ceftriaksonnatrium tilsv. ceftriakson 2 g.

**Indikasjoner:** Behandling av følgende infeksjoner hos voksne og barn, inkl. spedbarn født til termin (fra fødselen): Bakteriell meningitt, ikke-nosokomial pneumoni, nosokomial pneumoni, akutt otitis media, intraabdominal infeksjon, komplisert urinveisinfeksjon (inkl. pyelonefritt), infeksjon i ben og ledd, komplisert hud- og bløtvevsinfeksjon, gonoré, syfilis, bakteriell endokarditt. Kan brukes til: Behandling av akutt eksaserbasjon av kronisk obstruktiv lungesykdom hos voksne, behandling av disseminert Lyme-borreliose (tidlig stadium (II) og sent stadium (III)) hos voksne og barn, inkl. nyfødte fra  $\geq 15$  dager, profylaktisk mot infeksjoner før kirurgiske inngrep, nøytropene pasienter med feber som antas å være forårsaket av en bakteriell infeksjon, pasienter med bakteriemis som oppstår i forbindelse med, eller der det er mistanke om forbindelse med, noen av ovenstående infeksjoner. Skal administreres sammen med andre antibiotika dersom antatt kausale bakterier ikke er følsomme for ceftriakson.

**Utleveringsbestemmelser:** Skal kun utleveres til bruk på menneske.

**Pakninger og priser:** *Pulver til infusjons-/injeksjonsvæske: 1 g:* 10 stk.<sup>1</sup> (hettegl.) kr 1298,50. *Pulver til infusjonsvæske: 2 g:* 10 stk.<sup>1</sup> (hettegl.) kr 2471,50.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se J01D D04\_2 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Ceftriaxon «Stragen»

## Cefuroxim «Stragen»

C *Antibiotikum.* ATC-nr.: J01D C02

T **PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 750 mg og 1,5 g:** Hvert hetteglass inneh.: Cefuroksimmatrium tilsv. cefuroksim 750 mg, resp. 1,5 g. Oppløst i sterilt vann gir pH 6-8,5.

T **PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 250 mg:** Hvert hetteglass inneh.: Cefuroksimmatrium tilsv. cefuroksim 250 mg. Oppløst i sterilt vann gir pH 6-8,5.

**Indikasjoner:** Voksne og barn, inkl. spedbarn (fra fødselen av): Pneumoni ervervet utenfor sykehus, akutt forverring av kronisk bronkitt, kompliserte urinveisinfeksjoner (inkl. pyelonefritt), bløtdelsinfeksjoner (cellulitt, erysipelas og sårinfeksjoner), intraabdominale infeksjoner, profylakse mot infeksjon ved gastrointestinal (inkl. øsofagus), ortopedisk, kardiovaskulær og gynekologisk kirurgi (inkl. keisersnitt). I behandling og profylakse av infeksjoner hvor det er svært sannsynlig at det vil forekomme anaerobe organismer, bør cefuroksim administreres som tillegg til egnede antibakterielle legemidler. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle legemidler.

**Pakninger og priser:** *Pulver til infusjons-/injeksjonsvæske: 750 mg:* 10 stk.<sup>1</sup> (hettegl.) kr 344,00. *1,5 g:* 10 stk.<sup>1</sup> (hettegl.) kr 652,20. *Pulver til injeksjonsvæske: 250 mg:* 10 stk.<sup>1</sup> (hettegl.) kr 156,80.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se J01D C02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Zinacef «GlaxoSmithKline»

## Cefuroxim Fresenius Kabi «Fresenius Kabi»

C *Antibiotikum.* ATC-nr.: J01D C02

T **PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 750 mg og 1,5 g:** Hvert hetteglass inneh.: Cefuroxim. natr. aeqv. cefuroxim. 750 mg, resp. 1,5 g.

**Indikasjoner:** Indisert til behandling av følgende infeksjoner hos voksne og barn, inkl. nyfødte (fra fødsel): Samfunnservert pneumoni, akutte eksaserbasjoner av kronisk bronkitt, kompliserte urinveisinfeksjoner (inkl. pyelonefritt), bløtvevsinfeksjoner; cellulitter, erysipelas og sårinfeksjoner, intraabdominale infeksjoner. Profylakse mot infeksjon ved gastrointestinal (inkl. øsofageal), ortopedisk, kardiovaskulær og gynekologisk kirurgi (inkl. keisersnitt). Ved behandling og forebygging av infeksjoner der det er svært sannsynlig at anaerobe organismer skal bekjempes, bør cefuroksim administreres i tillegg til andre egnede antibakterielle legemidler.

**Pakninger og priser:** *750 mg:* 10 stk.<sup>1</sup> (hettegl.) kr 174,90. *1,5 g:* 10 stk.<sup>1</sup> (hettegl.) kr 240,90.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se J01D C02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Zinacef «GlaxoSmithKline»

## Cetirizin «Mylan»

CF *Antihistamin.* ATC-nr.: R06A E07

T **TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg:** Hver tablett inneh.: Cetirizindihydroklorid 10 mg, laktosemonohydrat 74,3 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** *Voksne og barn ≥6 år:* Lindring av nese- og øyesymptomer i forbindelse med sesongbetont og helårlig allergisk rhinitt. Lindring av symptomer på kronisk idiopatisk urticaria.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Svelges med et glass væske. Kan deles i 2 like doser (delestrek).

**Pakninger og priser:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 144,90 (trinnpris: kr 54,40). 100 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 398,50 (trinnpris: kr 74,60).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se R06A E07\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Zyrtec «UCB»

## Cetirizin Bluefish «Bluefish»

CF *Antihistamin.*

ATC-nr.: R06A E07

**T TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg:** Hver tablett inneholdt: Cetirizinhydroklorid 10 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** *Voksne og barn >12 år:* Symptomatisk behandling av allergisk rhinitt (sesongbetenget og helårs), assosiert allergisk konjunktivitt og kronisk idiopatisk urticaria. *Barn 6-12 år:* Symptomatisk behandling av allergisk rhinitt (sesongbetenget og helårs) og kronisk idiopatisk urticaria.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Kan deles (delestrek).

**Pakninger og priser:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 144,90 (trinnspris: kr 54,40). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 398,50 (trinnspris: kr 74,60).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se R06A E07\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Zyrtec «UCB»

## Cetirizin Sandoz «Sandoz»

CF *Antihistamin.*

ATC-nr.: R06A E07

**T TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg:** Hver tablett inneholdt: Cetirizindihydroklorid 10 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** *Voksne og ungdom >12 år:* Symptomatisk behandling av allergisk rhinitt (sesongbundet og helårlig) forbundet med allergisk konjunktivitt og kronisk idiopatisk urticaria. *Barn 6-12 år:* Symptomatisk behandling av allergisk rhinitt (sesongbundet og helårlig) og kronisk idiopatisk urticaria. **Reseptfri bruk:** *Voksne og barn >6 år:* Korttidsbehandling av øye- og neseplager ved allergi, f.eks. pollenallergi.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Svelges med et glass væske. Kan deles (delestrek).

**Pakninger uten resept:** Inntil 30 tabletter er unntatt fra reseptplikt.

**Pakninger og priser:** 7 stk. (blister) kr \*. 30 stk. (blister) kr \*. 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 144,90 (trinnspris: kr 54,40). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 398,50 (trinnspris: kr 74,60).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se R06A E07\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Zyrtec «UCB»

## Cinacalcet Accord «Accord»

C *Antiparathyreoideamiddel.*

ATC-nr.: H05B X01

**TABLETTER, filmdrasjerte 30 mg, 60 mg og 90 mg:** Hver tablett inneholdt: Cinacalcethydroklorid 30 mg, resp. 60 mg og 90 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172), indigokarmin (E 132).

**Indikasjoner:** **Sekundær hyperparatyroidisme:** *Voksne:* Behandling av sekundær hyperparatyroidisme (HPT) hos voksne pasienter med nyresykdom i sluttstadiet (ESRD) på vedlikeholdende dialysebehandling. *Barn:* Behandling av sekundær hyperparatyroidisme (HPT) hos barn  $\geq 3$  år med ESRD ved opprettholdt dialyseterapi, hvor sekundær HPT ikke kontrolleres på adekvat måte med standardbehandling. **Generelt:** Kan brukes som en del av behandling som inkl. fosfatbindere og/eller vitamin D-steroler, etter behov. **Kreft i biskjoldbruskkjertelen og primær hyperparatyroidisme:** *Voksne:* Reduksjon av hyperkalsemi hos voksne med parathyreoideakarsinom. Reduksjon av hyperkalsemi hos voksne med primær HPT der paratyreoidektomi ville vært indisert på grunnlag av serumkalsiumnivåer (som angitt av relevante behandlingsretningslinjer), men der paratyreoidektomi ikke er klinisk egnet eller kontraindisert.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas sammen med mat eller rett etter måltid. Skal svelges hele. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses eller deles.

**Pakninger og priser:** **30 mg:** 28 stk. (blister) kr 1907,10 (trinnpris: kr 803,30). **60 mg:** 28 stk. (blister) kr 3497,70 (trinnpris: kr 1455,50). **90 mg:** 28 stk. (blister) kr 5148,50 (trinnpris: kr 2132,30).

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Mimpara «Amgen»

## Cinacalcet Mylan «Mylan S.A.S.»

**C** *Antiparathyreoideamidde*. ATC-nr.: H05B X01

**TABLETTER, filmdrasjerte 30 mg, 60 mg og 90 mg:** Hver tablett inneholder: Cinacalcethydroklorid 30 mg, resp. 60 mg og 90 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigokarmin (E 132), gult jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** Behandling av sekundær hyperparathyroidisme (HPT) hos pasienter med terminal nyresvikt (ESRD) ved opprettholdt dialyseterapi. Kan brukes som del av en behandling som inkludert fosfatbindere og/eller vitamin D-steroider etter behov. Reduksjon av hyperkalsemi hos pasienter med kreft i biskjoldkjertelen. Reduksjon av hyperkalsemi hos pasienter med primær HPT med indikasjon for parathyreoidektomi basert på serumkalsiumnivå (definert etter gjeldende retningslinjer for behandling), men hvor parathyreoidektomi ikke er klinisk relevant/kontraindisert.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas med mat eller kort tid etter mat. Bør svelges hele. Bør ikke deles.

**Pakninger og priser:** **30 mg:** 28 stk. (blister) kr 1907,10 (trinnpris: kr 803,30). **60 mg:** 28 stk. (blister) kr 3497,70 (trinnpris: kr 1455,50). **90 mg:** 28 stk. (blister) kr 5148,50 (trinnpris: kr 2132,30).

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Mimpara «Amgen»

## Citalopram Orion «Orion»

**C** *Antidepressiv. SSRI*. ATC-nr.: N06A B04

**T** **TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg, 20 mg og 40 mg:** Hver tablett inneholder: Citalopramhydrobromid tilsv. citalopram 10 mg, resp. 20 mg og 40 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Depressive episoder. Panikkklidelser med eller uten agorafobi. Profylakse ved tilbakevendende depressive episoder.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas 1 gang daglig, enten morgen eller kveld. Bør tas sammen med væske, med eller uten mat. **Tabletter 20 mg:** Kan deles i 2 like doser (delestrek). **Tabletter 40 mg:** Kan deles i 2 like doser (delestrek).

**Pakninger og priser:** **10 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 96,30 (trinnpris: kr 51,60). 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 250,60 (trinnpris: kr 91,50). **20 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 121,60 (trinnpris: kr 65,40). 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 341,20 (trinnpris: kr 136,70). **40 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 601,60 (trinnpris: kr 206,90).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N06A B04\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Cipramil «Lundbeck»

## Citalopram Sandoz «Sandoz»

**C** *Antidepressiv*. ATC-nr.: N06A B04

**T** **TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg, 20 mg og 40 mg:** Hver tablett inneholder: Citalopramhydrobromid tilsv. citalopram 10 mg, resp. 20 mg og 40 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Behandling av alvorlige depressive episoder og panikkklidelse med eller uten agorafobi.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør tas én gang daglig, morgen eller kveld. Svelges med et glass væske. Kan tas med eller uten mat. **Tabletter 20 mg:** Kan deles i 2 like doser (delestrek). **Tabletter 40 mg:** Kan deles i 2 like doser (delestrek).

**Pakninger og priser:** **10 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 100,60 (trinnpris: kr 53,00). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 250,60 (trinnpris: kr 91,50). 250 stk. (boks) kr 572,20 (trinnpris: kr 180,70). **20 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 127,70 (trinnpris: kr 67,50). 50 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 188,70 (trinnpris: kr 84,40). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 341,20 (trinnpris: kr 136,70). 250 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 798,60 (trinnpris: kr 293,60). **40 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 205,90 (trinnpris: kr 88,50). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 601,60 (trinnpris: kr 206,90).

**Refusjon:**



<sup>1</sup>Se N06A B04\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Cipramil «Lundbeck»

## Clopidogrel «Mylan»

C *Plateaggregasjonshegger.* ATC-nr.: B01A C04

T **TABLETTER, filmdrasjerte 75 mg:** *Hver tablett inneh.:* Klopidoqrelhydroklorid tilsv. klopidogrel 75 mg, hydrogenert lakserolje 13 mg, hjelpeoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** *Sekunderprofylakse av aterotrombotiske hendelser:* Hos voksne med hjerteinfarkt (fra noen få dager til <35 dager), hjerneinfarkt (fra 7 dager til <6 måneder) eller etablert perifer arteriell sykdom. *Hos voksne med akutt koronarsyndrom:* Akutt koronarsyndrom uten ST-segmentelevation (ustabil angina eller hjerteinfarkt uten Q-takk), inkl. pasienter med innlagt stent etter perkutan koronar intervensjon, i kombinasjon med acetylsalisylsyre (ASA). Akutt hjerteinfarkt med ST-segmentelevation i kombinasjon med ASA til pasienter med behov for medisinsk trombolytisk behandling. *Forebyggende behandling av aterotrombotiske og tromboemboliske hendelser ved atrieflimmer:* Hos voksne med atrieflimmer og minst 1 risikofaktor for vaskulære hendelser, som ikke kan behandles med vitamin K-antagonister (VKA) og som har lav blødningsrisiko, er klopidogrel indisert i kombinasjon med ASA for forebyggende behandling av aterotrombotiske og tromboemboliske hendelser, inkl. hjerneslag.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Tas til samme tid hver dag.

**Pakninger og priser:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 123,80 (trinnspris: kr 123,10). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 513,10 (trinnspris: kr 346,20).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se B01A C04\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Plavix «sanofi-aventis»

## Clopidogrel Accord «Accord»

C *Plateaggregasjonshegger.* ATC-nr.: B01A C04

T **TABLETTER, filmdrasjerte 75 mg:** *Hver tablett inneh.:* Klopidoqrelhydrogensulfat tilsv. klopidogrel 75 mg, laktose, hydrogenert lakserolje, hjelpeoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** *Forebygging av aterotrombotiske hendelser:* Indisert hos voksne med hjerteinfarkt (fra noen få dager til <35 dager), iskemisk slag (fra 7 dager til <6 måneder) eller fastslått perifer arteriesykdom. *Indisert hos voksne med akutt koronarsyndrom:* Akutt koronarsyndrom uten ST-segmentelevation (ustabil angina eller hjerteinfarkt uten Q-takk), inkl. pasienter med innlagt stent etter perkutan koronar intervensjon (PCI), i kombinasjon med acetylsalisylsyre (ASA). Akutt hjerteinfarkt med ST-segmentelevation i kombinasjon med ASA til pasienter med behov for medisinsk trombolytisk behandling. *Forebygging av aterotrombotiske og tromboemboliske hendelser ved atrieflimmer:* Hos voksne med atrieflimmer og minst én risikofaktor for vaskulære hendelser, som ikke kan behandles med vitamin K-antagonister (VKA) og som har lav blødningsrisiko, er klopidogrel indisert i kombinasjon med ASA til forebygging av aterotrombotiske og tromboemboliske hendelser, inkl. hjerneslag.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas til samme tid hver dag. Kan tas med eller uten mat.

**Pakninger og priser:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 179,30 (trinnspris: kr 129,20). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 513,10 (trinnspris: kr 346,20).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se B01A C04\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Plavix «sanofi-aventis»

## Clopidogrel Krka «KRKA»

C *Plateaggregasjonshegger.* ATC-nr.: B01A C04

T **TABLETTER, filmdrasjerte 75 mg:** *Hver tablett inneh.:* Klopidoqrelhydroklorid tilsv. klopidogrel 75 mg, hjelpeoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** *Sekundærprofylakse av aterosklerotiske hendelser:* Hos voksne med hjerteinfarkt (fra noen få dager til <35 dager), hjerneinfarkt (fra 7 dager til <6 måneder) eller etablert perifer arteriell sykdom. Voksne pasienter med akutt koronarsyndrom: Akutt koronarsyndrom uten ST-segment elevasjon (ustabil angina eller hjerteinfarkt uten Q-takk), inkl. pasienter med innlagt stent etter perkutan koronar intervensjon (PCI), i kombinasjon med ASA. Akutt hjerteinfarkt med ST-segment elevasjon i kombinasjon med ASA til pasienter med behov for medisinsk trombolytisk behandling. *Forebyggende behandling av aterosklerotiske og tromboemboliske hendelser ved atrieflimmer:* Hos voksne med atrieflimmer og minst én risikofaktor for vaskulære hendelser, som ikke kan behandles med vitamin K-antagonister (VKA) og som har lav blødningsrisiko, er klopidogrel indisert i kombinasjon med ASA for forebyggende behandling av aterosklerotiske og tromboemboliske hendelser, inkl. hjerneslag.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas til samme tid hver dag. Kan tas med eller uten mat.

**Pakninger og priser:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 513,10 (trinnpris: kr 346,20).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se B01A C04\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Plavix «sanofi-aventis»

## Clozapin HEXAL «HEXAL»

C *Antipsykotikum.* ATC-nr.: N05A H02

T **TABLETTER 25 mg og 100 mg:** Hver tablett inneh.: Clozapin 25 mg, resp. 100 mg, laktose, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** *Behandlingsresistent schizofreni.* Indisert ved behandlingsresistent schizofreni, og for schizofrene pasienter som ved bruk av andre antipsykotika, inkl. et atypisk antipsykotikum, har fått alvorlige nevrologiske bivirkninger som ikke lar seg behandle. Behandlingsresistens defineres som mangel på tilfredsstillende klinisk forbedring til tross for bruk av adekvate doser av minst 2 ulike antipsykotika, inkl. et atypiskantipsykotisk legemiddel, forskrevet i tilstrekkelig lang tid. *Psykoze under forløpet av Parkinsons sykdom:* Indisert ved psykotiske lidelser som oppstår ved Parkinsons sykdom, i tilfeller der standardbehandling har sviktet.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Svelges med et glass vann. Kan tas med eller uten mat. Samtidig inntak av alkohol skal unngås. Samtidig røyking og/eller inntak av koffeinholdige drikker (kaffe, te, cola) kan påvirke effekten av preparatet, se pakningsvedlegget. *Tabletter 25 mg:* Kan deles i 2 like deler (delestrek). *Tabletter 100 mg:* Kan deles i 4 like deler (delekors).

**Pakninger og priser:** **25 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 184,70 (trinnpris: kr 111,60). **100 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 484,40 (trinnpris: kr 300,30).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N05A H02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Leponex «Mylan Healthcare Norge AS»

## Copemyl «Mylan»

C *Immunmodulerende middel.* ATC-nr.: L03A X13

H **INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 20 mg/ml og 40 mg/ml:** Hver ferdigfylte sprøyte (1 ml) inneh.: Glatirameracetat 20 mg, resp. 40 mg tilsv. glatiramerbase 18 mg, resp. 36 mg, mannitol, vann til injeksjonsvæsker.

**Indikasjoner:** Behandling av attackvise former av multipel sklerose (MS). Ikke indisert ved primær eller sekundær progressiv MS.

**Pakninger og priser:** **20 mg/ml:** 28 stk.<sup>1</sup> (ferdigfylt sprøyte) kr 7066,30. **40 mg/ml:** 12 stk.<sup>1</sup> (ferdigfylt sprøyte) kr 7929,50.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>H-resept: L03A X13\_1 Glatirameracetat

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Copaxone 20 mg/ml «Teva»

Copaxone 40 mg/ml «Teva»

## Darunavir Accord «Accord»

C *Antiviralt middel, proteasehemmer.* ATC-nr.: J05A E10

**H TABLETTER, filmdrasjerte 600 mg og 800 mg:** Hver tablett inneh.: Darunavir (som etanolat) 600 mg, resp. 800 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 600 mg: Paraoransje FCF (E 110), titandioksid (E 171). 800 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** 600 mg: Darunavir administrert samtidig med en lav dose ritonavir, er indisert i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler til behandling av pasienter med humant immunsviktvirus (hiv-1)-infeksjon. Kan brukes for å oppnå egnede doseringer hos voksne som har fått antiretroviral behandling (ART) tidligere, inkl. også kraftig forbehandlede pasienter, samt til behandling av hiv-1-infeksjon hos barn og ungdom fra 3 år og som har kroppsvekt på minst 15 kg. Når det vurderes å sette i gang behandling med darunavir og en lav dose ritonavir, bør den enkelte pasients tidligere behandlingsregimer og mutasjonsmønstre assosiert med ulike midler nøye utredes på forhånd. Genotype- eller fenotypetesting (om tilgjengelig), samt behandlingshistorikk bør være rettleidende for bruk av darunavir. 800 mg: Darunavir administrert samtidig med lav dose ritonavir, er indisert i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler til behandling av pasienter med hiv-1-infeksjon. Darunavir administrert samtidig med kobicistat er indisert i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler til behandling av humant immunsviktvirus (hiv-1)-infeksjon hos voksne. Kan brukes for å oppnå egnede doseringer til behandling av hiv-1-infeksjoner hos voksne og barn fra 3 år og som har kroppsvekt på minst 40 kg som er: naive for antiretroviral behandling (ART), ART-erfarne voksne uten darunavirresistensrelaterte mutasjoner (DRV-RAMs) og med plasma hiv-1-RNA <100 000 kopier/ml og CD4+-celletall  $\geq 100$  celler  $\times 10^6$ /liter. Når det vurderes å sette i gang darunavirbehandling hos slike ART-erfarne pasienter, bør genotypetesting være rettleidende for bruk av darunavir.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas med mat. Pasienten bør instrueres til å ta darunavir sammen med kobicistat eller en lav dose ritonavir innen 30 minutter etter et avsluttet måltid. Type mat påvirker ikke darunavireksponering. Skal ikke knuses/deles.

**Pakninger og priser:** 600 mg: 60 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 5872,30. 800 mg: 30 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 3986,50.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>H-resept: J05A E10\_1 Darunavir

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Prezista «Janssen»

## Darunavir Krka «KRKA»

**C Antiviralt middel, proteasehemmer.**

ATC-nr.: J05A E10

**H TABLETTER, filmdrasjerte 600 mg og 800 mg:** Hver tablett inneh.: Darunavir 600 mg, resp. 800 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 600 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 800 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** 600 mg: Darunavir administrert samtidig med lavdose ritonavir, er indisert i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler til behandling av pasienter med humant immunsviktvirus (hiv-1)-infeksjon. Kan brukes for å oppnå egnede doseringer hos voksne som har fått antiretroviral behandling (ART) tidligere, inkl. også kraftig forbehandlede pasienter, samt til behandling av hiv-1-infeksjon hos barn og ungdom fra 3 år og med kroppsvekt på minst 15 kg. Når det vurderes å igangsette behandling med darunavir og lavdose ritonavir, bør den enkelte pasients tidligere behandlingsregimer og mutasjonsmønstre assosiert med ulike midler nøye utredes på forhånd. Genotype- eller fenotypetesting (om tilgjengelig), samt behandlingshistorikk bør være rettleidende for bruk av darunavir. 800 mg: Darunavir administrert samtidig med lavdose ritonavir, er indisert i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler til behandling av pasienter med hiv-1-infeksjon. Kan brukes for å oppnå egnede doseringer til behandling av hiv-1-infeksjoner hos voksne og barn og ungdom fra 3 år og med kroppsvekt på minst 40 kg, og som er naive for antiretroviral behandling (ART). ART-erfarne voksne uten darunavirresistensrelaterte mutasjoner (DRV-RAMs) og med plasma hiv-1 RNA <100 000 kopier/ml og CD4+ celletall  $\geq 100$  celler  $\times 10^6$ /liter. Når det vurderes å igangsette darunavirbehandling hos slike ART-erfarne pasienter, bør genotypetesting være rettleidende for bruk av darunavir.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas med mat. Pasienten bør instrueres til å ta darunavir sammen med lavdose ritonavir innen 30 minutter etter måltid. Type mat påvirker ikke darunavireksponering. Skal ikke knuses/deles.

**Pakninger og priser:** 600 mg: 2  $\times$  30 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 5872,30. 800 mg: 30 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 3986,50.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>H-resept: J05A E10\_1 Darunavir

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Prezista «Janssen»

## Desogestrel Orifarm «Orifarm Generics»

**C Antikonseptjonsmiddel.**

ATC-nr.: G03A C09

**TABLETTER, filmdrasjerte:** Hver tablett inneholdt: Desogestrel 75 µg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Antikonsepsjon.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Svelges med vann. Skal tas hver dag til omtrent samme tid slik at intervallet mellom to tabletter alltid er 24 timer. Kan tas med eller uten mat.

**Pakninger og priser:** 3 × 28 stk. (kalenderpakn.) kr 184,40 (trinnpris: kr 118,50).

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Cerazette «MSD»

## Dexmedetomidine «EVER Pharma»

C *Sedativum.*

ATC-nr.: N05C M18

**KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 100 µg/ml: 1 ml inneholdt:** Deksmetomidinhydroklorid tilsv. deksmedetomidin 100 µg, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.

**Indikasjoner:** For sedasjon av voksne i intensivbehandling når sedasjonsnivå ikke må være lavere enn at pasienten responderer på verbal stimulering (tilsvarende «Richmond Agitation-Sedation Scale» (RASS) 0 til -3). For sedasjon av ikke-intuberte voksne før og/eller under diagnostiske eller kirurgiske prosedyrer som krever sedasjon, dvs. prosedyrerelatert/våken sedasjon.

**Oppbevaring og holdbarhet:** Ampuller/hetteglass oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. **Etter fortynning:** Kjemisk og fysisk stabilitet av fortynnet infusjonsvæske (infusjonsvæskestabilitet) er vist i 48 timer ved 25°C og ved kjøleskapsbetingelser (2-8°C). Av mikrobiologiske hensyn bør legemidlet brukes umiddelbart. Hvis det ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstid og -betingelser før bruk brukerens ansvar og vil normalt ikke være lenger enn 24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynningen har funnet sted under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

**Pakninger og priser:** 5 × 2 ml (amp.) kr 1151,90. 25 × 2 ml (amp.) kr 6220,00. 4 × 4 ml (hettegl.) kr 1929,60. 4 × 10 ml (hettegl.) kr 4817,50.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Dexdor «Orion»

## Diclofenac Bluefish «Bluefish»

C *Antiflogistikum.*

ATC-nr.: M01A B05

T **ENTEROTABLETTER 25 mg og 50 mg:** Hver enterotablett inneholdt: Diklofenaknatrium 25 mg, resp. 50 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Revmatoid artritt.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør tas før mat eller på tom mage. Skal svelges hele med væske.

**Pakninger og priser:** 25 mg: 30 stk.<sup>1</sup> (bliste) kr 74,10 (trinnpris: kr 50,00). 100 stk.<sup>1</sup> (bliste) kr 138,40 (trinnpris: kr 65,30). 50 mg: 20 stk.<sup>1</sup> (bliste) kr 73,60 (trinnpris: kr 50,00). 100 stk.<sup>1</sup> (bliste) kr 171,20 (trinnpris: kr 90,60).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se M01A B05\_2 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Voltaren «Novartis»

## DiclofenacKalium «ratiopharm»

C *Antiflogistikum.*

ATC-nr.: M01A B05

T **TABLETTER 50 mg:** Hver tablett inneholdt: Diklofenakkalium 50 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Filmdrasjert.

**Indikasjoner:** Akutte anfall av migrene. Primær dysmenoré.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas fortrinnsvis før mat. Bør svelges hele, pga. vond smak, med rikelig væske.

**Pakninger og priser:** 20 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 59,30 (trinnpris: kr 52,20). 100 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 136,70 (trinnpris: kr 102,10).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se M01A B05\_3 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Cataflam «Novartis»

## Dicloxacillin Alternova «Alternova»

C *Penicillinaseresistent penicillin.* ATC-nr.: J01C F01

T **KAPSLER, harde 250 mg og 500 mg:** Hver kapsel inneh.: Dikloksacillinnatrium tilsv. dikloksacillin 250 mg, resp. 500 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Svart jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). **Indikasjoner:** Infeksjoner med penicillinasedannende stafylokokker, f.eks. sårinfeksjoner, abscesser, osteomyelitt. Offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler bør følges. **Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kapslene skal ikke inntas liggende eller umiddelbart før sengetid. De bør tas på tom mage minst 1 time før eller 2 timer etter måltid, for maksimal absorpsjon. Svelges hele med minst 1/2 glass vann.

**Pakninger og priser:** 250 mg: 30 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 155,60 (trinnspris: kr 97,50). 500 mg: 30 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 239,30 (trinnspris: kr 140,40). 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 713,00 (trinnspris: kr 383,40).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se J01C F01\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Dicloxacillin Bluefish «Bluefish»

## Dicloxacillin Orion «Orion»

C *Penicillinaseresistent penicillin.* ATC-nr.: J01C F01

T **KAPSLER, harde 250 mg og 500 mg:** Hver kapsel inneh.: Dikloksacillinnatrium tilsv. dikloksacillin 250 mg, resp. 500 mg, natrium 12,7 mg, resp. 25,3 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), sort jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** Infeksjoner forårsaket av penicillinasedannende, meticillinsensitive stafylokokker, f.eks. sårinfeksjoner, abscesser, osteomyelitt. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Skal ikke inntas liggende eller umiddelbart før sengetid. Tas minst 1 time før eller 2 timer etter mat. Svelges hele med minst et 1/2 glass vann.

**Pakninger og priser:** 250 mg: 30 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 155,60 (trinnspris: kr 97,50). 500 mg: 30 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 239,30 (trinnspris: kr 140,40). 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 713,00 (trinnspris: kr 383,40).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se J01C F01\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Dicloxacillin Bluefish «Bluefish»

## Diklofenakdietylamin Norfri 11,6 mg/g «Evolan Pharma»

CF *NSAID.* ATC-nr.: M02A A15

**GEL 11,6 mg/g (1,16%): 1 g inneh.:** Diklofenakdietylamin 11,6 mg tilsv. diklofenaknatrium 10 mg, karbomerer, makrogolcetostearyleter, kokoylkaprylkaprat, dietylamin, isopropylalkohol, propylenglykol, flytende parafin, parfyme, rensed vann.

**Indikasjoner:** *Voksne og barn >14 år:* Milde til moderate smerter i forbindelse med forstuing eller forstrekning. *Voksne >18 år:* Milde til moderate smerter ved artrose i fingerledd eller knær. **Reseptfri bruk:** *Voksne og barn >14 år:* Korttidsbehandling av milde til moderate smerter i forbindelse med forstuing eller forstrekning. *Voksne >18 år:* Korttidsbehandling av milde til moderate smerter i fingre og knær ved slitasjegikt (artrose).

**Pakninger uten resept:** 100 g er unntatt fra reseptplikt.

**Pakninger og priser:** 100 g kr \*.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Voltarol «GlaxoSmithKline Consumer Healthcare»

## Diklofenakdietylamin Norfri 23,2 mg/g «Evolan Pharma»

CF *NSAID.* ATC-nr.: M02A A15

**GEL 23,2 mg/g (2,32%): 1 g inneh.:** Diklofenakdietylamin 23,2 mg tilsv. diklofenaknatrium 20 mg, butylhydroksytoluen, karbomerer, kokoylkaprylkaprat, dietylamin, isopropylalkohol, flytende parafin, makrogolcetostearyleter, oleylalkohol, propylenglykol, parfyme, renset vann.

**Indikasjoner:** *Voksne og barn >14 år:* Milde til moderate smerter i forbindelse med forstuing eller forstrekning. *Voksne >18 år:* Milde til moderate smerter i fingre eller knær i forbindelse med artrose. **Reseptfri bruk:** *Voksne >18 år:* Korttidsbehandling av milde til moderate smerter i forbindelse med forstuing eller forstrekning. Korttidsbehandling av milde til moderate smerter i fingre og knær ved slitasjegikt (artrose).

**Pakninger uten resept:** Inntil 120 g er unntatt fra reseptplikt til voksne.

**Pakninger og priser:** 120 g kr \*.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Voltarol Forte «GlaxoSmithKline Consumer Healthcare»

## Divifarm «Orifarm Generics»

C *D<sub>3</sub>-vitaminpreparat.*

ATC-nr.: A11C C05

**TABLETTER, filmdrasjerte 800 IE:** *Hver tablett inneh.:* Kolekalsiferol (vitamin D<sub>3</sub>) 20 µg tilsv. 800 IE, laktose, sukrose, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172), kinolingult (E 104), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Forebygging og behandling av D-vitaminmangel hos voksne og ungdom med identifisert risiko. D-vitaminmangel defineres som serumnivåer av 25-hydroksykolekalsiferol (25(OH)D) <25 nmol/liter. Som supplement ved spesifikk osteoporosebehandling hos pasienter med risiko for D-vitaminmangel; ved denne indikasjonen bør supplerende kalsium vurderes.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Tablettene kan svelges hele, eller knuses ved behov.

**Pakninger og priser:** 90 stk. (blister) kr 158,70.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Divisun «Meda»

## Docetaxel Kabi «Fresenius Kabi»

C *Cytostatikum, taksan.*

ATC-nr.: L01C D02

**KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE 20 mg/ml, 80 mg/4 ml og 160 mg/8 ml:** *Hvert hetteglass inneh.:* Docetaxel 20 mg, resp. 80 mg og 160 mg, vannfri etanol, polysorbat 80, vannfri sitronsyre.

**Indikasjoner:** *Brystkreft:* I kombinasjon med doksorubicin og syklofosamid ved adjuvant behandling av pasienter med operabel lymfeknutepositiv- og operabel lymfeknutenegativ brystkreft. For pasienter med operabel lymfeknutenegativ brystkreft bør adjuvant-behandlingen begrenses til pasienter berettiget til kjemoterapi iht. internasjonale etablerte kriterier for primærbehandling av tidlig brystkreft. I kombinasjon med doksorubicin for behandling av pasienter med lokalavansert eller metastaserende brystkreft, som ikke tidligere har fått kjemoterapi for denne tilstanden. Gitt som monoterapi for behandling av pasienter med lokalavansert eller metastaserende brystkreft når kjemoterapi har sviktet. Tidligere kjemoterapi bør ha innbefattet antrasykliner eller alkyliseringsmidler. I kombinasjon med trastuzumab for behandling av pasienter med metastaserende brystkreft, der tumorcellene viser økt forekomst av HER2-reseptorer. Tidligere kjemoterapi for metastatisk sykdom skal ikke være gitt. I kombinasjon med kapecitabin for behandling av pasienter med lokalavansert eller metastaserende brystkreft når annen cytotoxisk kjemoterapi har sviktet. Tidligere kjemoterapi bør ha innbefattet antrasykliner. *Ikke-småcellet lungekreft:* Behandling av pasienter med lokalavansert eller metastaserende ikke-småcellet lungekreft når behandling med tidligere kjemoterapi har sviktet. I kombinasjon med cisplatin for behandling av ikke-operabel, lokalavansert eller metastaserende ikke-småcellet lungekreft hos pasienter som tidligere ikke har fått kjemoterapi for denne tilstanden. *Prostatakreft:* I kombinasjon med prednison eller prednisolon for behandling av hormonrefrakter metastaserende prostatakreft. *Adenokarsinom i ventrikkel:* I kombinasjon med cisplatin og 5-fluorouracil for behandling av pasienter med metastatisk adenokarsinom i ventrikkel, inkl. adenokarsinom i den gastroøsofageale overgang. Pasientene skal ikke tidligere ha fått kjemoterapi for metastatisk sykdom. *Kreft i hode og hals:* I kombinasjon med cisplatin og 5-fluorouracil for induksjonsbehandling av pasienter med lokalt avansert plateepitelkarsinom i hode og hals.

**Pakninger og priser:** **20 mg/ml:** 1 × 1 ml (hettegl.) kr 1471,40. **80 mg/4 ml:** 1 × 4 ml (hettegl.) kr 5278,90. **160 mg/8 ml:** 1 × 8 ml (hettegl.) kr 10413,60.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Docetaxel Accord «Accord»

## Doksycyklin HEXAL «HEXAL»

C *Lavdosert tetrasyklin.* ATC-nr.: J01A A02

T **TABLETTER 100 mg:** Hver tablett inneh.: Doksycyklinmonohydrat tilsv. doksycyklin 100 mg, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** Infeksjoner forårsaket av tetrasyklinfølsomme aerobe og anaerobe grampositive og gramnegative bakterier, chlamyudier, mycoplasmer, spiroketer, rickettsier og actinomyceter. Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør tas til et lett måltid og med rikelig drikke for å minske bivirkninger, men skal ikke tas sammen med melk eller annen mat og drikke som inneholder kalsium. Svelges hele. Kan ev. slemmes opp/røres ut i litt vann. Påse da at alt innholdet svelges. Kan deles (delestrek).

**Pakninger og priser:** 10 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 63,80. 15 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 77,50. 20 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 91,30. 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 118,80. 50 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 173,80.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se J01A A02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Doxylin «Actavis»

## Donepezil «Actavis»

C *Middel mot demens.* ATC-nr.: N06D A02

T **TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg og 10 mg:** Hver tablett inneh.: Donepezilhydrokloridmonohydrat tilsv. donepezilhydroklorid 5 mg, resp. 10 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 5 mg: Titan-dioksid (E 171). 10 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Symptomatisk behandling av Alzheimers demens av mild til moderat alvorlig grad.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas med litt vann om kvelden like før sengetid. Kan tas med eller uten mat. Kan om nødvendig deles/knuses.

**Pakninger og priser:** 5 mg: 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 365,00 (trinnpris: kr 293,10). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1131,90 (trinnpris: kr 885,70). 10 mg: 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 458,10 (trinnpris: kr 310,10). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1433,20 (trinnpris: kr 949,60).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N06D A02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Aricept «Pfizer»

## Donepezil Accord «Accord»

C *Middel mot demens.* ATC-nr.: N06D A02

T **TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg og 10 mg:** Hver tablett inneh.: Donepezilhydroklorid 5 mg, resp. 10 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: 5 mg: Titandioksid (E 171). 10 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Symptomatisk behandling av Alzheimers demens med mild til moderat alvorlighetsgrad.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas peroralt om kvelden, rett før leggetid. Kan tas med eller uten mat.

**Pakninger og priser:** 5 mg: 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 365,00 (trinnpris: kr 292,30). 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1110,00 (trinnpris: kr 868,50). 10 mg: 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 458,10 (trinnpris: kr 309,40). 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1405,30 (trinnpris: kr 931,10).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N06D A02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Aricept «Pfizer»

## Donepezil Krka «KRKA»

C *Middel mot demens, antikolinesterase.* ATC-nr.: N06D A02

T **TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg og 10 mg:** Hver tablett inneh.: Donepezilhydroklorid 5 mg, resp. 10 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 5 mg: Titandioksid (E 171). 10 mg: Titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** Symptomatisk behandling av Alzheimers demens av mild til moderat alvorlig grad.  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas om kvelden, rett før sengetid. Kan tas med eller uten mat.  
**Pakninger og priser:** **5 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1131,90 (trinnpris: kr 885,70). **10 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1433,20 (trinnpris: kr 949,60).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N06D A02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Aricept «Pfizer»

## Donepezil Sandoz «Sandoz»

C *Middel mot demens.* ATC-nr.: N06D A02

T **TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg og 10 mg:** Hver tablett inneh.: Donepezilhydroklorid 5 mg, resp. 10 mg, laktose 19 mg, resp. 38 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 5 mg: Titandioksid (E 171). 10 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Symptomatisk behandling av mild til moderat alvorlig grad av Alzheimers demens.  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas oralt om kvelden, like før sengetid. Kan tas med eller uten mat. *Tabletter 10 mg:* Kan deles i 2 like doser (delestrek).

**Pakninger og priser:** **5 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 343,00 (trinnpris: kr 275,30). 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1110,00 (trinnpris: kr 868,50). **10 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 430,00 (trinnpris: kr 291,20). 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1405,30 (trinnpris: kr 931,10).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N06D A02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Aricept «Pfizer»

## Dorzolamid/Timolol Sandoz «Sandoz»

C *Glaukommiddel.* ATC-nr.: S01E D51

T **ØYEDRÅPER, oppløsning 20 mg/ml + 5 mg/ml: 1 ml inneh.:** Dorzolamidhydroklorid tilsv. dorzolamid 20 mg, timololmaleat tilsv. timolol 5 mg, benzalkoniumklorid, hydroksyetylcellulosemannitol (E 421), natriumsitratdihydrat, natriumhydroksid og saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.

**Indikasjoner:** Behandling av forhøyet intraokulært trykk (IOP) hos pasienter med glaukom med åpen kammervinkel eller pseudoekfolliativt glaukom når behandling med topiske betablokkere ikke er tilstrekkelig alene.

**Pakninger og priser:** 5 ml<sup>1</sup> (flaske) kr 128,40 (trinnpris: kr 84,20). 3 × 5 ml<sup>1</sup> (flaske) kr 312,70 (trinnpris: kr 180,30).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se S01E D51\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Cosopt «Santen»

## Doxorubicin Ebewe «EBEWE»

C *Cytostatikum, antrasyklin.* ATC-nr.: L01D B01

**INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 2 mg/ml: 1 ml inneh.:** Doksorubicinhydroklorid 2 mg, natriumklorid, saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.

**Indikasjoner:** Brystcancer. Osteogent sarkom og Ewings sarkom. Bløtdelssarkom. Småcellet anaplastisk lungekarsinom. Malignt lymfom både av typen mb. Hodgkin og non-Hodgkin. Urogenitale og gynekologiske tumores som blærecancer, testiscancer og uteruscancer. Pediatriske solide tumores som rhabdomyosarkom, nevroblastom, Wilms tumor. Akutte leukemier. Forsøksvis ved: Prostatakarsinom. Thyreoideakarsinom. Ovariecancer, cervixcancer, vaginalcancer, hode- og halscancer, ventrikkeltumor.

**Pakninger og priser:** 25 ml (hettegl.) kr 580,50.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Adriamycin «Pfizer»



## Duloxetine Krka «KRKA»

C *Antidepressiv, serotonin- og noradrenalinreopptakshemmer.* ATC-nr.: N06A X21

T **ENTEROKAPSLER, harde 30 mg og 60 mg:** Hver enterokapsel inneh.: Duloksetinhydroklorid tilsv. duloksetin 30 mg, resp. 60 mg, sukrose, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172) (kun enterokapsler 60 mg), sort jernoksid (E 172), indigotin (E 132), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Indisert til voksne. Behandling av depressive lidelser. Behandling av smerter ved perifer diabetisk nevropati. Behandling av generalisert angstlidelse.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Bør svelges hele med vann.

**Pakninger og priser:** 30 mg: 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 261,80. 60 mg: 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 421,10. 60 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1319,00.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N06A X21\_2 i Refusjonslisten.

Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Cymbalta «Lilly»

## Duloxetine «Mylan»

C *Antidepressiv, serotonin- og noradrenalinreopptakshemmer.* ATC-nr.: N06A X21

T **ENTEROKAPSLER, harde 30 mg og 60 mg:** Hver enterokapsel inneh.: Duloksetin (som hydroklorid) 30 mg, resp. 60 mg, sukrose, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172), briljantblå FCF (E 133), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Indisert til voksne. Behandling av depressive lidelser. Behandling av smerter ved perifer diabetisk nevropati. Behandling av generalisert angstlidelse.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas med eller uten mat. Bør svelges hele sammen med vann.

**Pakninger og priser:** 30 mg: 28stk.<sup>1</sup> (blister) kr 246,80. 60 mg: 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 395,40. 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1293,40.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N06A X21\_2 i Refusjonslisten.

Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Cymbalta «Lilly»

## Ebastin Orifarm «Orifarm Generics»

C *Antihistamin.* ATC-nr.: R06A X22

T **TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 20 mg:** Hver tablett inneh.: Ebastin 10 mg, resp. 20 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** 10 mg og 20 mg: For symptomatisk behandling av sesongmessig og perennial allergisk rhinitt med eller uten allergisk konjunktivitt. 10 mg: For å lindre kløe og for å redusere dannelse av nye vabler i urticaria av ukjent opprinnelse.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele med væske. Kan deles i 2 like doser.

**Pakninger og priser:** 10 mg: 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 137,00 (trinnpris: kr 77,60). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 319,50 (trinnpris: kr 152,40). 20 mg: 100 stk.<sup>2</sup> (blister) kr 703,70 (trinnpris: kr 309,90).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se R06A X22\_3 i Refusjonslisten.

<sup>2</sup>Se R06A X22\_4 i Refusjonslisten.

Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Kestine «Almirall»

## Efavirenz Sandoz «Sandoz»

C *Ikke-nukleosid revers transkriptasehemmer.* ATC-nr.: J05A G03

H **TABLETTER, filmdrasjerte 600 mg:** Hver tablett inneh.: Efavirenz 600 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Kinolingult (E 104), titandioksid (E 171), rødt jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** Antiviral kombinasjonsbehandling av voksne, ungdom og barn  $\geq 3$  måneder og  $\geq 3,5$  kg, som er infisert med humant immunsviktvirus-1 (hiv-1). Preparatet er ikke tilstrekkelig undersøkt hos pasienter med fremskreden hiv-sykdom, dvs. ved CD4-tall  $< 50$  celler/mm<sup>3</sup> eller etter mislykket behandling med regimer som inneholder proteasehemmere. Selv om det ikke er dokumentert kryssresistens mellom efavirenz og proteasehemmere, er det foreløpig ufullstendige data for effek-

ten av kombinasjonsbehandling basert på proteasehemmere etter at regimer som inneholder efavirenz har mislykkes.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Det anbefales at preparatet tas på tom mage, helst ved sengetid. Kan deles i 2 like doser (delestrek).

**Pakninger og priser:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 2638,20.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>H-resept: J05A G03\_2 Efavirenz

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Stocrin «MSD»

## Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan «Mylan»

C *Antiviralt middel.*

ATC-nr.: J05A R06

H **TABLETTER, filmdrasjerte 600 mg/200 mg/245 mg:** Hver tablett inneh.: Efavirenz 600 mg, emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproksil (som maleat) 245 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Kombinasjonspreparat med fast dose efavirenz, emtricitabin og tenofovirdisoproksil. Indisert til behandling av infeksjoner forårsaket av humant immunsviktvirus-1 (hiv-1) hos voksne  $\geq 18$  år med virologisk suppresjon av hiv-1 RNA-nivåer på  $< 50$  kopier/ml ved nåværende antiviral kombinasjonsbehandling i  $> 3$  måneder. Pasientene skal ikke ha erfart virologisk svikt ved tidligere antiretroviral behandling, og de skal ikke ha utviklet virusstammer med mutasjoner som viser signifikant resistens overfor noen av de 3 komponentene i preparatet før oppstart av sitt første antiretrovirale behandlingsregime, se SPC. Fordelene med efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproksil er hovedsakelig vist ved 48 ukers data fra en klinisk studie hvor pasienter med stabil virologisk suppresjon ved antiviral kombinasjonsbehandling byttet til efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproksil. Det foreligger foreløpig ikke data fra kliniske studier med dette preparatet hos behandlingsnaive pasienter eller hos pasienter som er kraftig behandlet tidligere. Det finnes ikke data som støtter kombinasjonen av efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproksil og andre antiretrovirale midler.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør tas ved sengetid, for å øke toleransen for efavirenz med hensyn på nevrologiske bivirkninger. Skal tas på tom mage (vanligvis 1 time før eller 2 timer etter mat) siden mat kan øke eksponeringen for efavirenz og føre til økt bivirkningsfrekvens. Skal svelges hele med vann.

**Pakninger og priser:** 30 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 8599,10.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>H-resept: J05A R06\_1 Emtricitabin, tenofovirdisoproksil og efavirenz

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Atripla «Gilead»

## Eletriptan «Mylan»

C *Migrenemiddel.*

ATC-nr.: N02C C06

T **TABLETTER, filmdrasjerte 20 mg og 40 mg:** Hver tablett inneh.: Eletriptanhydrobromid tilsv. eletriptan 20 mg, resp. 40 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), paraoransje FCF (E 110).

**Indikasjoner:** Til voksne for akutt behandling av hodepinefasen av migreaneanfall med eller uten aura.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Bør svelges hele med vann.

**Pakninger og priser:** **20 mg:** 6 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 183,40 (trinnpris: kr 141,40). **40 mg:** 6 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 183,40 (trinnpris: kr 141,40). 18 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 477,60 (trinnpris: kr 351,60).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N02C C06\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Relpax «Pfizer»

## Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord «Accord»

C *Antiviralt middel.*

ATC-nr.: J05A R03

**H** **TABLETTER, filmdrasjerte 200 mg/245 mg:** Hver tablett inneholder: Emtricitabin 200 mg, tenofoviridisoprosil 245 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigokarmin (E 132), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Behandling av hiv-infeksjon: Antiretroviral kombinasjonsterapi for behandling av hiv-1-infiserte voksne, se SPC. Behandling av hiv-1-infiserte ungdommer, der NRTI-resistens eller -toksisitet utelukker bruk av førstelinjemidler, se SPC. *Pre-eksposisjonell profylakse (PrEP):* I kombinasjon med praktisering av sikker sex for å redusere risikoen for seksuelt overført hiv-1-smitte hos voksne og ungdom med høy risiko, se SPC.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Skal helst tas med mat. Tablettene kan knuses og pulveret oppløses i ca. 100 ml vann, appelsinjuice eller druejuice, og drikkes omgående.

**Pakninger og priser:** 30 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 5252,10.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>H-resept: J05A R03\_1 Tenofoviridisoprosil og emtricitabin

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Truvada «Gilead»

## Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan «Mylan»

**C** *Antiviralt middel.*

ATC-nr.: J05A R03

**H** **TABLETTER, filmdrasjerte 200 mg/245 mg:** Hver tablett inneholder: Emtricitabin 200 mg, tenofoviridisoprosilmaleat tilsv. tenofoviridisoprosil 245 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171), briljantblå FCF aluminiumlakk (E 133).

**Indikasjoner:** Behandling av hiv-infeksjon: Antiretroviral kombinasjonsterapi for behandling av hiv-1-infiserte voksne, se SPC. Behandling av hiv-1-infiserte ungdommer, der NRTI-resistens eller -toksisitet utelukker bruk av førstelinjemidler, se SPC. *Pre-eksposisjonell profylakse (PrEP):* I kombinasjon med praktisering av sikker sex for å redusere risikoen for seksuelt overført hiv-1-smitte hos voksne og ungdom med høy risiko, se SPC.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Skal helst tas med mat. Tablettene kan oppløses i ca. 100 ml vann, appelsinjuice eller druejuice, og drikkes omgående.

**Pakninger og priser:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 5252,10.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>H-resept: J05A R03\_1 Tenofoviridisoprosil og emtricitabin

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Truvada «Gilead»

## Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Sandoz «Sandoz»

**C** *Antiviralt middel.*

ATC-nr.: J05A R03

**H** **TABLETTER, filmdrasjerte 200 mg/245 mg:** Hver tablett inneholder: Emtricitabin 200 mg, tenofoviridisoprosil 245 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), indigokarminaluminiumlakk (E 132).

**Indikasjoner:** Behandling av hiv-infeksjon: Antiretroviral kombinasjonsterapi for behandling av hiv-1-infiserte voksne. Er også indisert for behandling av hiv-1-infisert ungdom 12-18 år, der NRTI-resistens eller -toksisitet utelukker bruk av førstelinjemidler. *Pre-eksposisjonell profylakse (PrEP):* Pre-eksposisjonell profylakse i kombinasjon med praktisering av sikker sex for å redusere risikoen for seksuelt overført hiv-1-smitte hos voksne med høy risiko.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Skal helst tas med mat. Tablettene kan oppløses i ca. 100 ml vann, appelsin- eller druejuice, og drikkes omgående.

**Pakninger og priser:** 30 stk.<sup>1</sup> (plastflaske) kr 5252,10.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>H-resept: J05A R03\_1 Tenofoviridisoprosil og emtricitabin

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Truvada «Gilead»

## Enalapril Comp «ratiopharm»

**C** *ACE-hemmer og diuretikum.*

ATC-nr.: C09B A02

**T** **TABLETTER 20 mg/12,5 mg:** Hver tablett inneholder: Enalaprilmaleat 20 mg, hydroklortiazid 12,5 mg, laktosemonohydrat 89,6 mg, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** Behandling av essensiell hypertensjon. Den faste dosekombinasjonen er indisert til pasienter der hvor blodtrykket ikke er tilstrekkelig kontrollert med enalapril alene. Den faste dosekombinasjonen kan også erstatte en kombinasjon av 20 mg enalaprilmaleat og 12,5 mg hydroklortiazid hos pasienter som er stabilisert på de to virkestoffene gitt i samme mengder som enkeltmedikamenter. Denne faste dosekombinasjonen er ikke egnet for oppstartsbehandling.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Skal svelges med vann. Kan tas med eller uten mat. Kan deles (delestrek).

**Pakninger og priser:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 79,20 (trinnspris: kr 79,20). 100 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 231,10 (trinnspris: kr 225,40).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C09B A02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Renitec Comp «MSD»

## Enalapril Krka «KRKA»

C ACE-hemmer.

ATC-nr.: C09A A02

T TABLETTER 5 mg, 10 mg og 20 mg: Hver tablett inneh.: Enalaprilmaleat 5 mg, resp. 10 mg og 20 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 10 mg og 20 mg: Jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** Behandling av hypertensjon. Behandling av symptomatisk hjertesvikt. Forebygging av symptomatisk hjertesvikt hos pasienter med asymptomatisk venstresidig ventrikulær dysfunksjon (ejeksjonsfraksjon  $\leq 35\%$ ).

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. 5 mg: Tabletten kan deles i 2 like doser. 10 mg og 20 mg: Delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.

**Pakninger og priser:** 5 mg: 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 54,40 (trinnspris: kr 54,40). 100 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 92,10 (trinnspris: kr 92,10). 10 mg: 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 66,20 (trinnspris: kr 66,20). 100 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 131,50 (trinnspris: kr 131,50). 20 mg: 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 75,20 (trinnspris: kr 75,20). 100 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 162,20 (trinnspris: kr 162,20).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C09A A02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Renitec «MSD»

## Enalapril Sandoz «Sandoz»

C ACE-hemmer.

ATC-nr.: C09A A02

T TABLETTER 2,5 mg, 5 mg, 10 mg og 20 mg: Hver tablett inneh.: Enalaprilmaleat 2,5 mg, resp. 5 mg, 10 mg og 20 mg, laktose. Fargestoff: 10 mg: Rødt jernoksid (E 172). 20 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** Behandling av hypertensjon. Behandling av symptomatisk hjertesvikt. Forebyggende behandling av symptomatisk hjertesvikt hos pasienter med asymptomatisk venstre ventrikulær dysfunksjon (ejeksjonsfraksjon  $\leq 35\%$ ).

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. *Tabletter 5 mg:* Kan deles for å lette svelging, ikke for å dele i like doser. *Tabletter 10 mg:* Kan deles for å lette svelging, ikke for å dele i like doser. *Tabletter 20 mg:* Kan deles for å lette svelging, ikke for å dele i like doser.

**Pakninger og priser:** 2,5 mg: 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 89,30 (trinnspris: kr 74,60). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 91,60 (trinnspris: kr 91,60). 5 mg: 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 54,40 (trinnspris: kr 54,40). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 92,10 (trinnspris: kr 92,10). 10 mg: 30 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 92,10 (trinnspris: kr 92,10). 10 mg: 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 66,20 (trinnspris: kr 66,20). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 131,50 (trinnspris: kr 131,50). 100 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 131,50 (trinnspris: kr 131,50). 20 mg: 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 75,20 (trinnspris: kr 75,20). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 162,20 (trinnspris: kr 162,20). 100 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 162,20 (trinnspris: kr 162,20).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C09A A02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Renitec «MSD»

## Enalapril/Lercanidipine Krka «KRKA»

C Kalsiumantagonist + ACE-hemmer.

ATC-nr.: C09B B02

- T** **TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg/10 mg og 20 mg/10 mg:** Hver tablett inneh.: Enalaprilmaleat 10 mg, resp. 20 mg tilsv. enalapril 7,64 mg, resp. 15,29 mg, lerkandipinhydroklorid 10 mg tilsv. lerkandipin 9,44 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: 10 mg/10 mg: Titandioksid (E 171). 20 mg/10 mg: Gult jernoksid (E 172), kinolingult (E 104), titandioksid (E 171).  
**Indikasjoner:** 10 mg/10 mg: Behandling av essensiell hypertensjon hos pasienter hvor blodtrykket ikke er adekvat kontrollert med lerkandipin 10 mg alene. Tablett 10 mg/10 mg skal ikke brukes ved initiell behandling av hypertensjon. 20 mg/10 mg: Behandling av essensiell hypertensjon hos pasienter hvor blodtrykket ikke er adekvat kontrollert med enalapril 20 mg alene. Tablett 20 mg/10 mg skal ikke brukes ved initiell behandling av hypertensjon.  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Skal helst tas om morgenen, minst 15 minutter før frokost. Bør ikke tas sammen med grapefruktjuice.  
**Pakninger og priser:** 10 mg/10 mg: 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 374,90. 20 mg/10 mg: 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 405,30.  
**Refusjon:**  
<sup>1</sup>Se C09B B02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Zanipress «Recordati»

## Entecavir «Teva»

- C** **Antiviralt middel, guanosinnukleosidanalog.** ATC-nr.: J05A F10
- H** **TABLETTER, filmdrasjerte 0,5 mg og 1 mg:** Hver tablett inneh.: Entecavir (som monohydrat) 0,5 mg, resp. 1 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 0,5 mg: Titandioksid (E 171). 1 mg: Titandioksid (E 171), rødt jernoksid (E 172).  
**Indikasjoner:** Behandling av kronisk hepatitt B-virusinfeksjon (HBV) hos voksne med kompensert leversykdom og tegn på aktiv viral replikasjon, vedvarende forhøyede serum ALAT-nivåer og histologiske tegn på aktiv inflammasjon og/eller fibrose samt for dekompensert leversykdom. Behandling av kronisk HBV-infeksjon hos nukleosidnaive barn >2 år og ungdom <18 år med kompensert leversykdom og som har bekreftet aktiv viral replikasjon og vedvarende forhøyet serum ALAT-nivå, eller histologisk bekreftet moderat til alvorlig inflammasjon og/eller fibrose.  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** *Voksne:* For nukleosidnaive pasienter kan preparatet tas med eller uten mat. For lamivudinrefraktære pasienter og ved dekompensert leversykdom skal preparatet tas på tom mage (>2 timer før/etter mat). *Barn:* Tas med eller uten mat. *Tabletter 1 mg:* Kan deles i like doser (delestrek).  
**Pakninger og priser:** 0,5 mg: 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 4476,20. 1 mg: 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 4789,80.  
**Refusjon:**  
<sup>1</sup>H-resept: J05A F10\_1 Entecavir

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Baraclude «Bristol-Myers Squibb»

## Entecavir Mylan «Mylan»

- C** **Antiviralt middel, guanosinnukleosidanalog.** ATC-nr.: J05A F10
- H** **TABLETTER, filmdrasjerte 0,5 mg:** Hver tablett inneh.: Entecavir (som monohydrat) 0,5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).  
**Indikasjoner:** Behandling av kronisk hepatitt B-virusinfeksjon (HBV) hos voksne med kompensert leversykdom og tegn på aktiv viral replikasjon, vedvarende forhøyede serum ALAT-nivåer og histologiske tegn på aktiv inflammasjon og/eller fibrose samt for dekompensert leversykdom. Generelt: For både kompensert og dekompensert leversykdom er denne indikasjonen basert på data fra kliniske studier på nukleosidnaive pasienter med HBeAg-positiv og HBeAg-negativ infeksjon. For pasienter med lamivudinrefraktær hepatitt B, se SPC. Behandling av kronisk HBV-infeksjon hos nukleosidnaive barn >2 år og ungdom <18 år med kompensert leversykdom og som har bekreftet aktiv viral replikasjon og vedvarende forhøyet serum ALAT-nivå, eller histologisk bekreftet moderat til alvorlig inflammasjon og/eller fibrose.  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** *Voksne:* For nukleosidnaive pasienter kan preparatet tas med eller uten mat. For lamivudinrefraktære pasienter og ved dekompensert leversykdom skal preparatet tas på tom mage (>2 timer før/etter mat). *Barn:* Tas med eller uten mat.  
**Pakninger og priser:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 4476,20.  
**Refusjon:**  
<sup>1</sup>H-resept: J05A F10\_1 Entecavir

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Baraclude «Bristol-Myers Squibb»

## Entecavir Sandoz «Sandoz»

C *Antiviralt middel, guanosinnukleosidanalogue.* ATC-nr.: J05A F10

H **TABLETTER, filmdrasjerte 0,5 mg og 1 mg:** Hver tablett inneholder: Entecavir (som monohydrat) 0,5 mg, resp. 1 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 0,5 mg: Titandioksid (E 171). 1 mg: Titandioksid (E 171), gult og rødt jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** *Voksne:* Behandling av kronisk hepatitt B-virusinfeksjon (HBV) hos voksne med kompensert leversykdom og tegn på aktiv viral replikasjon, vedvarende forhøyede serum ALAT-nivåer og histologiske tegn på aktiv inflammasjon og/eller fibrose. Behandling av kronisk HBV-infeksjon hos voksne med dekompensert leversykdom. Generelt: For både kompensert og dekompensert leversykdom er denne indikasjonen basert på data fra kliniske studier på nukleosidnaive pasienter med HBeAg-positiv og HBeAg-negativ infeksjon. For pasienter med lamivudinrefraktær hepatitt B, se SPC. *Barn og ungdom >2 år til <18 år:* Behandling av kronisk HBV-infeksjon hos nukleosidnaive barn >2 år til ungdom <18 år med kompensert leversykdom og som har bekreftet aktiv viral replikasjon og vedvarende forhøyet serum ALAT-nivå, eller histologisk bekreftet moderat til alvorlig inflammasjon og/eller fibrose. Mht. beslutning om å starte behandling hos pediatriske pasienter, se SPC.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** *Voksne:* For nukleosidnaive pasienter kan preparatet tas med eller uten mat. For lamivudinrefraktære pasienter og ved dekompensert leversykdom skal preparatet tas på tom mage (>2 timer før/etter mat). *Barn:* Kan tas med eller uten mat.

**Pakninger og priser:** **0,5 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 4476,20. **1 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 4789,80.

### Refusjon:

<sup>1</sup>H-resept: J05A F10\_1 Entecavir

### Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Baraclude «Bristol-Myers Squibb»

## Epirubicin Accord «Accord»

C *Antineoplastisk middel.* ATC-nr.: L01D B03

**INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 2 mg/ml: 1 ml inneholder:** Epirubicinhydroklorid 2 mg, natriumklorid, saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.

**Indikasjoner:** Neoplastiske tilstander bl.a. karsinom i brystet, magekreft. Ved intravesikal administrering har epirubicin vist seg å være effektiv ved behandlingen av papillær karsinom i overgangsepitelet i blæren, karsinom in-situ i blæren og profylakse mot tilbakefall av overflattisk blårekarinsinom etter transuretral reseksjon.

**Pakninger og priser:** 5 ml (hettegl.) kr 198,60. 10 ml (hettegl.) kr 361,00. 25 ml (hettegl.) kr 848,20. 50 ml (hettegl.) kr 1660,10.

### Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Epirubicin medac «Medac»

## Eplerenon Accord «Accord»

C *Aldosteronantagonist.* ATC-nr.: C03D A04

T **TABLETTER, filmdrasjerte 25 mg og 50 mg:** Hver tablett inneholder: Eplerenon 25 mg, resp. 50 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Som tillegg til standardbehandling, som inkluderer betablokkere, for å redusere risikoen for kardiovaskulær mortalitet og morbiditet hos stabile pasienter med dysfunksjon i venstre ventrikel (LVEF ≤40%) og kliniske holdepunkter for hjertesvikt etter nylig myokardinfarkt. Som tillegg til optimal standardbehandling, for å redusere risikoen for kardiovaskulær mortalitet og morbiditet hos voksne pasienter med NYHA klasse II (kronisk) hjertesvikt og systolisk dysfunksjon i venstre ventrikel (LVEF ≤30%).

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan administreres med eller uten mat. Skal svelges hele med mye vann.

**Pakninger og priser:** **25 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 624,40 (trinnpris: kr 277,40). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1996,80 (trinnpris: kr 840,10). **50 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 2134,80 (trinnpris: kr 896,60).

### Refusjon:

<sup>1</sup>Se C03D A04\_2 i Refusjonslisten.

### Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Inspra «Pfizer»

## Eplerenon Krka «KRKA»

C *Diuretikum, aldosteronantagonist.* ATC-nr.: C03D A04

T **TABLETTER, filmdrasjerte 25 mg:** Hver tablett inneholder: Eplerenon 25 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** Som tillegg til standardbehandling, inkl. betablokkere, for å redusere risikoen for kardiovaskulær mortalitet og morbiditet hos pasienter med stabil venstre ventrikkeldysfunksjon (LVEF ≤40%) og klinisk påvist hjertesvikt etter nylig gjennomgått hjerteinfarkt. Som tillegg til standard optimal behandling for å redusere risikoen for kardiovaskulær mortalitet og morbiditet hos voksne pasienter med New York Heart Association (NYHA)-klasse II (kronisk) hjertesvikt og venstre ventrikkel systolisk dysfunksjon (LVEF ≤30%).

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele med tilstrekkelig mengde vann.

**Pakninger og priser:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 624,40 (trinnspris: kr 277,40).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C03D A04\_2 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Inspira «Pfizer»

## Epoprostenol CampusPharma «CampusPharma»

C *Antitrombotisk middel. Middel mot primær pulmonal hypertensjon.* ATC-nr.: B01A C09

H **PULVER OG VÆSKE TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 0,5 mg og 1,5 mg:** Hvert sett inneholder: I) Pulver: Epoprostenolnatrium 0,531 mg, resp. 1,593 mg tilsv. epoprostenol 0,5 mg, resp. 1,5 mg, mannitol, glysin, natriumklorid, natriumhydroksid. II) Oppløsningsvæske: Glysin, natriumklorid, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.

**Indikasjoner:** *Pulmonal arteriell hypertensjon (PAH):* Idiopatisk eller arvelig PAH og PAH assosiert med bindevevssykdommer hos pasienter med WHO funksjonsklasse III-IV-symptomer, for å forbedre arbeidskapasitet. *Nyredialyse:* I nødstilfeller der bruk av heparin medfører stor risiko for å forårsake eller forverre blødning, eller hvor heparin er kontraindisert.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kun egnet til kontinuerlig infusjon, enten i.v. eller via dialysatoren. Skal ikke administreres som en bolusinjeksjon.

**Oppbevaring og holdbarhet:** *Rekonstituert oppløsning:* Rekonstituert oppløsning som nylig er tilberedt skal ikke administreres i >12 timer når den brukes ved romtemperatur (15-25°C). Bør oppbevares ved høyst 25°C og beskyttes mot lys. Kan oppbevares i opptil 40 timer i kjøleskap (2-8°C) før bruk i romtemperatur. I så tilfelle bør ikke oppløsningen brukes i >8 timer når den administreres ved romtemperatur. *Fortynnet oppløsning:* Beskytt infusjonsposen mot lys under infusjonen. *Nyredialyse:* Når oppløsningen rekonstitueres med glysinbuffer og fortynnes med fysiologisk saltvann bør den brukes innen 12 timer oppbevart ved 25°C. *Pulmonal arteriell hypertensjon:* Når oppløsningen rekonstitueres og fortynnes med glysinbuffer bør den brukes umiddelbart. Hvis den ikke brukes umiddelbart, er lagringstid brukerens ansvar, og bør ikke overstige 24 timer ved 2-8°C. Når oppløsningen oppbevares i et ambulierende infusjonspumpesystem, må det benyttes en kjølekappe for å opprettholde temperaturen på oppløsningen på 2-8°C under hele administreringsperioden. Oppløsningen kan da brukes i løpet av en 24 timers periode forutsatt at kjølekappen byttes ved behov i løpet av dagen. Når ambulierende kjølekappesystem ikke kan brukes, er maks. administreringstid ved 25°C 12 timer for nylaget oppløsning.

**Pakninger og priser:** 0,5 mg: 1 sett<sup>1</sup> kr 909,90. 1,5 mg: 1 sett<sup>1</sup> kr 1702,90.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>H-resept: B01A C09\_1 Epoprostenol

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Flolan «GlaxoSmithKline»

## Eptifibatid Accord «Accord»

C *Blodplateaggregasjonshemmer.* ATC-nr.: B01A C16

**INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 0,75 mg/ml:** 1 ml inneholder: Eptifibatid 0,75 mg, sitronsyremonohydrat, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.

**INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 2 mg/ml:** 1 ml inneholder: Eptifibatid 2 mg, sitronsyremonohydrat, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.

**Indikasjoner:** Forebygging av tidlig myokardinfarkt hos voksne med ustabil angina eller non-Q-myokardinfarkt med siste episode av brystsmerte de siste 24 timer og med EKG-forandringer og/eller forhøyede hjerteenzymmer. De pasienter som mest sannsynlig har nytte av behandlingen er de som har høy risiko for å utvikle myokardinfarkt i løpet av de første 3-4 dagene etter at de akutte an-

ginasymptomene startet, inkl. de pasienter som mest sannsynlig vil gjennomgå en tidlig perkutan transluminal koronar angioplastikk (PTCA). Eptifibatid er ment å brukes sammen med acetylsalicylsyre og ufraksjonert heparin.

**Pakninger og priser:** *Infusjonsvæske:* 100 ml (hettegl.) kr 712,00. *Injeksjonsvæske:* 10 ml (hettegl.) kr 252,10.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Integrilin «GlaxoSmithKline»

## Ertapenem Fresenius Kabi «Fresenius Kabi»

C *Antibiotikum.* ATC-nr.: J01D H03

T **PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 1 g:** *Hvert hetteglass inneh.:* Ertapenemnatrium tilsv. ertapenem 1 g, natriumhydrogenkarbonat, natriumhydroksid.

**Indikasjoner:** *Behandling:* Til voksne og barn (3 måneder-17 år) for behandling av følgende infeksjoner som skyldes bakterier som er, eller sannsynligvis er, følsomme for ertapenem, og hvor parenteral behandling er nødvendig: Intraabdominale infeksjoner, pneumoni ervervet utenfor sykehus, akutte gynekologiske infeksjoner og hud- og bløtvevsinfeksjoner i foten pga. diabetes. *Forebygging:* Til voksne for å forebygge infeksjoner forårsaket av kirurgi etter elektivt kolorektalt inngrep. *Generelt:* Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer angående hensiktsmessig bruk av antibakterielle legemidler.

**Utleveringsbestemmelser:** Skal kun utleveres til bruk på menneske.

**Pakninger og priser:** 10 stk.<sup>1</sup> (hettegl.) kr 4641,30.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se J01D H03\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Invanz «MSD»

## Escitalopram «Actavis»

C *Antidepressiv.* ATC-nr.: N06A B10

T **TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg, 10 mg og 20 mg:** *Hver tablett inneh.:* Escitalopram 5 mg, resp. 10 mg og 20 mg. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Behandling av depressive episoder, panikk lidelse med eller uten agorafobi, sosial angst (sosial fobi), generalisert angstlidelse, tvangslidelse (obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD)).

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas som 1 enkelt daglig dose. Tas med eller uten mat. Svelges hele med et glass vann. *Tabletter 10 mg:* Kan deles i 2 like doser (delestrek). *Tabletter 20 mg:* Kan deles i 2 like doser (delestrek).

**Pakninger og priser:** **5 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 120,30 (trinnpri: kr 52,30). **10 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 120,30 (trinnpri: kr 73,30). 56 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 188,10 (trinnpri: kr 79,70). 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 302,00 (trinnpri: kr 115,40). **20 mg:** 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 520,40 (trinnpri: kr 193,60).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N06A B10\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Cipralax «Lundbeck»

## Escitalopram Mylan «Mylan»

C *Antidepressiv.* ATC-nr.: N06A B10

T **TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg, 10 mg og 20 mg:** *Hver tablett inneh.:* Escitalopramoksalat tilsv. escitalopram 5 mg, resp. 10 mg og 20 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Titan-dioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Alvorlige depressive episoder, panikk lidelse med eller uten agorafobi, sosial angstlidelse, generalisert angstlidelse og obsessiv-kompulsiv lidelse (tvangslidelse).

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat.

**Pakninger og priser:** **5 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 120,30 (trinnpri: kr 52,30). **10 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 120,30 (trinnpri: kr 73,30). 56 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 188,10 (trinnpri: kr 79,70). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 307,40 (trinnpri: kr 117,00). **20 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 530,20 (trinnpri: kr 196,80).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N06A B10\_1 i Refusjonslisten.



Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Ciprallex «Lundbeck»

## Escitalopram Teva «Teva»

C *Antidepressiv.* ATC-nr.: N06A B10

T **TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg og 10 mg:** Hver tablett inneh.: Escitalopramoksalat 5 mg, resp. 10 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Behandling av depressive episoder, panikkklidelse med eller uten agorafobi, generalisert angstlidelse og tvangslidelse (OCD).

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Svelges med litt vann. Bør ikke tygges pga. bitter smak. Kan deles.

**Pakninger og priser:** **5 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 126,30 (trinnspris: kr 53,50). **10 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 126,30 (trinnspris: kr 75,90). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 307,40 (trinnspris: kr 117,00).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N06A B10\_1 i Refusjonslisten.

Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Ciprallex «Lundbeck»

## Esomeprazol Pensa «Pensa Pharma»

C *Syrepumpehemmer, saltsyresekresjonshemmende middel.* ATC-nr.: A02B C05

T **ENTEROKAPSLER, harde 20 mg og 40 mg:** Hver enterokapsel inneh.: Esomeprazol (som natriumsalt) 20 mg, resp. 40 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), rødt og sort jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** *Gastroøsofageal reflukssykdom (GERD) hos voksne:* Behandling av erosiv reflukssosofagitt. Langtidsbehandling av pasienter med tilhelet øsofagitt for å forhindre tilbakefall. Symptomatisk behandling av GERD. *I kombinasjon med egnede antibiotikaregimer for bekjempelse av Helicobacter pylori hos voksne:* Tilheling av Helicobacter pylori-relaterte duodenalsår. Forebygging av tilbakevendende magesår hos pasienter med Helicobacter pylori-relaterte sår. *Voksne som trenger kontinuerlig NSAID-behandling:* Tilheling av NSAID-relaterte mage sår. Forebyggende behandling av NSAID-relaterte mage- og duodenalsår hos risikopasienter. *Forlenget behandling etter i.v. behandling, for å forebygge nye blødninger fra peptiske sår hos voksne.* *Behandling av Zollinger-Ellisons syndrom hos voksne.* *Gastroøsofageal reflukssykdom (GERD) hos ungdom >12 år:* Behandling av erosiv reflukssosofagitt. Langtidsbehandling av pasienter med tilhelet øsofagitt for å hindre tilbakefall. Symptomatisk behandling av GERD. *I kombinasjon med antibiotika ved behandling av duodenalsår forårsaket av Helicobacter pylori hos ungdom >12 år.*

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Skal svelges hele med vann, og skal ikke tygges eller knuses. Ved svelgeproblemer kan enterokapslene åpnes og innholdet løses opp i et halvt glass vann uten kullsyre. Det skal ikke brukes andre væsker fordi enterodrasjeringen kan løse seg opp. Drikk væsken med granulene umiddelbart eller innen 30 minutter (gis via magesonde til pasienter som ikke kan svelge, se SPC). Skyll glasset med et halvt glass vann og drikk opp. Granulene skal ikke tygges eller knuses.

**Pakninger og priser:** **20 mg:** 7 stk. (blister) kr 57,40 (trinnspris: kr 50,00). 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 126,90 (trinnspris: kr 60,70). 56 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 164,30 (trinnspris: kr 79,70). 100 stk.<sup>1</sup> kr 265,00 (trinnspris: kr 113,90). **40 mg:** 7 stk. (blister) kr 71,10 (trinnspris: kr 51,70). 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 185,40 (trinnspris: kr 71,10). 56 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 314,70 (trinnspris: kr 101,30). 100 stk.<sup>1</sup> kr 533,50 (trinnspris: kr 152,40).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se A02B C05\_1 i Refusjonslisten.

Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Esomeprazol Krka «KRKA»

## Esomeprazole Accord «Accord»

C *Protonpumpehemmer.* ATC-nr.: A02B C05

**PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 40 mg:** Hvert hetteglass inneh.: Esomeprazol (som natriumsalt) 40 mg, dinatriumedetat, natriumhydroksid.

**Indikasjoner:** *Voksne:* Gastrisk antisekretorisk behandling når oral behandling ikke er mulig, f.eks.: Gastroøsofageal reflukssykdom (GØRS) hos pasienter med øsofagitt og/eller alvorlige reflukssymptomer, heling av magesår forbundet med NSAID-behandling, forebygging av mage- og

duodenalsår forbundet med NSAID-behandling hos risikopasienter. Forebygging av ny blødning etter terapeutisk endoskopi for akutte blødende mage- eller duodenalsår. *Barn og ungdom 1-18 år*: Gastrisk antisekretorisk behandling når oral behandling ikke er mulig, f.eks.: Gastroøsofageal refluks sykdom (GØRS) hos pasienter med erosiv refluksosofagitt og/eller alvorlige refluksymptomer.

**Oppbevaring og holdbarhet:** Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Kan oppbevares utenfor ytteremballasjen i normalt innendørslys i inntil 24 timer. Oppbevares ved høyst 25°C. Ferdigblandet oppløsning bør brukes umiddelbart.

**Pakninger og priser:** 10 stk. (hettegl.) kr 648,30.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Nexium «AstraZeneca»

## Etoposid Ebewe «EBEWE»

C *Cytostatikum, podofyllotoksinderivat.* ATC-nr.: L01C B01

**KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg/ml: 1 ml inneh.:** Etoposid 20 mg, vannfri sitronsyre, benzylalkohol, etanol, makrogol 300, polysorbat 80.

**Indikasjoner:** *Voksne:* Førstelinjebehandling eller til behandling av tilbakevendende eller refraktær testikkelkreft i kombinasjon med andre godkjente cytotatika. Småcellet lungekreft, i kombinasjon med andre godkjente cytotatika. Hodgkins lymfom, i kombinasjon med andre godkjente cytotatika. Non-Hodgkins lymfom, i kombinasjon med andre godkjente cytotatika. Akutt myelogen leukemi i kombinasjon med andre godkjente cytotatika. Første- og andrelinjebehandling til behandling av høyrisiko svangerskapsrelatert trofoblastsykdom i kombinasjon med andre godkjente cytotatika. Ikke-epitelial ovariekreft, i kombinasjon med andre godkjente cytotatika. Platina-resistent/-refraktær epitelial ovariekreft. *Barn og ungdom <18 år:* Hodgkins lymfom, i kombinasjon med andre godkjente cytotatika. Non-Hodgkins lymfom, i kombinasjon med andre godkjente cytotatika.

**Oppbevaring og holdbarhet:** Oppbevares ved høyst 25°C og i originalpakningen. *Etter fortytning:* Kjemisk og fysisk stabilitet er vist i 24 timer ved romtemperatur. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C, med mindre fortytning/rekonstituering er utført under aseptiske forhold.

**Pakninger og priser:** 5 × 5 ml (hettegl.) kr 761,30.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Etoposide «Accord»

## Etoposid Fresenius Kabi «Fresenius Kabi»

C *Cytostatikum.* ATC-nr.: L01C B01

**KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg/ml: 1 ml inneh.:** Etoposid 20 mg, vannfri sitronsyre, benzylalkohol, etanol, makrogol, polysorbat 80.

**Indikasjoner:** *Testikkelkreft:* I kombinasjon med andre godkjente kjemoterapeutiske midler for behandling av førstelinje, tilbakevendende eller refraktær testikkelkreft hos voksne. *Småcellet lungekreft:* I kombinasjon med andre godkjente kjemoterapeutiske midler for behandling av småcellet lungekreft hos voksne. *Hodgkins lymfom:* I kombinasjon med andre godkjente kjemoterapeutiske midler for behandling av Hodgkins lymfom hos voksne og barn. *Non-Hodgkins lymfom:* I kombinasjon med andre godkjente kjemoterapeutiske midler for behandling av ikke-Hodgkins lymfom hos voksne og barn. *Akutt myelogen leukemi:* I kombinasjon med andre godkjente kjemoterapeutiske midler for behandling av akutt myelogen leukemi hos voksne og barn. *Svangerskapsrelatert trofoblastsykdom:* Som første- og andrelinjebehandling i kombinasjon med andre godkjente kjemoterapeutiske midler for behandling av høyrisiko svangerskapsrelatert trofoblastsykdom hos voksne. *Eggstokkreft:* I kombinasjon med andre godkjente kjemoterapeutiske midler for behandling av ikke-epitelial eggstokkreft hos voksne. Behandling av platina-resistent/-refraktær epitelial eggstokkreft hos voksne.

**Pakninger og priser:** 5 ml (hettegl.) kr 181,30.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Etoposide Accord «Accord»

## Etoricoxib Sandoz «Sandoz»

C *Antiflogistikum. NSAID. Selektiv COX-2-hemmer.* ATC-nr.: M01A H05

**T** **TABLETTER, filmdrasjerte 30 mg, 60 mg, 90 mg og 120 mg:** Hver tablett inneholder: Etorikoksib 30 mg, resp. 60 mg, 90 mg og 120 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult jernoksid (E 171), indigotin (E 132), titandioksid (E 172).

**Indikasjoner:** *Voksne (inkl. eldre) og ungdom ≥16 år:* Symptomatisk behandling av artrose, revmatoid artritt, Bekhterevs sykdom samt ved smerte og tegn på inflammasjon assosiert med akutt urinsyregikt. Korttidsbehandling av moderate smerter i forbindelse med tannkirurgi. Beslutningen om å forskrive en selektiv COX-2-hemmer skal bygge på en vurdering av den enkelte pasients samlede risiko.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas med eller uten mat. Effekten kan inntre raskere når tabletten tas uten mat, og det bør tas hensyn til dette ved behov for rask symptomlindring.

**Pakninger og priser:** **30 mg:** 28 stk.<sup>2</sup> (blister) kr 139,00 (trinnspris: kr 101,00). 98 stk.<sup>2</sup> (blister) kr 396,00 (trinnspris: kr 262,80). **60 mg:** 28 stk.<sup>2</sup> (blister) kr 196,30 (trinnspris: kr 116,80). 98 stk.<sup>2</sup> (blister) kr 596,50 (trinnspris: kr 318,00). **90 mg:** 7 stk. (blister) kr 78,40 (trinnspris: kr 59,20). 28 stk.<sup>2</sup> (blister) kr 204,90 (trinnspris: kr 128,00). 98 stk.<sup>2</sup> (blister) kr 626,40 (trinnspris: kr 354,10). **120 mg:** 7 stk. (blister) kr 90,80 (trinnspris: kr 62,40). 14 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 145,30 (trinnspris: kr 88,60).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se M01A H05\_1 i Refusjonslisten.

<sup>2</sup>Se M01A H05\_2 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Arcoxia «MSD»

## Exemestan Sandoz «Sandoz»

**C** **Aromatasehemmer.**

ATC-nr.: L02B G06

**T** **TABLETTER, filmdrasjerte 25 mg:** Hver tablett inneholder: Eksemestan 25 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Adjuvant behandling av postmenopausale kvinner med østrogenreseptor-positiv, invasiv brystkreft, etter tidligere 2-3 års adjuvant tamoksifenbehandling. Behandling av avansert brystkreft hos kvinner med naturlig eller kunstig induisert postmenopausal status med progresjon av sykdommen etter tidligere behandling med antiøstrogener. Effekt er ikke vist hos pasienter med negativ østrogenreseptor status.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør tas etter mat.

**Pakninger og priser:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 3673,70 (trinnspris: kr 1527,60).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se L02B G06\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Aromasin «Pfizer»

## Ezetimib Krka «KRKA»

**C** **Serumkolesterolensenkende middel.**

ATC-nr.: C10A X09

**T** **TABLETTER 10 mg:** Hver tablett inneholder: Ezetimib 10 mg, mannitol, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** *Primær hyperkolesterolemi:* Kombinasjonsbehandling: Som tilleggsbehandling, sammen med en HMG-CoA reduktasehemmer (statin), til kostholdsendringer hos pasienter med primær (heterozygot familiær og ikke-familiær) hyperkolesterolemi, som ikke er hensiktsmessig kontrollert med et statin alene. Monoterapi: Som tilleggsbehandling til kostholdsendringer hos pasienter med primær (heterozygot familiær og ikke-familiær) hyperkolesterolemi hvor et statin vurderes uegnet eller ikke tolereres. *Forebygging av kardiovaskulære hendelser:* Til reduksjon av risiko for kardiovaskulære hendelser (se SPC) hos pasienter med koronar hjertesykdom (CHD) og som tidligere har hatt akutt koronarsyndrom (ACS), når det gis i tillegg til pågående statinbehandling eller ved oppstart samtidig med et statin. *Homozygot familiær hyperkolesterolemi (HoFH):* Som tilleggsbehandling, sammen med et statin, til kostholdsendringer hos pasienter med HoFH. Pasientene kan også få annen tilleggsbehandling (f.eks. LDL-aferease).

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas når som helst på dagen. Kan tas med eller uten mat.

**Pakninger og priser:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 279,90 (trinnspris: kr 114,90). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 848,50 (trinnspris: kr 297,20).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C10A X09\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Ezetrol «MSD»

## Ezetimib Sandoz «Sandoz»

C *Serumkolesterolsenkende middel.* ATC-nr.: C10A X09

T **TABLETTER 10 mg:** Hver tablett inneh.: Ezetimib 10 mg, laktose, hjelpestoffer.  
**Indikasjoner:** *Primær hyperkolesterolemi:* Kombinasjonsbehandling: Som tilleggsbehandling, sammen med en HMG-CoA reductasehemmer (statin), til kostholdsendringer hos pasienter med primær (heterozygot familiær og ikke-familiær) hyperkolesterolemi, som ikke er hensiktsmessig kontrollert med et statin alene. Monoterapi: Som tilleggsbehandling til kostholdsendringer hos pasienter med primær (heterozygot familiær og ikke-familiær) hyperkolesterolemi hvor et statin vurderes uegnet eller ikke tolereres. *Forebygging av kardiovaskulære hendelser:* Til reduksjon av risiko for kardiovaskulære hendelser (se SPC) hos pasienter med koronar hjertesykdom (CHD) og som tidligere har hatt akutt koronarsyndrom (ACS), når det gis i tillegg til pågående statinbehandling eller ved oppstart samtidig med et statin. *Homozygot familiær hyperkolesterolemi (HoFH):* Som tilleggsbehandling, sammen med et statin, til kostholdsendringer hos pasienter med HoFH. Pasientene kan også få annen tilleggsbehandling (f.eks. LDL-afereose).  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas når som helst på dagen. Kan tas med eller uten mat.  
**Pakninger og priser:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 279,90 (trinnspris: kr 1 14,90). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 848,50 (trinnspris: kr 297,20).

### Refusjon:

<sup>1</sup>Se C10A X09\_1 i Refusjonslisten.

### Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Ezetrol «MSD»

## Ezetimibe Accord «Accord»

C *Serumkolesterolsenkende middel.* ATC-nr.: C10A X09

T **TABLETTER 10 mg:** Hver tablett inneh.: Ezetimib 10 mg, laktose, hjelpestoffer.  
**Indikasjoner:** Primær (heterozygot familiær og ikke-familiær) hyperkolesterolemi, som ikke er tilstrekkelig kontrollert med et statin alene: Som tilleggsbehandling til kostholdsendringer sammen med en HMG-CoA-reduktasehemmer (statin), eller som monoterapi hvor et statin anses som uegnet eller ikke tolereres. *Forebygging av kardiovaskulære hendelser:* Reduksjon av risiko for kardiovaskulære hendelser hos pasienter med hjerte-karsykdom (HKS) og en anamnese med akutt koronarsyndrom (AKS) som tillegg til pågående statinbehandling eller initiert samtidig med et statin. *Homozygot familiær hyperkolesterolemi (HoFH):* Sammen med et statin som tilleggsbehandling til kostholdsendringer. Pasientene kan også få annen tilleggsbehandling (f.eks. LDL-afereose).  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas når som helst på dagen, med eller uten mat.  
**Pakninger og priser:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 263,70 (trinnspris: kr 109,60). 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 832,30 (trinnspris: kr 292,00).

### Refusjon:

<sup>1</sup>Se C10A X09\_1 i Refusjonslisten.

### Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Ezetrol «MSD»

## Ezetimibe Orion «Orion»

C *Serumkolesterolsenkende middel.* ATC-nr.: C10A X09

T **TABLETTER 10 mg:** Hver tablett inneh.: Ezetimib 10 mg, laktose, hjelpestoffer.  
**Indikasjoner:** *Primær (heterozygot familiær og ikke-familiær) hyperkolesterolemi:* Tilleggsbehandling til kostholdsendringer sammen med en HMG-CoA-reduktasehemmer (statin) når tilstanden ikke er hensiktsmessig kontrollert med et statin alene. Tilleggsbehandling til kostholdsendringer hvor et statin vurderes uegnet/ikke tolereres. *Forebygging av kardiovaskulære hendelser:* Reduksjon av risiko for kardiovaskulære hendelser hos pasienter med koronar hjertesykdom (CHD) og som tidligere har hatt akutt koronarsyndrom (ACS), når det gis i tillegg til pågående statinbehandling/ved oppstart samtidig med et statin. *Homozygot familiær hyperkolesterolemi (HoFH):* Som tilleggsbehandling til kostholdsendringer sammen med et statin. Pasientene kan også få annen tilleggsbehandling (f.eks. LDL-afereose).  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas når som helst på dagen. Kan tas med eller uten mat.  
**Pakninger og priser:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 279,90 (trinnspris: kr 1 14,90). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 848,50 (trinnspris: kr 297,20).

### Refusjon:

<sup>1</sup>Se C10A X09\_1 i Refusjonslisten.

### Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Ezetrol «MSD»

## Ezetimib/Simvastatin Glenmark «Glenmark»

**C** *Lipidmodifiserende middel, kombinasjonspreparat inkl. HMG-CoA-reduktasehemmer.* ATC-nr.: C10B A02

**T** **TABLETTER 10 mg/20 mg og 10 mg/40 mg:** Hver tablett inneh.: Ezetimib 10 mg, simvastatin 20 mg, resp. 40 mg, laktose, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** *Forebygging av kardiovaskulære hendelser:* Reduksjon av risiko for kardiovaskulære hendelser (se SPC) hos pasienter med koronar hjertesykdom (CHD) og som tidligere har hatt akutt koronarsyndrom (ACS), som fra tidligere er behandlet med et statin eller ikke. *Hyperkolesterolemi:* Som tilleggsbehandling til kostholdsendringer hos pasienter med primær (heterozygot familiær og ikke-familiær) hyperkolesterolemi eller kombinert hyperlipidemi der bruk av et kombinasjonspreparat anses hensiktsmessig: Pasienter som ikke er hensiktsmessig kontrollert med et statin alene, pasienter som allerede behandles med et statin og ezetimib. *Homozygot familiær hyperkolesterolemi (HoFH):* Som tilleggsbehandling til kostholdsendringer hos pasienter med HoFH. Pasientene kan også få annen tilleggsbehandling (f.eks. LDL-aferease).

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas om kvelden. Kan tas med eller uten mat. Samtidig inntak av grapefruktjuice bør unngås. Skal ikke deles.

**Pakninger og priser:** **10 mg/20 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 1208,00 (trinnpris: kr 379,40). **10 mg/40 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 1405,00 (trinnpris: kr 394,20).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C10B A02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Inegy «MSD»

## Ezetimib/Simvastatin Krka «KRKA»

**C** *Lipidmodifiserende middel, kombinasjonspreparat inkl. HMG-CoA-reduktasehemmer.* ATC-nr.: C10B A02

**T** **TABLETTER 10 mg/20 mg og 10 mg/40 mg:** Hver tablett inneh.: Ezetimib 10 mg, simvastatin 20 mg resp. 40 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 10 mg/20 mg: Rødt jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** *Forebygging av kardiovaskulære hendelser:* Reduksjon av risiko for kardiovaskulære hendelser hos pasienter med koronar hjertesykdom (CHD) og tidligere akutt koronarsyndrom (ACS), som fra tidligere er eller ikke er behandlet med et statin. *Primær (heterozygot familiær og ikke-familiær) hyperkolesterolemi eller kombinert hyperlipidemi:* Som tilleggsbehandling til kostholdsendringer der bruk av et kombinasjonspreparat anses hensiktsmessig hos pasienter som ikke er hensiktsmessig kontrollert med statin alene eller som allerede behandles med statin og ezetimib. *Homozygot familiær hyperkolesterolemi (HoFH):* Som tilleggsbehandling til kostholdsendringer. Pasientene kan også få annen tilleggsbehandling (f.eks. LDL-aferease).

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Skal tas om kvelden. Kan tas med eller uten mat. Samtidig inntak av grapefruktjuice skal unngås. Tablettene bør ikke deles.

**Pakninger og priser:** **10 mg/20 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1208,00 (trinnpris: kr 379,40). **10 mg/40 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1405,00 (trinnpris: kr 394,20).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C10B A02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Inegy «MSD»

## Ezetimib/Simvastatin Sandoz «Sandoz»

**C** *Lipidmodifiserende middel, kombinasjonspreparat inkl. HMG-CoA-reduktasehemmer.* ATC-nr.: C10B A02

**T** **TABLETTER 10 mg/20 mg og 10 mg/40 mg:** Hver tablett inneh.: Ezetimib 10 mg, simvastatin 20 mg, resp. 40 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult, rødt og sort jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** *Forebygging av kardiovaskulære hendelser:* Reduksjon av risiko for kardiovaskulære hendelser (se SPC) hos pasienter med koronar hjertesykdom (CHD) og som tidligere har hatt akutt koronarsyndrom (ACS), som fra tidligere er behandlet med et statin eller ikke. *Hyperkolesterolemi:* Som tilleggsbehandling til kostholdsendringer hos pasienter med primær (heterozygot familiær og ikke-familiær) hyperkolesterolemi eller kombinert hyperlipidemi der bruk av et kombinasjonspreparat anses hensiktsmessig: Pasienter som ikke er hensiktsmessig kontrollert med et statin alene, pasienter som allerede behandles med et statin og ezetimib. *Homozygot familiær hyper-*

*kolesterolemi (HoFH):* Som tilleggsbehandling til kostholdsendringer hos pasienter med HoFH. Pasientene kan også få annen tilleggsbehandling (f.eks. low-density lipoprotein (LDL)-aferease).

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas om kvelden. Kan tas med eller uten mat. Samtidig inntak av grapefruktjuice skal unngås. Tablettene har ikke delestrek og skal ikke deles.

**Pakninger og priser:** **10 mg/20 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1467,80 (trinnpris: kr 379,40). **10 mg/40 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1749,50 (trinnpris: kr 394,20).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C10B A02\_1 i Refusjonslisten. Kan forskrives til 15.07.2019.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Inegy «MSD»

## Febuxostat Accord «Accord»

C **Hemmer av urinsyreproduksjonen.**

ATC-nr.: M04A A03

T **TABLETTER, filmdrasjerte 80 mg og 120 mg:** Hver tablett inneh.: Febuksostat 80 mg, resp. 120 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** *Voksne:* Behandling av kronisk hyperurikemi der uratavleiringer allerede har oppstått (inkl. tidligere eller nåværende tofus og/eller urinsyregikt).

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas med eller uten mat.

**Pakninger og priser:** **80 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 360,10. **120 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 377,80.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se M04A A03\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Adenuric «Menarini»

## Felodipin HEXAL «HEXAL»

C **Kalsiumantagonist.**

ATC-nr.: C08C A02

T **DEPOTTABLETTER 2,5 mg, 5 mg og 10 mg:** Hver depottablett inneh.: Felodipin 2,5 mg, resp. 5 mg og 10 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Essensiell hypertensjon.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas om morgenen. Kan tas uten mat eller til et lett måltid med lite fett. Skal svelges hele med tilstrekkelig drikke (f.eks. et glass vann). Skal ikke tas med grapefruktjuice. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses/deles.

**Pakninger og priser:** **2,5 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 262,10 (trinnpris: kr 124,90). **5 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 114,60 (trinnpris: kr 72,50). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 297,40 (trinnpris: kr 155,90). **10 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 148,90 (trinnpris: kr 87,60). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 411,70 (trinnpris: kr 229,60). 100 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 411,70 (trinnpris: kr 229,60).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C08C A02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Plendil «AstraZeneca»

## Fentanyl «Hameln»

A **Sterkvirkende analgetikum.**

ATC-nr.: N01A H01

**INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 50 µg/ml: 1 ml inneh.:** Fentanylsitrat tilsv. fentanyl 50 µg, natriumklorid, saltsyre eller natriumhydroksid til pH-justering, vann til injeksjonsvæsker.

△ **Indikasjoner:** Opioid med kortvarig virkning som brukes for nevroleptanalgesi og nevroleptanestesi, som analgetisk komponent ved generell anestesi hos intuberte, ventilerte pasienter, for analgetisk behandling hos ventilerte pasienter på intensivavdeling. Bør kun gis av erfarent personale i omgivelser som kan håndtere kontrollert respirasjon. Doseringen bør individualiseres iht. alder, kroppsvekt, fysisk tilstand, underliggende patologisk forfatning, bruk av andre medikamenter og hvilken type kirurgisk inngrep og anestesi det dreier seg om.

**Pakninger og priser:** 10 × 2 ml (glassamp.) kr 118,80. 10 × 10 ml (glassamp.) kr 273,40.

## Fentanyl «Sandoz»

A *Analgetikum ved sterke, kroniske smerter.* ATC-nr.: N02A B03

T **DEPOTPLASTER 12 µg/time, 25 µg/time, 50 µg/time, 75 µg/time og 100 µg/time:** Hvert depotplaster inneholder: Fentanyl 2,1 mg (5,25 cm<sup>2</sup>), resp. 4,2 mg (10,5 cm<sup>2</sup>), 8,4 mg (21 cm<sup>2</sup>), 12,6 mg (31,5 cm<sup>2</sup>) og 16,8 mg (42 cm<sup>2</sup>), hjelpestoffer bl.a. polyetylenetereftalat, silikonbehandlet.

△ **Indikasjoner:** *Voksne:* Behandling av alvorlige, kroniske smerter som krever kontinuerlig, langvarig opioidadministrering. *Barn ≥ 2 år:* Langvarig behandling av sterke, kroniske smerter hos barn som får opioidbehandling.

**Pakninger og priser:** 12 µg/time: 5 stk.<sup>1</sup> kr 161,00 (trinnspris: kr 137,30). 25 µg/time: 5 stk.<sup>1</sup> kr 200,60 (trinnspris: kr 166,10). 50 µg/time: 5 stk.<sup>1</sup> kr 284,90 (trinnspris: kr 255,20). 75 µg/time: 5 stk.<sup>1</sup> kr 375,10 (trinnspris: kr 331,20). 100 µg/time: 5 stk.<sup>1</sup> kr 453,10 (trinnspris: kr 399,90).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N02A B03\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Durogesic «Janssen»

## Finasterid «Actavis»

C *5-alfareduktasehemmer.* ATC-nr.: G04C B01

T **TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg:** Hver tablett inneholder: Finasterid 5 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigotin (E 132), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Indisert for behandling og kontroll av benign prostatahyperplasi (BPH) hos pasienter med forstørret prostata: For å redusere kjertelstørrelse, øke urinflow og lindre symptomer ved BPH. For å redusere risikoen for akutt urinretensjon og kirurgiske inngrep som inkluderer transurethral reseksjon av prostata (TURP) eller prostatakтоми. 5 mg tablett skal bare gis til pasienter med forstørret prostata (prostatavolum større enn ca. 40 ml).

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele. Skal ikke knuses/deles.

**Pakninger og priser:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 140,40 (trinnspris: kr 140,20). 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 400,60 (trinnspris: kr 400,60).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se G04C B01\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Proscar «MSD»

## Flecainid Sandoz «Sandoz»

C *Antiarytmikum.* ATC-nr.: C01B C04

T **TABLETTER, udrasjerte 100 mg:** Hver tablett inneholder: Flecainidacetat 100 mg, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** Behandling av AV-nodal reentrytakykardi; arytmier assosiert med Wolff-Parkinson-White-syndrom og lignende sykdommer i de aksessoriske ledningsbanene når annen behandling har vært ineffektiv. Behandling av alvorlig symptomatisk og livstruende paroksysmal ventrikulær arytmier der annen behandling ikke har gitt resultater, og i de tilfeller der annen behandling ikke har blitt tolerert. Behandling av paroksysmale atriearytmier (atrieflimmer, atrieflutter og atrie-takykardi) hos pasienter med invalidiserende symptomer etter konvertering, forutsatt at det foreligger et uttalt behov for behandling ut fra alvorlighetsgraden av de kliniske symptomene, og annen behandling har vært ineffektiv. Strukturell hjertesykdom og/eller nedsatt venstre ventrikelfunksjon bør utelukkes pga. økt risiko for proarytmisk effekt.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør tas på tom mage eller 1 time før mat for å unngå at mat påvirker absorpsjonen av legemidlet. Kan deles i 2 like doser (delestrek).

**Pakninger og priser:** 20 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 132,60. 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 323,00.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C01B C04\_2 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Tambocor «Meda»

## Fluconazol Krka «KRKA»

C *Antimykotikum.* ATC-nr.: J02A C01

T **KAPSLER, harde 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg:** Hver kapsel inneholder: Flukonazol 50 mg, resp. 100 mg, 150 mg og 200 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: 50 mg, 100 mg, 150

mg: Patentblått (E 131), titandioksid (E 171). 200 mg: Azorubin (E 122), indigokarmin (E 132), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** *Voksne: Behandling av:* Kryptokokkmeningitt. Koksidioidomykose. Invasiv candidiasis. Mukosal candidiasis inkl. orofaryngeal, øsofagus candidiasis, candiduria og kronisk mukokutan candidiasis. Kronisk oral atrofisk candidiasis («denture sore mouth») dersom tannhygiene eller topikal behandling er utilstrekkelig. Vaginal candidiasis, akutt eller residiv, når lokalbehandling er uegnet. Candidabalanitt når lokalbehandling er uegnet. Dermatomykose inkl. tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris, tinea versicolor og dermale candidainfeksjoner når systemisk behandling er indisert. Tinea unguinum (onychomycosis) når andre midler er vurdert som uegnet. *Forebygging av:* Tilbakefall av kryptokokkmeningitt hos pasienter med høy risiko for tilbakefall. Tilbakefall av orofaryngeal- eller øsofagus candidiasis hos pasienter med hiv-smitte som har høy risiko for tilbakefall. For å redusere forekomsten av residiv vaginal candidiasis (4 eller flere tilfeller pr. år). Forebygging av candidainfeksjoner hos pasienter med vedvarende nøytropeni (som pasienter med hematologiske maligniteter som får kjemoterapi eller pasienter som får hematopoetisk stamcelletransplantasjon. *Fullbårne nyfødte, spedbarn, småbarn, barn og ungdommer 0-17 år: Behandling av:* Mukosal candidiasis (oropharynx, øsofagus). Invasiv candidiasis. Kryptokokkmeningitt. *Forebygging av:* Candidainfeksjoner hos immunosupprimerte pasienter. *Vedlikeholdsbehandling:* For å forebygge tilbakefall av kryptokokkmeningitt hos barn med høy risiko for tilbakefall. **Generelt:** Behandling kan igangsettes før resultater fra kulturer og andre laboratorieundersøkelser er kjent. Når resultatene foreligger bør antiinfeksøs behandling tilpasses. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for korrekt bruk av antimykotika.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør tas til samme tidspunkt hver dag. Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele med et glass vann. Skal ikke deles eller knuses.

**Pakninger og priser:** **50 mg:** 7 stk.<sup>2</sup> (blister) kr 113,20 (trinnspris: kr 111,40). 28 stk.<sup>2</sup> (blister) kr 343,90 (trinnspris: kr 343,90). 98 stk.<sup>2</sup> (blister) kr 1113,00 (trinnspris: kr 1113,00). **100 mg:** 7 stk.<sup>2</sup> (blister) kr 230,80 (trinnspris: kr 195,20). 28 stk.<sup>2</sup> (blister) kr 814,20 (trinnspris: kr 714,30). **150 mg:** 1 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 64,00 (trinnspris: kr 58,10). 4 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 147,40 (trinnspris: kr 147,40). 6 stk.<sup>2</sup> (blister) kr 203,00 (trinnspris: kr 203,00). **200 mg:** 28 stk.<sup>2</sup> (blister) kr 1180,60 (trinnspris: kr 1180,60).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se J02A C01\_1 i Refusjonslisten.

<sup>2</sup>Se J02A C01\_2 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Diflucan «Pfizer»

## Flumazenil Fresenius Kabi «Fresenius Kabi»

C **Benzodiazepinantagonist.**

ATC-nr.: V03A B25

**INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,1 mg/ml: 1 ml inneh.:** Flumazenil 0,1 mg, dinatr. edet., acid. acetic., natr. chlorid., natr. hydroxid. q.s., aqua ad iniectionem ad 1 ml.

**Indikasjoner:** Komplet eller delvis reversering av de sentralt sedative effektene av benzodiazepiner. Brukes ved anestesi og intensivbehandling i følgende situasjoner: *Anestesi:* Terminering av hypnosedative effekter ved generell anestesi indusert og/eller opprettholdt med benzodiazepiner hos pasienter innlagt på sykehus. Reversering av benzodiazepin sedasjon ved kortvarige diagnostiske og terapeutiske prosedyrer hos oppgående pasienter og pasienter innlagt på sykehus. Reversering av sedasjon med opprettholdt bevissthet, indisert av benzodiazepiner, hos barn over 1 år. *Intensivbehandling:* For spesifikk reversering av sentrale effekter av benzodiazepiner for å gjenopprette spontan respirasjon. For diagnostisering og behandling av forgiftning eller overdose med utelukkende eller hovedsakelig benzodiazepiner.

**Pakninger og priser:** 5 × 5 ml (amp.) kr 1239,30.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Flumazenil «Hameln»

## Fluoxetin Sandoz «Sandoz»

C **Antidepressiv.**

ATC-nr.: N06A B03

T **DISPERGERBARE TABLETTER 20 mg: Hver dispergerbar tablett inneh.:** Fluoksetinhydroklorid tilsv. fluoksetin 20 mg, laktosemonohydrat. Peppermynthe- og plommesmak.

**Indikasjoner:** Depressive episoder. Tvangslidelser. Bulimia nervosa: Som supplement til psykoterapi for å redusere overspising og fremkalling av brekninger. **Barn og ungdom >8 år:** Moderat til alvorlige depressive episoder, hvis 4-6 økter med psykologisk behandling ikke har effekt på depresjonen. Barn og unge med moderat til alvorlig depresjon skal kun tilbys antidepressiver i kombinasjon med samtidig psykologisk behandling.



**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Kan svelges hele med rikelig væske. Kan oppløses i et glass vann. Kan deles i 2 like doser (delestrek).

**Pakninger og priser:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 211,30 (trinnspris: kr 135,40). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 619,90 (trinnspris: kr 354,00).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N06A B03\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Fontex «Lilly»

## Fluoxetine Orion «Orion»

C *Antidepressiv.* ATC-nr.: N06A B03

T **KAPSLER, harde 20 mg:** Hver kapsel inneh.: Fluoksetinhydroklorid tilsv. fluoksetin 20 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172), patentblå V (E 131), titandioksid (E 171), sort jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** *Voksne:* Depressive episoder. Tvangslidelse (OCD). Bulimia nervosa, som supplement til psykoterapi for reduksjon av overspising og fremkalling av brekninger. *Barn og ungdom ≥8 år:* Moderat til alvorlig depressiv episode ved uteblitt respons etter 4-6 ganger med psykologisk behandling. Antidepressiver til barn/ungdom med moderat til alvorlig depresjon skal kun tilbys i kombinasjon med psykologisk behandling.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas som enkeltdose eller oppdelte doser. Kan tas med eller uten mat. Svelges med vann. Skal ikke tygges.

**Pakninger og priser:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 211,30 (trinnspris: kr 135,40). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 619,90 (trinnspris: kr 354,00).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N06A B03\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Fluoxetin «Mylan»

## Flutikason Cipla «Cipla»

C *Kortikosteroid.* ATC-nr.: R03B A05

T **INHALASJONSAEROSOL, suspensjon 125 µg/dose og 250 µg/dose:** Hver dose inneh.: Flutikasonpropionat 125 µg, resp. 250 µg, norfluran (HFA 134a).

**Indikasjoner:** *Voksne og ungdom >16 år:* Vedlikeholdsbehandling av vedvarende astma som profylaktisk behandling. Skal ikke brukes til hurtig lindring av bronkospasme.

**Pakninger og priser:** **125 µg/dose:** 120 doser<sup>1</sup> kr 215,00 (trinnspris: kr 137,30). **250 µg/dose:** 120 doser<sup>1</sup> kr 340,30 (trinnspris: kr 207,20).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se R03B A05\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Flutide «GlaxoSmithKline»

## Furosemid «Orion»

C *Diuretikum.* ATC-nr.: C03C A01

T **TABLETTER 20 mg og 40 mg:** Hver tablett inneh.: Furosemid 20 mg, resp. 40 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 20 mg: Patentblått (E 131).

**Indikasjoner:** Alle former for ødemer, også ved nedsatt nyrefunksjon. Forsert diurese ved intoksikasjoner. Hypertensjon hvor tiazider er uegnet, som ved sterkt nedsatt nyrefunksjon eller diabetes. Forsøksvis hvor andre diuretika ikke har gitt effekt. Barn: Hovedindikasjon er hjertesvikt. For øvrig er indikasjonsområdet som ovenfor angitt. Ved sterkt nedsatt nyrefunksjon, se Furosemid 500 mg «Orion».

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Dosering i forbindelse med måltid kan forsinke absorpsjonen. Kan deles (delestrek). Kan knuses.

**Pakninger og priser:** **20 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 76,10. 10 × 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 435,10. **40 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 76,10. 10 × 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 435,10.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C03C A01\_3 i Refusjonslisten.

Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Furix «Takeda»

## Furosemid 500 mg «Orion»

C *Diuretikum.* ATC-nr.: C03C A01

T **TABLETTER 500 mg:** Hver tablett inneholder: Furosemid 500 mg, hjelpestoffer.  
**Indikasjoner:** Sterkt nedsatt nyrefunksjon (glomerulusfiltrat <20 mg/minutt): Akutt og kronisk nyresvikt, nefrotisk syndrom. Kronisk lungeødem, refraktære ødemer ved hjertesvikt. Ved kronisk nyresvikt kan preparatet anvendes i differensialdiagnosen mellom funksjonell og organisk betinget oligo/anuri.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Dosering i forbindelse med måltid kan forsinke absorpsjonen. Kan deles (delestrek). Kan knuses.

**Pakninger og priser:** 5 × 20 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 412,20.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C03C A01\_1 i Refusjonslisten.

Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Furix «Takeda»

## Gabapentin Accord «Accord»

C *Antiepileptikum.* ATC-nr.: N03A X12

T **KAPSLER, harde 100 mg, 300 mg og 400 mg:** Hver kapsel inneholder: Gabapentin 100 mg, resp. 300 mg og 400 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Indigokarmin (E 132), skjellakk (E 904), titandioksid (E 171). 300 mg: Gult jernoksid (E 172). 400 mg: Rødt og gult jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** *Epilepsi:* Tilleggsbehandling ved epilepsi med partielle anfall med og uten sekundær generalisering hos voksne og barn ≥6 år. Monoterapi ved behandling av epilepsi med partielle anfall med og uten sekundær generalisering hos voksne og barn ≥12 år. *Perifer nevropatisk smerte:* Behandling av perifer nevropatisk smerte, f.eks. smertefull diabetisk nevropati og postherpetisk nevrergi hos voksne.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele med rikelig vann.

**Pakninger og priser:** **100 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 105,00. **300 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 204,60. **400 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (boks.) kr 273,70.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N03A X12\_1 i Refusjonslisten.

Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Neurontin «Pfizer»

## Galantamin Krka «KRKA»

C *Acetylkolinesterasehemmer.* ATC-nr.: N06D A04

T **DEPOTKAPSLER, harde 8 mg, 16 mg og 24 mg:** Hver depotkapsel inneholder: Galantaminhydrobromid tilsv. galantamin 8 mg, 16 mg og 24 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), jernoksid (E 172) og svart trykkfarge.

**Indikasjoner:** Symptomatisk behandling av Alzheimers demens av mild til moderat alvorlig grad.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Skal tas om morgenen. Skal helst tas med mat. Væskeinntaket må være tilstrekkelig under behandlingen. Skal svelges hele med væske. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses. Ved svelgeproblemer kan kapslene åpnes og innholdet svelges med væske (ikke tygges/knuses).

**Pakninger og priser:** **8 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 592,20. **16 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 866,80. **84 stk.**<sup>1</sup> (blister) kr 2527,90. **24 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 947,50.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N06D A04\_1 i Refusjonslisten.

Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Reminyl «Janssen»

## Glimepirid «Teva»

C *Antidiabetikum.* ATC-nr.: A10B B12

T **TABLETTER 1 mg, 2 mg, 3 mg og 4 mg:** Hver tablett inneh.: Glimepirid 1 mg, resp. 2 mg, 3 mg og 4 mg, laktosemonohydrat ca. 140 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 1 mg: Rødt jernoksid (E 172). 2 mg: Indigokarmin aluminumlake (E 132), gult jernoksid (E 172). 3 mg: Gult jernoksid (E 172). 4 mg: Indigokarmin aluminumlake (E 132).

**Indikasjoner:** Behandling av diabetes mellitus type 2 når kostregulering, fysisk aktivitet og vektreduksjon alene ikke er tilstrekkelig.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Dosen bør tas umiddelbart før eller til en solid frokost. Bør svelges sammen med minst et 1/2 glass vann. Kan deles (delestrek).

**Pakninger og priser:** **1 mg:** 90 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 65,80 (trinnspris: kr 65,80), **2 mg:** 90 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 102,60 (trinnspris: kr 102,60), **3 mg:** 90 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 133,30 (trinnspris: kr 133,30), **4 mg:** 90 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 161,90 (trinnspris: kr 161,90).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se A10B B12\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Amaryl «sanofi-aventis»

## Glimepirid HEXAL «HEXAL»

C *Antidiabetikum.* ATC-nr.: A10B B12

T **TABLETTER 1 mg, 2 mg, 3 mg og 4 mg:** Hver tablett inneh.: Glimepirid 1 mg, resp. 2 mg, 3 mg og 4 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: 1 mg: Rødt jernoksid (E 172). 2 mg: Gult jernoksid (E 172), indigotin (E 132). 3 mg: Gult jernoksid (E 172). 4 mg: Indigotin (E 132).

**Indikasjoner:** Behandling av type 2 diabetes mellitus når diett, fysisk aktivitet og vektreduksjon alene ikke er tilstrekkelig.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Dosen bør tas like før eller til dagens første måltid. Bør svelges hele sammen med minst et 1/2 glass vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses. Kan deles (delestrek).

**Pakninger og priser:** **1 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 42,50 (trinnspris: kr 42,50). 90 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 65,80 (trinnspris: kr 65,80). **2 mg:** 90 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 102,60 (trinnspris: kr 102,60). **3 mg:** 90 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 133,30 (trinnspris: kr 133,30). **4 mg:** 90 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 161,90 (trinnspris: kr 161,90).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se A10B B12\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Amaryl «sanofi-aventis»

## Hydofon «2care4 Generics»

A *Opioidanalgetikum.* ATC-nr.: N02A A03

T **INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg/ml:** Hver ampulle (1 ml) inneh.: Hydromorfonklorid 50 mg tilsv. hydromorfon 44,33 mg, natriumsitrat, natriumklorid, sitronsyremonohydrat, vann til injeksjonsvæsker.

△ **Indikasjoner:** Behandling av sterke smerter hos voksne og ungdom >12 år.

**Oppbevaring og holdbarhet:** Skal ikke fryses. Brukes umiddelbart etter anbrudd. Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist i 7 dager ved 5°C, og i 48 timer ved 25°C og 37°C. Fortynnede oppløsninger i polykarbonatsprøyter bør ikke oppbevares >24 timer. Av mikrobiologiske hensyn bør legemidlet brukes umiddelbart. Bruker er selv ansvarlig for oppbevaringstid og -betingelser før bruk dersom legemidlet ikke brukes umiddelbart. Det skal vanligvis ikke være >24 timer ved 2-8°C, hvis ikke fortynning er utført under kontrollerte og validerte aseptiske forhold. For ytterligere informasjon vedrørende uforlikeligheter og fortynning, se pakningsvedlegget.

**Pakninger og priser:** 5 × 1 ml<sup>1</sup> (amp.) kr 2173,10.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N02A A03\_2 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Palladon «Mundipharma»

## Hydrochlorothiazide Orion «Orion»

C *Low-ceiling tiaziddiuretikum.* ATC-nr.: C03A A03

- T** **TABLETTER, filmdrasjerte 12,5 mg og 25 mg:** Hver tablett inneh.: Hydroklortiazid 12,5 mg, resp. 25 mg, laktose, hjelpestoffer.  
**Indikasjoner:** Hypertensjon. Ødem i forbindelse med hjertesvikt. Ødem som er forårsaket av andre tilstander.  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør helst tas om morgenen, med tilstrekkelig mengde væske. Kan tas med eller uten mat. *Tabletter 25 mg:* Kan deles i 2 like deler (delestrek).  
**Pakninger og priser:** **12,5 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 92,40. **25 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 112,40.  
**Refusjon:**  
<sup>1</sup>Se C03A A03\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Tabletter 12,5 mg: Hydromed «MediLink»  
Tabletter 25 mg: Hydrochlorothiazide Orifarm «Orifarm Generics»

## Hydroxyzine Bluefish «Bluefish»

- C** *Anxiolytikum. Antihistamin.* ATC-nr.: N05B B01
- T** **TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 25 mg:** Hver tablett inneh.: Hydroksyzinhydroklorid 10 mg, resp. 25 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).  
**△** **Indikasjoner:** **10 mg:** Urticaria og kløe. Symptomatisk behandling av angst og bekymring hos voksne. **25 mg:** Symptomatisk behandling av angst hos voksne. Symptomatisk behandling av kløe i forbindelse med urticaria hos voksne, ungdom og barn (5-11 år).  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. **25 mg:** Skal svelges hele med tilstrekkelig mengde vann.  
**Pakninger og priser:** **10 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 111,90. **25 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 122,90.  
**Refusjon:**  
<sup>1</sup>Se N05B B01\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Atarax «UCB»

## Hydroxyzine Orifarm «Orifarm Generics»

- C** *Anxiolytikum. Antihistamin.* ATC-nr.: N05B B01
- T** **TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 25 mg:** Hver tablett inneh.: Hydroksyzinhydroklorid 10 mg, resp. 25 mg, laktose 56 mg, resp. 140 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).  
**△** **Indikasjoner:** Symptomatisk behandling av urticaria og pruritus hos voksne, ungdom og barn >5 år. Symptomatisk behandling av angst hos voksne der ikke noe alternativt legemiddel er indisert.  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Svelges med tilstrekkelig mengde vann. Tas med eller uten mat. *Tabletter 25 mg:* Kan deles i like doser (delestrek).  
**Pakninger og priser:** **10 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 111,90. **25 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 122,90.  
**Refusjon:**  
<sup>1</sup>Se N05B B01\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Atarax «UCB»

## Hydroxyzine Orion «Orion»

- C** *Anxiolytikum. Antihistamin.* ATC-nr.: N05B B01
- T** **TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 25 mg:** Hver tablett inneh.: Hydroksyzinhydroklorid 10 mg, resp. 25 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).  
**△** **Indikasjoner:** Symptomatisk behandling av uro hos voksne hvor alternative legemidler ikke er indisert. Symptomatisk behandling av urticaria og kløe. Indisert hos voksne, ungdom og barn ≥5 år.  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Svelges hele med tilstrekkelig mengde vann. *Tabletter 25 mg:* Kan deles i 2 like doser (delestrek).  
**Pakninger og priser:** **10 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 111,90. **25 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 122,90.  
**Refusjon:**  
<sup>1</sup>Se N05B B01\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Atarax «UCB»

## Ifirmasta «KRKA»

C *Angiotensin II-reseptorantagonist.* ATC-nr.: C09C A04

T **TABLETTER, filmdrasjerte 150 mg og 300 mg:** Hver tablett inneholdt: Irbesartan 150 mg, resp. 300 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** *Voksne:* Behandling av essensiell hypertensjon. Behandling av nyresykdom ved hypertensjon og type 2 diabetes mellitus som del av et antihypertensivt legemiddelregime.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør tas til samme tid hver dag. Kan tas med eller uten mat. Svelges med tilstrekkelig mengde væske.

**Pakninger og priser:** **150 mg:** 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 522,90 (trinnspris: kr 225,50). **300 mg:** 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 522,90 (trinnspris: kr 279,80).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C09C A04\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Aprovel «sanofi-aventis»

## Imatinib Accord «Accord»

C *Protein-tyrosinkinaseinhibitor.* ATC-nr.: L01X E01

H **TABLETTER, filmdrasjerte 100 mg og 400 mg:** Hver tablett inneholdt: Imatinib 100 mg, resp. 400 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** Behandling av voksne og barn med nylig diagnostisert Philadelphia-kromosom (BCR-ABL)-positiv (Ph<sup>+</sup>) kronisk myelogen leukemi (KML) i de tilfeller benmargstransplantasjon ikke vurderes som førstelinjehandling. Behandling av voksne og barn med Ph<sup>+</sup> KML i kronisk fase etter mislykket behandling med interferon alfa, eller i akselerert fase eller blastkrise. Behandling av voksne og barn med nylig diagnostisert Philadelphia-kromosom-positiv akutt lymfoblastisk leukemi (Ph<sup>+</sup> ALL), samtidig med kjemoterapi. Som monoterapi til behandling av voksne ved tilbakevendende eller refraktær Ph<sup>+</sup> ALL. Behandling av voksne med myelodysplastiske/myeloproliferative sykdommer (MDS/MPD) assosiert med blodplatederivert vekstfaktor-reseptor (PDGFR) genrearrangering. Behandling av voksne med avansert hypereosinofilt syndrom (HES) og/eller kronisk eosinofil leukemi (KEL) med FIP1L1-PDGFR $\alpha$ -rearrangering. Behandling av voksne med inoperabel dermatofibrosarkom protuberans (DFSP), og hos voksne med tilbakevendende og/eller metastatisk DFSP som ikke er egnet for kirurgi. *Generelt:* Effekten av imatinib på utfallet av benmargstransplantasjon er ukjent. Hos voksne og barn er effekten av imatinib basert på generelle hematologiske og cytogenetiske responsrater samt progresjonsfri overlevelse ved KML, på hematologiske og cytogenetiske responsrater ved Ph<sup>+</sup> ALL, MDS/MPD, på hematologiske responsrater ved HES/KEL og på objektive responsrater hos voksne med inoperabel og/eller metastaserende DFSP. Erfaring med imatinib hos pasienter med MDS/MPD assosiert med PDGFR-genrearrangering er svært begrenset. Bortsett fra ved nylig diagnostisert KML i kronisk fase, foreligger det ingen kontrollerte studier som viser et klinisk fortrinn eller økt overlevelse for disse sykdommene.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Skal tas med mat og et stort glass vann (minsker risikoen for gastrointestinale irritasjoner). Svelges hele. Ved svelgeproblemer kan tablettene løses opp i et glass vann eller eplejuice. Nødvendig antall tabletter tilsettes til passende mengde væske (ca. 50 ml for 1 tablett på 100 mg, 200 ml for 1 tablett på 400 mg), blandes med skje og drikkes umiddelbart etter oppløsning. Tablettene har delestrek, men skal ikke deles.

**Pakninger og priser:** **100 mg:** 60 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 7946,40. **400 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 15600,90.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>H-resept: L01X E01\_3 Imatinib

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Glivec «Novartis»

## ▼ Imatinib Cipla «Cipla»

C *Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.* ATC-nr.: L01X E01

H **KAPSLER, harde 100 mg og 400 mg:** Hver kapsel inneholdt: Imatinib (som mesilat) 100 mg, resp. 400 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt og gult jernoksid (E 172), titanoksid (E 171).

**Indikasjoner:** *Voksne og barn:* Med nylig diagnostisert Philadelphia-kromosom (bcra-bl) positiv (Ph<sup>+</sup>) kronisk myelogen leukemi (KML) i de tilfeller benmargstransplantasjon ikke vurderes som førstelinjehandling. Med Ph<sup>+</sup> KML i kronisk fase etter mislykket behandling med interferon alfa, eller i akselerert fase eller blastkrise. Med nylig diagnostisert Philadelphia-kromosom-positiv akutt lymfoblastisk leukemi (Ph<sup>+</sup> ALL) samtidig med kjemoterapi. *Voksne:* Som monoterapi ved tilbakevendende eller refraktær Ph<sup>+</sup> ALL. Med myelodysplastiske/myeloproliferative sykdommer

(MDS/MPD) assosiert med blodplatederivert vekstfaktor-reseptor (PDGFR) gen-rearrangering. Med avansert hypereosinofilt syndrom (HES) og/eller kronisk eosinofil leukemi (KEL) med FIP1L1-PDGFR $\alpha$  rearrangering. Behandling av voksne med inoperabel dermatofibrosarkom protuberans (DFSP), og hos voksne med tilbakevendende og/eller metastatisk DFSP som ikke er egnet for kirurgi. Effekten av imatinib på utfallet av benmargstransplantasjon er ikke kjent. Hos voksne og barn er effekten av imatinib basert på generelle hematologiske og cytogenetiske responsrater samt progresjonsfri overlevelse ved KML, på hematologiske og cytogenetiske responsrater ved Ph+ ALL, MDS/MPD, på hematologiske responsrater ved HES/KEL og på objektive responsrater hos voksne med inoperabel og/eller metastaserende DFSP. Erfaring med imatinib hos pasienter med MDS/MPD assosiert med PDGFR gen-rearrangering er svært begrenset. Med unntak av nylig diagnostisert KML i kronisk fase, foreligger det ingen kontrollerte studier som viser klinisk fortrinn eller økt overlevelse for disse sykdommene.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Skal tas med mat og et stort glass vann for å begrense risikoen for gastrointestinale irritasjoner. For pasienter (barn) som ikke er i stand til å svelge kapslene, kan innholdet i kapselen løses opp i et glass med enten vann eller eplejuice. Da dyrestudier har vist reproduksjonstoksitet, og potensiell risiko for humane fostre er ukjent, bør kvinner i fruktbar alder rådes til å håndtere kapselinnholdet med forsiktighet og unngå kontakt med hud eller øyne samt inhalasjon, dersom kapslene åpnes. Hendene bør vaskes umiddelbart etter at åpne kapsler er håndtert.

**Pakninger og priser:** 100 mg: 60 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 7946,40. 400 mg: 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 15600,90.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>H-resept: L01X E01\_3 Imatinib

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Glivec «Novartis»

## Imatinib Sandoz «Sandoz»

C *Protein-tyrosinkinaseinhibitor.*

ATC-nr.: L01X E01

H **TABLETTER, filmdrasjerte 100 mg og 400 mg:** Hver tablett inneh.: Imatinib (som mesilat) 100 mg, resp. 400 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** Behandling av voksne og barn med nylig diagnostisert Philadelphia-kromosom (BCR-ABL)-positiv (Ph+) kronisk myelogen leukemi (KML) i de tilfeller benmargstransplantasjon ikke vurderes som førstelinjehandling. Behandling av voksne og barn med Ph+ KML i kronisk fase etter mislykket behandling med interferon-alfa, eller i akselerert fase eller blastkrise. Behandling av voksne og barn med nylig diagnostisert Philadelphia-kromosom-positiv akutt lymfoblastisk leukemi (Ph+ ALL), samtidig med kjemoterapi. Behandling av voksne som monoterapi ved tilbakevendende eller refraktær Ph+ ALL. Behandling av voksne med myelodysplastiske/myeloproliferative sykdommer (MDS/MPD) assosiert med blodplatederivert vekstfaktor-reseptor (PDGFR) gen-rearrangering. Behandling av voksne med avansert hypereosinofilt syndrom (HES) og/eller kronisk eosinofil leukemi (KEL) med FIP1L1-PDGFR $\alpha$ -rearrangering. Behandling av voksne med inoperabel dermatofibrosarkom protuberans (DFSP), og hos voksne med tilbakevendende og/eller metastatisk DFSP som ikke er egnet for kirurgi. *Generelt:* Effekten av imatinib på utfallet av benmargstransplantasjon er ukjent. Hos voksne og barn er effekten av imatinib basert på generelle hematologiske og cytogenetiske responsrater samt progresjonsfri overlevelse ved KML, på hematologiske og cytogenetiske responsrater ved Ph+ ALL, MDS/MPD, på hematologiske responsrater ved HES/KEL og på objektive responsrater hos voksne med inoperabel og/eller metastaserende DFSP. Erfaring med imatinib hos pasienter med MDS/MPD assosiert med PDGFR-gen-rearrangering er svært begrenset (se SPC). Med unntak av nylig diagnostisert KML i kronisk fase, foreligger det ingen kontrollerte studier som viser et klinisk fortrinn eller økt overlevelse for disse sykdommene.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Svelges med et stort glass vann. Skal tas med mat (minsker risikoen for gastrointestinale irritasjoner). Ved svelgeproblemer kan tablettene løses opp i et glass vann (ikke mineralvann/brus) eller eplejuice. Nødvendig antall tabletter tilsettes til passe mengde væske (ca. 50 ml for 1 tablett på 100 mg, 200 ml for 1 tablett på 400 mg), blandes med skje og drikkes umiddelbart etter fullstendig oppløsning. *Tabletter 100 mg:* Kan deles i like doser (delestrek). *Tabletter 400 mg:* Kan deles i like doser (delestrek).

**Pakninger og priser:** 100 mg: 60 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 7946,40. 400 mg: 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 15600,90.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>H-resept: L01X E01\_3 Imatinib

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Glivec «Novartis»

## Irbesartan Sandoz «Sandoz»

C *Angiotensin II-antagonist.*

ATC-nr.: C09C A04

- T** **TABLETTER, filmdrasjerte 150 mg og 300 mg:** Hver tablett inneh.: Irbesartan 150 mg, resp. 300 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).  
**Indikasjoner:** Til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne. Til behandling av nyresykdom hos voksne med hypertensjon og diabetes mellitus type 2 som del av et antihypertensivt legemiddelregime.  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør svelges sammen med tilstrekkelig mengde væske. Kan tas med eller uten mat. Kan deles for å lette svelging (delestrek).  
**Pakninger og priser:** **150 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 185,20 (trinnspris: kr 95,70). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 532,80 (trinnspris: kr 229,30). **300 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 185,20 (trinnspris: kr 115,30). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 532,80 (trinnspris: kr 284,80).  
**Refusjon:**  
<sup>1</sup>Se C09C A04\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Aprovel «sanofi-aventis»

## Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz «Sandoz»

- C** *Angiotensin II-antagonist og diuretikum.* ATC-nr.: C09D A04
- T** **TABLETTER, filmdrasjerte 150 mg/12,5 mg, 300 mg/12,5 mg og 300 mg/25 mg:** Hver tablett inneh.: Irbesartan 150 mg, resp. 300 mg, hydroklortiazid 12,5 mg, resp. 25 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), sort og rødt jernoksid (E 172).  
**Indikasjoner:** Behandling av essensiell hypertensjon. Fastdosekombinasjonen er indisert for voksne som ikke oppnår adekvat blodtrykkskontroll med irbesartan eller hydroklortiazid alene.  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Dosen bør tas til samme tid hver dag. Kan tas med eller uten mat. Svelges hele med et glass vann.  
**Pakninger og priser:** **150 mg/12,5 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 196,60 (trinnspris: kr 95,80). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 552,80 (trinnspris: kr 234,60). **300 mg/12,5 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 196,60 (trinnspris: kr 110,30). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 570,80 (trinnspris: kr 283,30). **300 mg/25 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 580,90 (trinnspris: kr 283,30).  
**Refusjon:**  
<sup>1</sup>Se C09D A04\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

CoAprovel «sanofi-aventis»

## Irinotecan Accord «Accord»

- C** *Cytostatikum.* ATC-nr.: L01X X19
- KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg/ml: 1 ml inneh.:** Irinotecanhydrokloridtrihydrat 20 mg tilsv. irinotecan 17,33 mg, sorbitol, melkesyre, natriumhydroksid og saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.  
**Indikasjoner:** Behandling av pasienter med fremskreden kolorektalkreft: I kombinasjon med 5-FU og folinsyre hos pasienter uten forutgående kjemoterapi for fremskreden sykdom. Som enkeltmiddel hos pasienter der etablert behandlingskur med 5-FU har mislykkes. I kombinasjon med cetuximab for behandling av pasienter med metastaserende kolorektalkreft som uttrykker epidermal vekstfaktorreseptor (EGFR), KRAS villtype metastaserende kolorektalkreft, som ikke har fått behandling mot metastaserende sykdom eller hvor cytotoxisk behandling med irinotecan har mislykkes. I kombinasjon med 5-FU folinsyre og bevacizumab som førstelinjebehandling hos pasienter med metastatisk karsinom i kolon eller rektum. I kombinasjon med kapecitabin med eller uten bevacizumab som førstelinjebehandling av pasienter med metastatisk kolorektalt karsinom.  
**Pakninger og priser:** 2 ml (hettegl.) kr 764,10. 5 ml (hettegl.) kr 1837,40. 15 ml (hettegl.) kr 5439,70. 25 ml (hettegl.) kr 9042,10.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Irinotecan Fresenius Kabi «Fresenius Kabi»

## Isomex «RPH Pharmaceuticals»

- C** *Nitropreparat.* ATC-nr.: C01D A14
- T** **DEPOTTABLETTER 30 mg:** Hver depottablett inneh.: Isosorbidmononitrat 30 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer.  
**Indikasjoner:** *Voksne:* Til profylaktisk behandling av angina pectoris.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele med minst 1/2 glass vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses.

**Pakninger og priser:** 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 222,60.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C01D A14\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Imdur «TopRidge Pharma»

## Ivabradine Accord «Accord»

C *Middel for hjerteterapi.* ATC-nr.: C01E B17

T **TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg og 7,5 mg:** Hver tablett inneh.: Ivabradin (som hydroklorid) 5 mg, resp. 7,5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Symptomatisk behandling av kronisk stabil angina pectoris hos voksne med koronarsykdom og normal sinusrytme og puls  $\geq 70$  slag/minutt, som har en kontraindikasjon eller intoleranse overfor betablokkere, eller i kombinasjon med betablokkere hos pasienter som ikke kan kontrolleres tilfredsstillende med optimal dose betablokkere. Behandling av kronisk hjertesvikt NYHA klasse II-IV med systolisk dysfunksjon, hos pasienter i sinusrytme og som har en puls på  $\geq 75$  slag/minutt, i kombinasjon med standardbehandling inkl. behandling med betablokkere, eller når behandling med betablokkere er kontraindisert eller ikke tålt.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas morgen og kveld. Tas med mat for å redusere intraindividuell variasjon i eksponering, da matinntak forsinket absorpsjonen og øker plasmakonsentrasjonen med 20-30%. *Tabletter 5 mg:* Kan deles i like doser (delestrek).

**Pakninger og priser:** 5 mg: 56 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 506,50. 112 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 976,80. 7,5 mg: 56 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 506,50. 112 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 976,80.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C01E B17\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Procoralan «Les Laboratoires Servier»

## Kaliumklorid Orifarm «Orifarm Generics»

CF *Kaliumklorid.* ATC-nr.: A12B A01

T **DEPOTTABLETTER 750 mg:** Hver depottablett inneh.: Kaliumklorid 750 mg, sakkarinnatrium, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Hypokalemi. Profylaktisk ved behandling med diuretika.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele med et glass vann. Ved inntak bør pasienten stå eller sitte oppreist, og ikke ligge ned.

**Pakninger og priser:** 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 145,30.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se A12B A01\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Kaleorid «Karo Pharma»

## Klotrimazol «Mylan»

CF *Antimykotikum.* ATC-nr.: D01A C01

**KREM 1%: 1 g inneh.:** Klotrimazol 10 mg, benzylalkohol, polysorbat 60, cetylester voks, cetostearylalkohol, octyldodecanol, sorbitanmonostearat, renset vann.

**Indikasjoner:** Dermatomykoser forårsaket av dermatofytter (Trichophyton-, Epidermophyton-, Microsporum-arter), gjær-, mugg-, og andre sopparter. Dermatoser med sekundærinfeksjon av sopp. Pityriasis versicolor. Erythrasma. **Reseptfri bruk:** Til bruk mot fotsopp. Til barn kun i samråd med lege. Voksne og barn >15 år: Til bruk mot soppinfeksjoner i og rundt skjeden.

**Pakninger uten resept:** Krem 1% 20 g er unntatt fra reseptplikt.

**Pakninger og priser:** 20 g kr \*.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Canesten «Bayer AB»



## Lacosamide Accord «Accord»

- C *Antiepileptikum.* ATC-nr.: N03A X18
- T **TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg:** Hver tablett inneholder: Lakosamid 50 mg, resp. 100 mg, 150 mg og 200 mg, lecitin (soya), hjelpestoffer. Fargestoff: 50 mg: Skjellakk, indigokarmin aluminium (E 132), rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 100 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 150 mg: Gult, rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 200 mg: Skjellakk, indigokarmin aluminium (E 132), titandioksid (E 171).  
**Indikasjoner:** Monoterapi og tilleggsbehandling ved behandling av voksne, ungdom og barn  $\geq 4$  år med partiell epilepsi med eller uten sekundær generalisering.  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Svelges med et glass vann. Tas med eller uten mat.  
**Pakninger og priser:** 50 mg: 14 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 154,80. 56 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 506,00. 100 mg: 56 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 954,40. 150 mg: 56 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1409,50. 200 mg: 56 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1864,60.  
**Refusjon:**  
<sup>1</sup>Se N03A X18\_1 i Refusjonslisten.

Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Vimpat «UCB»

## Latiotim «Sandoz»

- C *Glaukommiddel.* ATC-nr.: S01E D51
- T **ØYEDRÅPER, oppløsning 50 µg/ml + 5 mg/ml: 1 ml inneholder:** Latanoprost 50 µg, timololmaleat 6,8 mg tilsv. timolol 5 mg, benzalkoniumklorid, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfat, vannfritt natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker, natriumhydroksid/saltsyre til pH-justering.  
**Indikasjoner:** Reduksjon av intraokulært trykk (IOP) hos pasienter med åpenvinkelglaukom og okulær hypertensjon når behandling med lokale betablokkere eller prostaglandinanaloger ikke gir tilstrekkelig effekt.  
**Pakninger og priser:** 2,5 ml<sup>1</sup> (plastflaske) kr 111,80 (trinnspris: kr 111,10). 3 × 2,5 ml<sup>1</sup> (plastflaske) kr 262,80 (trinnspris: kr 260,80).  
**Refusjon:**  
<sup>1</sup>Se S01E D51\_2 i Refusjonslisten.

Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Xalcom «Pfizer»

## Lerkanidipin «Actavis»

- C *Kalsiumantagonist.* ATC-nr.: C08C A13
- T **TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 20 mg:** Hver tablett inneholder: Lerkanidipinhydroklorid 10 mg, resp. 20 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: 10 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 20 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).  
**Indikasjoner:** Mild til moderat essensiell hypertensjon.  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Dosen bør helst tas om morgenen. Tas minst 15 minutter før mat. Inntak av grapefrukt eller grapefruktjuice bør unngås. Bør svelges hele med et halvt glass vann. Kan deles (delestrek).  
**Pakninger og priser:** 10 mg: 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 241,30 (trinnspris: kr 63,00). 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 549,50 (trinnspris: kr 112,20). 20 mg: 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 798,60 (trinnspris: kr 155,90).  
**Refusjon:**  
<sup>1</sup>Se C08C A13\_1 i Refusjonslisten.

Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Zanidip «Meda»

## Letrozol Accord «Accord»

- C *Aromatasehemmer.* ATC-nr.: L02B G04
- T **TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg:** Hver tablett inneholder: Letrozol 2,5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).  
**Indikasjoner:** Adjuvant behandling av postmenopausale kvinner med hormonreseptor-positiv invasiv brystkreft i tidlig fase. Utvidet adjuvant behandling av hormonavhengig invasiv brystkreft hos postmenopausale kvinner som har gjennomgått standard adjuvant behandling med tamoksifen i 5 år. Førstelinjebehandling av hormonavhengig avansert brystkreft hos postmenopausale kvinner.

Behandling av avansert brystkreft med tilbakefall eller sykdomsprogresjon hos kvinner med naturlig eller kunstig induisert postmenopausal endokrin status etter tidligere behandling med antiøstrogener. Neo-adjvant behandling av postmenopausale kvinner med hormonreseptor-positiv, HER-2 negativ brystkreft, der kjemoterapi ikke er egnet og umiddelbar kirurgi ikke er indisert. Effekt er ikke vist hos pasienter med hormonreseptor-negativ brystkreft.

**Dosering:** Se SPC **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele med et glass vann eller annen væske.

**Pakninger og priser:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 465,20 (trinnpris: kr 374,00). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1466,10 (trinnpris: kr 1099,50).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se L02B G04\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Femar «Novartis»

## Letrozol Orifarm «Orifarm Generics»

C *Aromatasehemmer.* ATC-nr.: L02B G04

T **TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg:** *Hver tablett inneh.:* Letrozol 2,5 mg, laktosemonohydrat 61,5 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Adjuvant behandling av postmenopausale kvinner med hormonreseptorpositiv brystkreft i tidlig fase. Utvidet adjuvant behandling av hormonavhengig brystkreft i tidlig fase hos postmenopausale kvinner som har gjennomgått standard adjuvant behandling med tamoksifen i 5 år. Primær behandling av hormonavhengig avansert brystkreft hos postmenopausale kvinner. Behandling av avansert brystkreft hos kvinner med naturlig eller kunstig induisert postmenopausal status med tilbakefall eller progresjon av sykdommen etter tidligere behandling med antiøstrogener. Neo-adjvant behandling av postmenopausale kvinner med hormonreseptorpositiv, HER-2 negativ brystkreft hvor kjemoterapi ikke er egnet og akutt operasjon ikke er indisert. Effekt er ikke vist hos pasienter med hormonreseptornegativ brystkreft.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele med et glass vann eller annen væske.

**Pakninger og priser:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 465,20 (trinnpris: kr 374,00). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1466,10 (trinnpris: kr 1099,50).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se L02B G04\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Femar «Novartis»

## Levetiracetam Accord «Accord»

C *Antiepileptikum.* ATC-nr.: N03A X14

T **TABLETTER, filmdrasjerte 250 mg, 500 mg og 1000 mg:** *Hver tablett innh.:* Levetiracetam 250 mg, resp. 500 mg og 1000 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 250 mg og 1000 mg: Titandioksid (E 171). 500 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Indisert som monoterapi ved behandling av pasienter >16 år med nylig diagnostisert partiell epilepsi med eller uten sekundær generalisering. Indisert som tilleggsbehandling ved behandling av partiell epilepsi med eller uten sekundær generalisering hos voksne, barn og spedbarn fra 1 måned, ved behandling av myoklone anfall hos voksne og ungdom fra 12 år med juvenil myoklon epilepsi, ved behandling av primære generaliserte tonisk-kloniske anfall hos voksne og ungdom fra 12 år med idiopatisk generalisert epilepsi.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Svelges med tilstrekkelig mengde væske (f.eks. et glass vann). Kan tas med eller uten mat. Kan deles (delestrek).

**Pakninger og priser:** **250 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 325,40. **500 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 555,50. **1000 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1054,10. 200 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 2071,90.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N03A X14\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Keppra «UCB»

## Levomepromazine Orion «Orion»

C *Antipsykotikum.* ATC-nr.: N05A A02

- T TABLETTER 25 mg og 100 mg:** Hver tablett inneholdt.: Levomepromazinmaleat tilsv. levomepromazin 25 mg, resp. 100 mg, lakosemonohydrat 43 mg, resp. 171 mg, hjelpestoffer.  
**Indikasjoner:** Schizofreni og andre psykoser. Alvorlig smerte, enten alene eller i kombinasjon med egnede analgetika.  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas med et fullt glass vann. Kan tas med eller uten mat. Kan deles.  
**Pakninger og priser:** 25 mg: 100 stk.<sup>1</sup> (plastboks) kr 115,90. 100 mg: 100 stk.<sup>2</sup> (plastboks) kr 288,80.  
**Refusjon:**  
<sup>1</sup>Se N05A A02\_1 i Refusjonslisten.  
<sup>2</sup>Se N05A A02\_2 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Nozinan «Mylan Healthcare Norge AS»

## Levonorgestrel Norfri «Evolan Pharma»

- CF Postkoital antikonsepsjon.** ATC-nr.: G03A D01

**TABLETTER 1,5 mg:** Hver tablett inneholdt.: Levonorgestrel 1,5 mg, laktose, hjelpestoffer.  
**Indikasjoner:** Som postkoital antikonsepsjon innen 72 timer etter et ubeskyttet samleie eller når bruk av annen prevensjon har mislykkes.  
**Pakninger uten resept:** 1 tablett er unntatt fra reseptplikt.  
**Pakninger og priser:** 1 stk. (blister) kr \*.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Norlevo «HRA Pharma»

## Lidocaine Accord «Accord»

- C Lokalanestetikum.** ATC-nr.: N01B B02

**INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml: 1 ml inneholdt.:** Lidokainhydroklorid 10 mg, resp. 20 mg, natriumklorid, natriumhydroksid og saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.  
**Indikasjoner:** Bruk i infiltrasjonsanestesi, intravenøs regionalanestesi, nerveblokkader og epiduralanestesi. Injeksjonsvæske 10 mg/ml er beregnet på voksne og barn >1 år. Injeksjonsvæske 20 mg/ml er beregnet på voksne.  
**Pakninger og priser:** 10 mg/ml: 20 ml (hettegl.) kr 57,10. 20 mg/ml: 20 ml (hettegl.) kr 57,10.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Xylocain inj. «Aspen»

## Lidokain Mylan «Mylan Ireland Ltd.»

- C Lokalanestetikum.** ATC-nr.: N01B B02

**INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml: 1 ml inneholdt.:** Lidokainhydroklorid (som monohydrat) 10 mg, resp. 20 mg, natriumklorid, natriumhydroksid/saltsyre, natriummetylparahydroksybenzoat (E 219) 1 mg, vann til injeksjonsvæsker.  
**Indikasjoner:** Nerveblokkade på fingre, tær, øre, nese og penis. Infiltrasjonsanestesi og perifer nerveblokkade når adrenalin er kontraindisert.  
**Oppbevaring og holdbarhet:** Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser kreves. Fra et mikrobiologisk synspunkt kan preparatet etter åpning oppbevares i høyst 7 dager ved 25°C. Andre oppbevaringstider og -betingelser etter åpning er brukerens ansvar.  
**Pakninger og priser:** 10 mg/ml: 5 × 20 ml (hettegl.) kr 140,70. 20 mg/ml: 5 × 20 ml (hettegl.) kr 140,70.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Xylocain «Aspen»

## Linezolid «Sandoz»

- C Antibakterielt middel.** ATC-nr.: J01X X08

**T** **TABLETTER, filmdrasjerte 600 mg:** Hver tablett inneh.: Linezolid 600 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Behandling av pneumoni ervervet utenfor sykehus og nosokomial pneumoni når en vet eller mistenker at de er forårsaket av grampositive bakterier følsomme for linezolid. Hvorvidt preparatet er egnet behandling, bør bedømmes ut fra mikrobiologiske prøver eller informasjon om prevalens av resistens blant grampositive bakterier. Linezolid er ikke aktivt mot infeksjoner forårsaket av gramnegative patogener. Spesifikk behandling mot gramnegative organismer må initieres samtidig hvis gramnegative patogener påvises eller mistenkes. Indisert for behandling av kompliserte hud- og bløtdelsinfeksjoner, bare når det er påvist ved mikrobiologiske tester at infeksjonen er forårsaket av følsomme grampositive bakterier. Linezolid er ikke aktivt mot infeksjoner forårsaket av gramnegative patogener. Ved kompliserte hud- og bløtdelsinfeksjoner som en vet eller mistenker kan være forårsaket av kombinert infeksjon med grampositive og gramnegative patogener, skal linezolid kun brukes dersom det ikke finnes andre behandlingsalternativer tilgjengelig. Under slike omstendigheter må behandling mot gramnegative organismer initieres samtidig. Linezolidbehandling bør kun initieres i sykehus og etter konsultasjon med relevante spesialister, som mikrobiolog eller spesialist i infeksjonssykdommer. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for korrekt bruk av antibakterielle midler.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør tas 2 ganger daglig (hver 12. time). Kan tas med eller uten mat. Pasienten bør rådes til å unngå store mengder/overdrevet inntak av mat og drikke med høyt tyramininnhold (f.eks. modne oster, gjærekstrakter, udestillert alkoholholdig drikke (f.eks. fatøl og vin) og fermenterte soyabønneprodukter, f.eks. soyasaus). Bør svelges hele med vann.

**Utleveringsbestemmelser:** Skal kun utleveres til bruk på menneske.

**Pakninger og priser:** 10 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 5596,00 (trinnpris: kr 2315,70). 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 16715,40 (trinnpris: kr 6874,70).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se J01X X08\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Zyvoxid «Pfizer»

## Linezolid Accord «Accord»

**C** **Antibakterielt middel.**

ATC-nr.: J01X X08

**T** **TABLETTER, filmdrasjerte 600 mg:** Hver tablett inneh.: Linezolid 600 mg, soyalecitin, xantangummi, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Til voksne for behandling av nosokomial pneumoni og pneumoni oppstått utenfor sykehus, når en vet eller mistenker at de er forårsaket av grampositive bakterier følsomme for linezolid. Hvorvidt preparatet er egnet behandling, bør bedømmes ut fra mikrobiologiske prøver eller informasjon om prevalens av resistens blant grampositive bakterier. Linezolid er ikke aktivt mot infeksjoner forårsaket av gramnegative patogener. Spesifikk behandling mot gramnegative organismer må initieres hvis gramnegative patogener påvises eller mistenkes. Indisert til voksne for kompliserte hud- og bløtdelsinfeksjoner bare når det er påvist ved mikrobiologiske tester at infeksjonen er forårsaket av følsomme grampositive bakterier. Linezolid er ikke aktivt mot infeksjoner forårsaket av gramnegative patogener. Ved hud- og bløtdelsinfeksjoner en vet eller mistenker kan være forårsaket av kombinert infeksjon med gramnegative og grampositive patogener skal linezolid kun brukes dersom det ikke finnes andre behandlingsalternativ tilgjengelig. Behandling mot gramnegative organismer må da initieres samtidig. Linezolidbehandling bør kun initieres i sykehus under veiledning av relevante spesialister, som spesialist i infeksjonssykdommer eller mikrobiolog.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas med eller uten mat. Svelges hele med vann.

**Utleveringsbestemmelser:** Skal kun utleveres til bruk på menneske.

**Pakninger og priser:** 10 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 5596,00 (trinnpris: kr 2315,70). 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 16715,40 (trinnpris: kr 6874,70).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se J01X X08\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Zyvoxid «Pfizer»

## Linezolid Krka «KRKA»

**C** **Antibakterielt middel.**

ATC-nr.: J01X X08

**T** **TABLETTER, filmdrasjerte 600 mg:** Hver tablett inneh.: Linezolid 600 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Til voksne for behandling av pneumoni ervervet utenfor sykehus og nosokomial pneumoni når man vet eller mistenker at dette er forårsaket av grampositive bakterier, følsomme for

linezolid. Hvorvidt preparatet er egnet behandling, bør bedømmes ut fra mikrobiologiske prøver eller informasjon om prevalens av resistens overfor antibakterielle midler blant grampositive bakterier. Linezolid er ikke aktivt mot infeksjoner forårsaket av gramnegative patogener. Spesifikk behandling mot gramnegative organismer må startes opp samtidig, hvis gramnegative patogener påvises eller mistenkes. Indisert til voksne for behandling av kompliserte hud- og bløtdelsinfeksjoner bare når det er påvist ved mikrobiologiske tester at infeksjonen er forårsaket av følsomme grampositive bakterier. Linezolid er ikke aktivt mot infeksjoner forårsaket av gramnegative patogener. Ved kompliserte hud- og bløtdelsinfeksjoner og samtidig kjent eller mistenkt infeksjon med gramnegative patogener, skal linezolid kun brukes dersom det ikke finnes andre behandlingsalternativ tilgjengelig. Under slike omstendigheter må behandling mot gramnegative organismer startes opp samtidig. Linezolidbehandling bør kun innledes ved sykehus og etter konsultasjon med relevante spesialister, som mikrobiolog eller spesialist i infeksjonssykdommer.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør administreres 2 ganger daglig. Kan tas med eller uten mat.

**Utleveringsbestemmelser:** Skal kun utleveres til bruk på menneske.

**Pakninger og priser:** 10 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 5596,00 (trinnpris: kr 2315,70). 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 16715,40 (trinnpris: kr 6874,70).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se J01X X08\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Zyvoxid «Pfizer»

## Linezolid Orion «Orion»

C **Antibakterielt middel.**

ATC-nr.: J01X X08

T **TABLETTER, filmdrasjerte 600 mg:** Hver tablett inneh.: Linezolid 600 mg, laktosemonohydrat 25,2 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Brilliantblått FCF (E 133), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** *Voksne:* Behandling av pneumoni ervervet utenfor sykehus og nosokomial pneumoni når den er påvist eller mistenkt å være forårsaket av følsomme grampositive bakterier. Hvorvidt legemidlet er egnet behandling bør bestemmes ut fra resultatet av mikrobiologiske prøver eller informasjon om prevalens av antibiotikaresistens blant grampositive bakterier. Linezolid er ikke aktivt mot infeksjoner forårsaket av gramnegative patogener. Spesifikk behandling mot gramnegative organismer må startes opp samtidig hvis gramnegative patogener påvises eller mistenkes. Indisert for behandling av kompliserte hud- og bløtvevsinfeksjoner kun når det er påvist ved mikrobiologiske tester at infeksjonen er forårsaket av følsomme grampositive bakterier. Linezolid er ikke aktivt mot infeksjoner forårsaket av gramnegative patogener. Skal kun brukes hos pasienter med kompliserte hud- og bløtvevsinfeksjoner og samtidig påvist eller mistenkt infeksjon med gramnegative patogener dersom det ikke finnes andre behandlingsalternativ tilgjengelig. Under slike omstendigheter må behandling mot gramnegative organismer startes opp samtidig. *Generelt:* Behandling bør kun innledes ved sykehus og etter konsultasjon med relevante spesialister, som mikrobiolog eller spesialist i infeksjonssykdommer. Det bør tas hensyn til nasjonale retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør tas 2 ganger daglig (hver 12. time). Kan tas med eller uten mat. Pasienten bør rådes til å unngå store mengder mat og drikke med høyt innhold av tyramin (f.eks. modne oster, gjærekstrakter, udestillert alkoholholdig drikke (f.eks. fatøl og vin) og fermenterte soyabønneprodukter, f.eks. soyasaus). Skal svelges hele med vann.

**Utleveringsbestemmelser:** Skal kun utleveres til bruk på menneske.

**Pakninger og priser:** 10 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 5596,00 (trinnpris: kr 2315,70). 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 16715,40 (trinnpris: kr 6874,70).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se J01X X08\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Zyvoxid «Pfizer»

## Lisinopril «ratiopharm»

C **ACE-hemmer.**

ATC-nr.: C09A A03

T **TABLETTER, udrasjerte 2,5 mg, 5 mg, 10 mg og 20 mg:** Hver tablett inneh.: Lisinopriildihydrat tilsv. lisinopril 2,5 mg, resp. 5 mg, 10 mg og 20 mg. Fargestoff: 10 mg: Jernoksid (E 172). 20 mg: Jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** *Hypertensjon:* Behandling av hypertensjon. *Hjertesvikt:* Behandling av symptomatisk hjertesvikt. *Akutt hjerteinfarkt:* Korttidsbehandling (6 uker) av hemodynamisk stabile pasienter innen 24 timer etter et akutt hjerteinfarkt. *Nyrekomplikasjoner ved diabetes mellitus:* Behandling av nyresykdom hos hypertensive pasienter med type 2-diabetes og begynnende nefropati.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Svelges med et glass vann, 1 gang daglig. Bør tas omtrent til samme tid hver dag. Kan tas med eller uten mat. Kan knuses. **Tabletter 5 mg:** Kan deles (delestrek). **Tabletter 10 mg:** Kan deles (delestrek). **Tabletter 20 mg:** Kan deles (delestrek).

**Pakninger og priser:** **2,5 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 81,00 (trinnspris: kr 81,00). **5 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 60,30 (trinnspris: kr 60,30). 100 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 116,50 (trinnspris: kr 115,50). **10 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 116,50 (trinnspris: kr 116,50). **20 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 196,80 (trinnspris: kr 196,80).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C09A A03\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Zestril «AstraZeneca»

## Lisinopril/Hydroklortiazid «Actavis»

C ACE-hemmer og diuretikum.

ATC-nr.: C09B A03

T **TABLETTER 10 mg/12,5 mg og 20 mg/12,5 mg:** Hver tablett inneholder: Lisinoprildihydrat 10,9 mg, resp. 21,8 mg tilsv. lisinopril 10 mg, resp. 20 mg, hydroklortiazid 12,5 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: 10 mg/12,5 mg: Jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** Behandling av essensiell hypertensjon. Brukes hos pasienter som ikke oppnår tilfredsstillende blodtrykkskontroll med lisinopril alene (eller hydroklortiazid alene).

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør tas til samme tid hver dag. Kan tas med eller uten mat. **Tabletter 20 mg/12,5 mg:** Kan deles (delestrek).

**Pakninger og priser:** **10 mg/12,5 mg:** 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 210,00 (trinnspris: kr 172,50). **20 mg/12,5 mg:** 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 248,50 (trinnspris: kr 201,00).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C09B A03\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Zestoretic, Zestoretic mite «AstraZeneca»

## Loperamid «Mylan»

CF Antidiarroikum.

ATC-nr.: A07D A03

T **KAPSLER 2 mg:** Hver kapsel inneholder: Loperamidhydroklorid 2 mg, laktose 100 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Erytrosin (E 127), indigotin (E 132), jernoksid (E 172), kinolingult (E 104), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Symptomatisk behandling av akutte og kroniske diarétilstander av forskjellig etiologi. Hurtig tarmpassasje etter tarm- eller ventrikkelreseksjon. **Reseptfri bruk:** Korttidsbehandling av akutt diaré hos voksne og barn >12 år.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør svelges hele med væske.

**Pakninger uten resept:** 16 kapsler er unntatt fra reseptplikt.

**Pakninger og priser:** 16 stk. (blister) kr \*. 40 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 63,20. 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 103,60. 250 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 204,70.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se A07D A03\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Imodium «McNeil»

## Loratadin HEXAL «HEXAL»

CF Antihistamin.

ATC-nr.: R06A X13

T **TABLETTER 10 mg:** Hver tablett inneholder: Loratadin 10 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** Symptomatisk behandling av allergisk rhinitt og kronisk idiopatisk urticaria.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas med eller uten mat. Kan deles (delestrek).

**Pakninger og priser:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 110,40 (trinnspris: kr 67,60). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 283,50 (trinnspris: kr 138,50).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se R06A X13\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Clarityn «Bayer AB»

## Loratadin Orifarm «Orifarm Generics»

CF *Antihistamin.* ATC-nr.: R06A X13

T **TABLETTER 10 mg:** Hver tablett inneh.: Loratadin 10 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer.  
**Indikasjoner:** Symptomatisk behandling av allergisk rhinitt og kronisk idiopatisk urticaria.  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Kan deles (delestrek).  
**Pakninger og priser:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 110,40 (trinnspris: kr 67,60). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 283,50 (trinnspris: kr 138,50).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se R06A X13\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Clarityn «Bayer AB»

## Losartan Krka «KRKA»

C *Angiotensin II-reseptorantagonist.* ATC-nr.: C09C A01

T **TABLETTER, filmdrasjerte 12,5 mg, 50 mg og 100 mg:** Hver tablett inneh.: Losartankalium 12,5 mg, resp. 50 mg og 100 mg, tilsv. losartan 11,4 mg, resp. 45,8 mg og 91,5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoffer: 12,5 mg: Kinolingult (E 104), titandioksid (E 171). 50 mg og 100 mg: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Behandling av essensiell hypertensjon hos voksne og hos barn og ungdom 6-18 år. Behandling av nyresykdom hos voksne med hypertensjon og diabetes mellitus type 2 med proteiniuri  $\geq 0,5$  g/dag, som del av en antihypertensiv behandling. Behandling av kronisk hjertesvikt hos voksne når behandling med ACE-hemmere ikke anses hensiktsmessig pga. uforlikelighet, særlig hoste, eller kontraindikasjon. Pasienter med hjertesvikt som er stabilisert på en ACE-hemmer, bør ikke bytte til losartan. Pasientene bør ha venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon  $\leq 40\%$  og bør være klinisk stabile og behandles under etablert behandlingsregime for kronisk hjertesvikt. Reduksjon i risiko for slag hos voksne hypertensive pasienter med venstre ventrikkelhypertrofi dokumentert ved EKG.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør tas til samme tid hver dag. Kan tas med eller uten mat. Bør svelges hele med et glass vann. *Tabletter 50 mg:* Har delestrek, men skal ikke deles.

**Pakninger og priser:** **12,5 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 88,30 (trinnspris: kr 58,70). 98 stk. (blister) kr 218,30. **50 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 92,80 (trinnspris: kr 71,90). 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 234,20 (trinnspris: kr 114,20). **100 mg:** 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 432,10 (trinnspris: kr 147,80).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C09C A01\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Cozaar «MSD»

## Losartan/Hydrochlorothiazide Krka «KRKA»

C *Angiotensin II-antagonist og diuretikum.* ATC-nr.: C09D A01

T **TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg/12,5 mg, 100 mg/12,5 mg og 100 mg/25 mg:** Hver tablett inneh.: Losartankalium 50 mg, resp. 100 mg og 100 mg, hydroklortiazid 12,5 mg, resp. 12,5 mg og 25 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: 50 mg/12,5 mg og 100 mg/25 mg: Kinolingult (E 104), titandioksid (E 171). 100 mg/12,5 mg: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Behandling av essensiell hypertensjon hos pasienter der blodtrykket ikke er tilstrekkelig kontrollert ved bruk av losartan eller hydroklortiazid alene.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Skal svelges med et glass vann. Tas med eller uten mat.

**Pakninger og priser:** **50 mg/12,5 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 95,60 (trinnspris: kr 72,30). 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 244,00 (trinnspris: kr 114,90). **100 mg/12,5 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 114,50 (trinnspris: kr 72,30). 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 310,30 (trinnspris: kr 128,20). **100 mg/25 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 114,50 (trinnspris: kr 70,10). 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 310,30 (trinnspris: kr 147,80).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C09D A01\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Cozaar Comp, Cozaar Comp Forte «MSD»

## Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz «Sandoz»

*Angiotensin II-reseptorantagonist og diuretikum.*

ATC-nr.: C09D A01

**TABLETTER, filmdrasjerte 100 mg/12,5 mg:** Hver tablett inneholder Losartankalium 100 mg, hydroklortiazid 12,5 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Behandling av essensiell hypertensjon hos pasienter der blodtrykket ikke er tilstrekkelig kontrollert ved bruk av losartan eller hydroklortiazid alene.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas med et glass vann, med eller uten mat.

**Pakninger og priser:** 28 stk. (blister) kr \*. 100 stk. (blister) kr \*.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Cozaar Comp «MSD»

## Malfin «Teva»

**A** *Analgetikum ved sterke smerter.*

ATC-nr.: N02A A01

**T** **DEPOTTABLETTER 10 mg, 30 mg, 60 mg og 100 mg:** Hver depottablett inneholder Morfinsulfat tilsv. morfin 7,5 mg, resp. 22,5 mg, 45 mg og 75 mg, hjelpestoffer. 10 mg, 30 mg og 60 mg inneholder laktose. Fargestoff: 10 mg: Brunt og gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 30 mg: Indigotin (E 132), nykockin (E 124), titandioksid (E 171). 60 mg: Nykockin (E 124), paraoransje (E 110), titandioksid (E 171). 100 mg: Sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Δ** **Indikasjoner:** Behandling av sterke smerter, spesielt kreftsmarter og postoperativ smerte.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Depottablettene skal svelges hele med vann. Skal ikke tygges eller løses opp. Skal ikke deles eller knuses.

**Pakninger og priser:** **10 mg:** 25 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 108,00 (trinnpris: kr 78,00). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 157,90 (trinnpris: kr 124,70). **30 mg:** 25 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 169,90 (trinnpris: kr 99,50). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 353,80 (trinnpris: kr 215,70). **60 mg:** 25 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 264,60 (trinnpris: kr 133,40). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 647,50 (trinnpris: kr 345,40). **100 mg:** 25 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 365,70 (trinnpris: kr 180,80). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 821,60 (trinnpris: kr 532,30).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N02A A01\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Dolcontin «Pfizer»

## Mecastrin «Orifarm Generics»

**C** *Sedativum. Hypnotikum.*

ATC-nr.: N05C H01

**DEPOTTABLETTER 2 mg:** Hver depottablett inneholder Melatonin 2 mg, laktose, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** Som monoterapi til kortvarig behandling av primær insomni karakterisert ved dårlig søvnkvalitet hos pasienter  $\geq 55$  år.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas 1-2 timer før leggetid og etter mat. Skal svelges hele. Skal ikke knuses eller tygges.

**Pakninger og priser:** 30 stk. (blister) kr 243,30.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Circadin «Neurim»

## Memantin Accord «Accord»

**C** *Middel mot demens.*

ATC-nr.: N06D X01

**T** **TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 20 mg:** Hver tablett inneholder Memantinhydroklorid 10 mg resp. 20 mg tilsv. memantin 8,31 mg resp. 16,62 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: 10 mg: Titandioksid (E 171). 20 mg: Titandioksid (E 171), gult og rødt jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** Behandling av pasienter med moderat til alvorlig grad av Alzheimers sykdom.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør administreres 1 gang daglig, til samme tid hver dag. Kan tas med eller uten mat. Kan deles i like doser (delestrek).

**Pakninger og priser:** **10 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 277,60 (trinnpris: kr 197,40). 56 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 451,70. 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 763,40 (trinnpris: kr 552,10). **20 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 410,70 (trinnpris: kr 345,20). 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1346,80 (trinnpris: kr 1068,60).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N06D X01\_2 i Refusjonslisten.



**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Ebixa «Lundbeck»

## Meropenem SUN «SUN Pharma»

**C Antibiotikum.** ATC-nr.: J01D H02

**T PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 500 mg og 1 g:** Hvert hetteglass inneh.: Meropenetrihydrat tilsv. vannfritt meropenem 500 mg, resp. 1 g, natriumkarbonat (vannfritt).

**Indikasjoner:** Behandling av følgende infeksjoner hos voksne og barn >3 måneder: Alvorlig pneumoni, inkl. sykehus- og ventilatorassosiert pneumoni. Bronkopulmonale infeksjoner ved cystisk fibrose. Kompliserte urinveisinfeksjoner. Kompliserte intraabdominale infeksjoner. Intra- og postpartum-infeksjoner. Kompliserte infeksjoner i hud og bløtvev. Akutt bakteriell meningitt. Behandling av pasienter med bakteriemi som oppstår i sammenheng med, eller er mistenkt å ha en sammenheng med noen av infeksjonene listet opp ovenfor. Behandling av pasienter med febril nøyotropeni som mistenkes å ha opphav i en bakteriell infeksjon. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer vedrørende riktig bruk av antibakterielle midler.

**Oppbevaring og holdbarhet:** Oppbevares ved høyst 25°C. Etter rekonstituering: Rekonstituert oppløsning skal ikke fryses. Rekonstituert oppløsning til i.v. injeksjon/infusjon skal brukes umiddelbart. Tid fra start av rekonstituering til avsluttet injeksjon/infusjon skal være ≤1 time.

**Utleveringsbestemmelser:** Skal kun utleveres til bruk på menneske.

**Pakninger og priser: 500 mg:** 10 stk.<sup>1</sup> (hettegl.) kr 1037,10. **1 g:** 10 stk.<sup>1</sup> (hettegl.) kr 1885,00.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se J01D H02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Meropenem Fresenius Kabi «Fresenius Kabi»

## Metadon Pharmadone «Unimedic»

**A Substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet.** ATC-nr.: N07B C02

**MIKSTUR, oppløsning 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 35 mg, 40 mg, 45 mg, 50 mg, 55 mg, 60 mg, 70 mg, 80 mg, 90 mg, 100 mg, 110 mg, 120 mg, 130 mg, 140 mg og 150 mg:** 50 ml inneh.: Metadonhydroklorid 10 mg, resp. 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 35 mg, 40 mg, 45 mg, 50 mg, 55 mg, 60 mg, 70 mg, 80 mg, 90 mg, 100 mg, 110 mg, 120 mg, 130 mg, 140 mg og 150 mg, glukose, sukrose, metylparahydroksybenzoat (E 218), hjelpestoffer. Bringeber smak.

**△ Indikasjoner:** Substitusjonsbehandling ved opiatavhengighet. Metadonbehandlingen er en del av et omfattende behandlingsprogram som består av medisinsk, sosial og psykologisk behandling. All behandling med metadon er basert på gjeldende retningslinjer fra nasjonal myndighet.

**Pakninger og priser: 10 mg:** 50 ml (plastflaske) kr 110,70. **15 mg:** 50 ml (plastflaske) kr 110,70. **20 mg:** 50 ml (plastflaske) kr 110,70. **25 mg:** 50 ml (plastflaske) kr 110,70. **30 mg:** 50 ml (plastflaske) kr 110,70. **35 mg:** 50 ml (plastflaske) kr 110,70. **40 mg:** 50 ml (plastflaske) kr 110,70. **45 mg:** 50 ml (plastflaske) kr 110,70. **50 mg:** 50 ml (plastflaske) kr 110,70. **55 mg:** 50 ml (plastflaske) kr 110,70. **60 mg:** 50 ml (plastflaske) kr 113,80. **70 mg:** 7 × 50 ml (plastflaske) kr 436,60. **70 mg:** 50 ml (plastflaske) kr 116,50. **70 mg:** 7 × 50 ml (plastflaske) kr 455,70. **80 mg:** 50 ml (plastflaske) kr 116,50. **80 mg:** 7 × 50 ml (plastflaske) kr 455,70. **90 mg:** 50 ml (plastflaske) kr 116,50. **90 mg:** 7 × 50 ml (plastflaske) kr 455,70. **100 mg:** 50 ml (plastflaske) kr 116,50. **100 mg:** 7 × 50 ml (plastflaske) kr 455,70. **110 mg:** 50 ml (plastflaske) kr 120,70. **110 mg:** 7 × 50 ml (plastflaske) kr 485,10. **120 mg:** 50 ml (plastflaske) kr 120,70. **120 mg:** 7 × 50 ml (plastflaske) kr 485,10. **130 mg:** 50 ml (plastflaske) kr 132,40. **140 mg:** 50 ml (plastflaske) kr 132,40. **150 mg:** 50 ml (plastflaske) kr 132,40.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Metadon «Nordic Drugs»

## Metformin Orifarm «Orifarm Generics»

**C Antidiabetikum.** ATC-nr.: A10B A02

**T TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg, 850 mg og 1000 mg:** Hver tablett inneh.: Metforminhydroklorid 500 mg, resp. 850 mg og 1000 mg, tilsv. metformin 390 mg, resp. 663 mg og 780 mg, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** Behandling av type 2-diabetes mellitus, særlig hos overvektige pasienter når kostholdsregulering og mosjon ikke gir tilstrekkelig glykemisk kontroll. Kan brukes som monoterapi, eller kombineres med andre orale antidiabetika eller insulin hos voksne. Kan brukes som monote-

rapi eller kombineres med insulin hos barn fra 10 år og ungdom. Reduksjon i diabeteskomplikasjoner er påvist hos overvektige voksne type 2 diabetespasienter som ble behandlet med metforminhydroklorid som førstevalgsbehandling etter at diett viste seg å være utilstrekkelig.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Svelges med et glass vann. Tas samtidig med eller etter mat (reduserer gastrointestinale bivirkninger). Skal ikke tygges. Skal ikke knuses. **Tabletter 1000 mg:** Kan deles i to like deler.

**Pakninger og priser: 500 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 73,00. 400 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 183,10. **850 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 82,90. **1000 mg:** 60 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 80,70. 180 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 169,60.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se A10B A02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Glucophage «Merck»

## Metformin Sandoz «Sandoz»

C **Antidiabetikum.** ATC-nr.: A10B A02

T **TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg og 1000 mg:** Hver tablett inneh.: Metforminhydroklorid 500 mg, resp. 1000 mg, tilsv. metformin 390 mg, resp. 780 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Behandling av type 2 diabetes mellitus, spesielt hos overvektige pasienter, når kostholdsprogram og trening alene ikke gir tilstrekkelig glykemisk kontroll. Hos voksne kan preparatet brukes som monoterapi eller i kombinasjon med andre perorale diabetespreparater eller i kombinasjon med insulin. Hos barn  $\geq 10$  år og ungdom kan preparatet brukes som monoterapi eller i kombinasjon med insulin. En reduksjon av diabetiske komplikasjoner er vist hos voksne overvektige pasienter med type 2 diabetes behandlet med metformin som førstelinjebehandling etter at kostholdsprogram ikke har fungert.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas samtidig med eller etter mat (reduserer risiko for gastrointestinale bivirkninger). **Tabletter 500 mg:** Skal svelges hele med et glass vann. **Tabletter 1000 mg:** Svelges med et glass vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses. Kan deles (delestrek) for å lette svelging, ikke for å dele i like doser.

**Pakninger og priser: 500 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 73,00. **1000 mg:** 180 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 169,60.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se A10B A02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Glucophage «Merck»

## Methotrexate «Teva»

C **Immunsuppressivt middel, folsyreanalog.** ATC-nr.: L04A X03

T **TABLETTER 2,5 mg:** Hver tablett inneh.: Metotreksat 2,5 mg, laktose 78 mg, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** Utbredt kronisk psoriasis, særlig hos eldre og invalidiserte når annen terapi svikter. Aktiv revmatoid artritt hos voksne, som ikke kan kontrolleres med antiinflammatoriske midler (NSAID), antimalariamidler, sulfasalazin, penicillamin eller gullpreparat, eller når det foreligger kontraindikasjoner for bruk av disse midler.

**Dosering:** Dosen skal tas 1 gang i uken, og på samme ukedag hver uke, se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Skal svelges med rikelig væske/vann. Bør fortrinnsvis svelges hele. Skal ikke knuses. Bør ikke deles (har delestrek, men er ikke beregnet for deling), se pakningsvedlegget.

**Pakninger og priser:** 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 181,90.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se L04A X03\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Methotrexate «Pfizer» tabl.

## Methotrexate Cipla «Cipla»

C **Immunsuppressivt middel, folsyreanalog.** ATC-nr.: L04A X03

T **TABLETTER 2,5 mg:** Hver tablett inneh.: Metotreksat 2,5 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** Aktiv revmatoid artritt hos voksne. Alvorlig, behandlingsresistent og invalidiserende psoriasis, som ikke responderer tilstrekkelig på andre former for behandling, som f.eks. fototerapi, PUVA og retinoider, samt alvorlig psoriasisartritt hos voksne.

**Dosering:** Dosen skal bare tas 1 gang i uken, og på samme ukedag hver uke. Feil dosering av metotreksat kan føre til alvorlige bivirkninger, inkl. dødelige utfall, se SPC. **Administrering:** Svelges med et glass vann mens pasienten sitter eller står. Unngå alkohol sammen med metotreksat.

**Pakninger og priser:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 181,90.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se L04A X03\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Methotrexate «Pfizer» tabl.

## Methylphenidate Sandoz «Sandoz»

A **Sentralstimulerende middel.** ATC-nr.: N06B A04

T **DEPOTTABLETTER 18 mg, 27 mg, 36 mg og 54 mg:** Hver depottablett inneholder: Metylphenidathydroklorid 18 mg, resp. 27 mg, 36 mg og 54 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Rødt jernoksid (E 172). 18 mg og 54 mg: Gult jernoksid (E 172). 27 mg: Sort jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** Indisert som del av et omfattende behandlingsprogram hos barn  $\geq 6$  år med ADHD (attention deficit/hyperactivity disorder) når det er vist at hjelpetiltak alene ikke er tilstrekkelig. Behandlingen skal gjøres under tilsyn av spesialist innen atferdsforstyrrelser hos barn. Diagnosen skal stilles iht. DSM-IV-kriteriene eller retningslinjene i ICD-10, og bør være basert på fullstendig sykdomshistorie og evaluering av pasienten. Diagnosen kan ikke stilles bare på grunnlag av ett eller flere symptomer. Den spesifikke etiologien til dette syndromet er ukjent, og det finnes ingen enkeltstående diagnostiseringstest. For å kunne stille en adekvat diagnose, må det brukes medisinske og spesialiserte psykologiske, pedagogiske og sosiale ressurser. Et omfattende behandlingsprogram omfatter vanligvis psykologiske, opplærings- og sosiale tiltak, i tillegg til farmakoterapi. Målet er å stabilisere barn med et atferdssyndrom som kjennetegnes ved symptomer som kan omfatte en kronisk sykdomshistorie med konsentrasjonssvikt, distraherbarhet, følelsesmessig ustabilitet, impulsivitet, moderat til alvorlig hyperaktivitet, mindre nevrologiske tegn og EEG-avvik. Evne til læring kan være svekket, men ikke nødvendigvis. Behandling med metylphenidat er ikke indisert hos alle barn med ADHD, og en avgjørelse om bruk må være basert på en svært grundig vurdering av symptomenes alvorlighetsgrad og kronisitet i forhold til barnets alder. Riktig tilrettelegging av opplæring er avgjørende, og psykososial intervensjon er vanligvis nødvendig. Der hjelpetiltak alene ikke er tilstrekkelig bør avgjørelsen om å forskrive et stimulerende middel baseres på en streng vurdering av alvorlighetsgraden av barnets symptomer. Metylphenidat bør alltid brukes iht. godkjent indikasjon og iht. forskrivnings/diagnostiske retningslinjer.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas 1 gang daglig om morgenen. Tas med eller uten mat. Skal svelges hele. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses eller deles.

**Utleveringsbestemmelser:** Se Helsedirektoratets beslutning om rett til rekvirering av sentralstimulerende legemidler, gjeldende fra 2. januar 2014.

**Pakninger og priser:** **18 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (flaske) kr 327,00 (trinnpris: kr 327,00). **27 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (flaske) kr 379,60 (trinnpris: kr 374,60). **36 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (flaske) kr 423,90 (trinnpris: kr 423,90). **54 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (flaske) kr 596,90 (trinnpris: kr 587,40).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N06B A04\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Concerta «Janssen»

## Methylphenidate Teva «Teva»

A **Sentralstimulerende middel.** ATC-nr.: N06B A04

T **KAPSLER MED MODIFISERT FRISETTING, harde 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg og 60 mg:** Hver kapsel inneholder: Metylphenidathydroklorid 10 mg, resp. 20 mg, 30 mg, 40 mg og 60 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Titandioksid (E 171), svart jernoksid (E 172). 10 mg, 30 mg, 40 mg og 60 mg: Gult jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** Behandling av «Attention deficit hyperactivity disorder» (ADHD) hos barn  $\geq 6$  år og voksne som del av et omfattende behandlingsprogram når det er vist at hjelpetiltak alene ikke er tilstrekkelig. Behandlingen skal startes og skje under veiledning av spesialist innen ADHD, f.eks. en spesialutdannet barnelege, en barne- og ungdomspsykiater eller en psykiater.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele med vann. Skal ikke knuses, tygges eller deles. Ved svelgeproblemer kan kapslene åpnes forsiktig og granulatet drysses over en liten mengde myk mat (f.eks. eplemos) som ikke er varm. Blandingen av legemid-

del og mat skal inntas umiddelbart og i sin helhet og skal ikke lagres til senere bruk. Granulatet som er drysset over mat skal ikke tygges eller knuses.

**Pakninger og priser:** **10 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 220,10. **20 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 317,30. **30 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 404,40. **40 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 568,60. **60 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 748,70.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N06B A04\_6 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Ritalin «Novartis»

## Methylprednisolone Orion «Orion»

C **Kortikosteroid.** ATC-nr.: H02A B04

T **TABLETTER 4 mg og 16 mg:** Hver tablett inneholder: Metylprednisolon 4 mg, resp. 16 mg, laktosemonohydrat 70 mg, resp. 131 mg, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** For tilstander som krever systemisk glukokortikoidbehandling, spesielt autoimmune sykdommer: Inflammatoriske og systemiske revmatiske sykdommer (f.eks. revmatoid artritt, juvenil kronisk artritt, Bekhterevs sykdom), kollagene sykdommer (f.eks. systemisk lupus erythematosus, systemisk dermatomyositt), allergiske tilstander (f.eks. overfølsomhet overfor legemidler, serumsykdom, allergisk kontaktdermatitt, anafylaktisk sjokk, astma), lungesykdom (f.eks. pulmonal sarkoidose), reduksjon av trykk i hjernen (f.eks. hjerneødem assosiert med svulster), avstøtningsreaksjon etter transplantasjon, enkelte hudsykdommer (f.eks. pemfigus vulgaris), hematologiske sykdommer (f.eks. idiopatisk trombocytopenisk purpura, autoimmun hemolytisk anemi), neoplastiske sykdommer (f.eks. leukemi, malignt lymfom), leversykdommer (f.eks. autoimmun hepatitt), nevrologiske sykdommer (f.eks. multipel sklerose, myasthenia gravis), øyesykdommer (f.eks. uveitt, optikusnevritt), nyresykdommer (f.eks. glomerulonefritt), samt gastrointestinale sykdommer (f.eks. ulcerøs kolitt, Crohns sykdom).

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan deles (delestrek).

**Pakninger og priser:** **4 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 189,40. **16 mg:** 50 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 234,60.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se H02A B04\_2 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Medrol «Pfizer»

## Metoclopramide Orifarm «Orifarm Generics»

C **Motilitetsregulerende. Antiemetikum.** ATC-nr.: A03F A01

T **TABLETTER 10 mg:** Hver tablett inneholder: Metoklopramidhydrokloridmonohydrat tilsv. vannfritt metoklopramidhydroklorid 10 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** *Voksne:* Forebygging av forsinket kvalme og oppkast etter cellegiftbehandling («chemotherapy induced nausea and vomiting», CINV). Forebygging av kvalme og oppkast etter strålebehandling («radiotherapy induced nausea and vomiting», RINV). Symptomatisk behandling av kvalme og oppkast, herunder kvalme og oppkast etter akutt migrene. Metoklopramid brukes i kombinasjon med orale analgetika for å forbedre opptaket av analgetika ved akutt migrene. *Barn og ungdom 1-18 år:* Forebygging av forsinket kvalme og oppkast etter cellegiftbehandling (CINV) som andrelinjealternativ.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Det skal gå minst 6 timer mellom to administreringer, også dersom dosen kastes opp eller andre årsaker (f.eks. diaré). Tabletter egner seg ikke til bruk hos barn som veier <30 kg, andre legemiddelformer eller -styrker kan egne seg bedre for disse. Kan knuses. Kan deles i 2 like doser (delestrek).

**Pakninger og priser:** 20 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 67,40. 50 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 86,20.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se A03F A01\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Afipran «Takeda»

## Metoprolol Sandoz depottabletter «Sandoz»

C **Betablokker.** ATC-nr.: C07A B02

T **DEPOTTABLETTER 25 mg, 50 mg, 100 mg og 200 mg:** Hver depottablett inneholder: Metoprololsuksinat 23,75 mg, resp. 47,5 mg, 95 mg og 190 mg, tilsv. metoprololtartrat 25 mg, resp. 50 mg,

100 mg og 200 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Titandioksid (E 171). 100 mg: Gult jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** Hypertensjon. Angina pectoris. Hjerterytmier, spesielt supraventrikulær takykardi. Profylaktisk behandling for å forebygge hjertedød og reinfarkt etter den akutte fasen av hjerteinfarkt. Palpitasjoner pga. funksjonelle hjertesykdommer. Migreneprofylakse. Stabil symptomatisk hjertesvikt (NYHA-klasse II-IV, venstreventrikkel ejectivesjonsfraksjon <40%) kombinert med annen behandling for hjertesvikt. *Barn og ungdom 6-18 år:* Behandling av hypertensjon.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas 1 gang daglig, fortrinnsvis til frokost. Bør svelges hele med minst et 1/2 glass vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses. Kan deles i like doser (delestrek).

**Pakninger og priser:** **25 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 100,00 (trinnspris: kr 61,20). **50 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 77,40 (trinnspris: kr 62,30). 50 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 104,80 (trinnspris: kr 67,30). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 173,40 (trinnspris: kr 98,70). **100 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 82,00 (trinnspris: kr 68,20). 50 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 112,60 (trinnspris: kr 72,50). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 188,90 (trinnspris: kr 108,90). 250 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 417,80 (trinnspris: kr 218,30). **200 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 424,70 (trinnspris: kr 147,50). 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 424,70 (trinnspris: kr 147,50).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C07A B02\_3 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Selo-Zok «Recordati»

## Mianserin «Mylan»

C *Antidepressiv.*

ATC-nr.: N06A X03

T **TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 30 mg:** Hver tablett inneholdt: Mianserinhydroklorid 10 mg, resp. 30 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Endogene depresjoner av uni- og bipolar type. Forsøksvis ved reaktive, nevrotiske og symptomatiske depresjoner som ikke har reagert tilfredsstillende på annen behandling.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Pga. sedativ effekt bør døgndosen gis som én enkelt dose ved sengetid. Dosen kan også deles i flere doser. Bør svelges hele med litt vann, pga. vond smak.

**Pakninger og priser:** **10 mg:** 90 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 102,50 (trinnspris: kr 67,30). **30 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 121,70 (trinnspris: kr 69,60). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 252,20 (trinnspris: kr 149,00).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N06A X03\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Tolvon «MSD»

## Midazolam Panpharma «Panpharma»

B *Hypnotikum. Sedativum.*

ATC-nr.: N05C D08

T **INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1 mg/ml og 5 mg/ml:** 1 ml inneholdt: Midazolam 1 mg, resp. 5 mg, natriumklorid, saltsyreoppløsning 10%, natriumhydroksidoppløsning 4%, vann til injeksjonsvæsker.

△ **Indikasjoner:** Korttidsvirkende søvninduserende legemiddel. **Voksne:** Sedasjon med opprettholdt bevissthet før og under diagnostiske eller terapeutiske inngrep, med eller uten lokalanestesi. Sedasjon på intensivavdelinger. **Anestesi:** Premedikasjon før innledning av anestesi, innledning av anestesi og som sedativ komponent ved kombinasjonsanestesi. **Barn:** Sedasjon med opprettholdt bevissthet før og under diagnostiske eller terapeutiske inngrep, med eller uten lokalanestesi. Sedasjon på intensivavdelinger. **Anestesi:** Premedikasjon før innledning av anestesi.

**Pakninger og priser:** **1 mg/ml:** 10 × 5 ml<sup>1</sup> (amp.) kr 130,10. **5 mg/ml:** 10 × 1 ml<sup>1</sup> (amp.) kr 134,20. 5 × 3 ml<sup>1</sup> (amp.) kr 132,00. 5 × 10 ml<sup>1</sup> (hettegl.) kr 252,50.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N05C D08\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Midazolam Accord «Accord»

## Miglustat «Gen.Orph»

C *Fordøyelses- og stoffskiftepreparat.*

ATC-nr.: A16A X06

H **KAPSLER, harde 100 mg:** Hver kapsel inneholdt: Miglustat 100 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Pasienter med lett til moderat Gauchers sykdom type 1. Skal kun brukes hos pasienter som anses som uegnet for enzymstatningsbehandling. Behandling av progressive nevrologiske manifestasjoner hos voksne og barn med Niemann-Picks sykdom type C.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas med eller uten mat. Svelges hele med et glass vann.

**Pakninger og priser:** 84 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 74340,70.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>H-resept: A16A X06\_1 Miglustat

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Zavesca «Janssen»

## Miglustat Bluefish «Bluefish»

**C** *Fordøyelses- og stoffskiftepreparat.* ATC-nr.: A16A X06

**H** **KAPSLER, harde 100 mg:** Hver kapsel inneh.: Miglustat 100 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Voksne med lett til moderat Gauchers sykdom type 1. Skal kun brukes til behandling av pasienter hvor enzymsubstitusjonsbehandling anses som uegnet.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas med eller uten mat. Svelges hele med et glass vann.

**Pakninger og priser:** 84 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 74970,60.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>H-resept: A16A X06\_1 Miglustat

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Zavesca «Janssen»

## Mirtazapin Bluefish «Bluefish»

**C** *Antidepressiv.* ATC-nr.: N06A X11

**T** **SMELTETABLETTER 15 mg, 30 mg og 45 mg:** Hver smeltetablett inneh.: Mirtazapin 15 mg, resp. 30 mg og 45 mg, aspartam, hjelpestoffer. Jordbær-guaranasmak, peppermyntesmak.

**Indikasjoner:** Behandling av depressive episoder.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Legges på tungen hvor den raskt vil smelte, og kan svelges med eller uten vann.

**Pakninger og priser:** **15 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 116,50. **30 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 174,20. 96 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 477,50. **45 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 243,10. 96 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 698,20.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N06A X11\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Remeron-S «MSD»

## Mirtazapin HEXAL «HEXAL»

**C** *Antidepressiv.* ATC-nr.: N06A X11

**T** **TABLETTER, filmdrasjerte 30 mg og 45 mg:** Hver tablett inneh.: Mirtazapin 30 mg, resp. 45 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 30 mg: Titandioksid (E 171), gult, rødt og sort jernoksid (E 172). 45 mg: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Til voksne for behandling av depressive episoder.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Svelges med tilstrekkelig mengde væske uten å tygges. *Tabletter 30 mg:* Kan deles (delestrek).

**Pakninger og priser:** **30 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 174,20 (trinnspris: kr 129,90). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 495,90 (trinnspris: kr 391,60). **45 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 725,80 (trinnspris: kr 578,80).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N06A X11\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Remeron «MSD»

## Mirtazapin Orion «Orion»

C **Antidepressiv.** ATC-nr.: N06A X11

T **SMELTETABLETTER 15 mg, 30 mg og 45 mg:** Hver smeltetablett inneh.: Mirtazapin 15 mg, resp. 30 mg og 45 mg, aspartam (E 951) 3 mg, resp. 6 mg og 9 mg, mannitol (E 421), hjelpestoffer.

T **TABLETTER, filmdrasjerte 15 mg, 30 mg og 45 mg:** Hver tablett inneh.: Mirtazapin 15 mg, resp. 30 mg og 45 mg, laktose 102 mg, resp. 204 mg og 306 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171). 15 mg og 30 mg: Gult jernoksid (E 172). 30 mg: Rødt jernoksid (E172), sort jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** Behandling av depressive episoder hos voksne.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør tas til samme tid hver dag. Tas fortrinnsvis som 1 enkelt-dose om kvelden før sengetid. Kan også tas i 2 oppdelte doser (morgen og kveld, den høyeste dosen bør tas om kvelden). Kan tas med eller uten mat. **Smeltetabletter:** For å unngå å knuse smeltetabletten, ikke trykk mot tablettlommen, se pakningsvedlegget for korrekt åpning og uttak av smeltetablett. Legges på tungen hvor den raskt vil løse seg opp, og det anbefales at den svelges med vann. **Tabletter:** Svelges med væske, uten å tygges. **Tabletter 15 mg:** Kan deles i 2 like deler (delestrek). **Tabletter 30 mg:** Kan deles i 2 like deler (delestrek).

**Pakninger og priser:** **Smeltetabletter: 15 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 116,50. 90 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 277,00. **30 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 174,20. 90 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 450,00. **45 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 243,10. 90 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 656,80. **Tabletter: 15 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 111,20. **30 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 165,00 (trinnspris: kr 123,60). 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 486,70 (trinnspris: kr 384,50). **45 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 229,30. 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 712,00 (trinnspris: kr 568,00).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N06A X11\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Remeron, Remeron-S «MSD»

## Mometasone Sandoz «Sandoz»

CF **Kortikosteroid.** ATC-nr.: R01A D09

T **NESESPRAY, suspensjon 50 µg/dose:** Hver dose inneh.: Mometasonfuroatmonohydrat tilsv. mometasonfuroat 50 µg, mikrokrystallinsk cellulose, karmellosenatrium, glyserol, natriumsitrat, sitronsyremonohydrat, polysorbat 80, benzalkoniumklorid, rensset vann.

**Indikasjoner:** Symptomatisk behandling av sesongbetont allergisk rhinitt eller helårlig rhinitt hos voksne og barn >3 år. Behandling av nesepolypper hos voksne >18 år.

**Pakninger og priser:** 140 doser<sup>1</sup> (plastflaske m/dosepumpe) kr 91,00 (trinnspris: kr 88,90). 3 × 140 doser<sup>1</sup> (plastflaske m/dosepumpe) kr 200,50 (trinnspris: kr 194,30).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se R01A D09\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Nasonex «MSD»

## Montelukast «Teva»

C **Leukotrienreseptorantagonist.** ATC-nr.: R03D C03

T **GRANULAT 4 mg:** Hver dosepose inneh.: Montelukastnatrium tilsv. montelukast 4 mg, hjelpestoffer.

T **TYGGETABLETTER 4 mg:** Hver tyggetablett inneh.: Montelukastnatrium tilsv. montelukast 4 mg, aspartam 0,5 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172). Kirsebærsmak.

**Indikasjoner:** **Granulat:** Behandling av astma som tilleggsbehandling hos pasienter 6 måneder-5 år med mild til moderat vedvarende astma når behandling med inhalasjonssteroider og korttidsvirkende betaagonister, tatt ved behov, ikke gir tilstrekkelig klinisk kontroll av astmaen. Granulat kan også være et behandlingsalternativ til lavdose inhalasjonssteroider for pasienter 2-5 år med mild, vedvarende astma som ikke nylig har hatt alvorlige astmaanfall som har krevd bruk av orale kortikosteroider, og for pasienter hvor det er vist at inhalasjonssteroider ikke kan brukes. Granulat er også indisert som profylakse mot astma hos barn ≥2 år når den dominerende årsak er anstrengelsesutløst bronkiekonstriksjon. **Tyggetabletter:** Behandling av astma som tilleggsbehandling hos pasienter 2-5 år med mild til moderat vedvarende astma, som ikke er tilstrekkelig kontrollert med inhalasjonssteroider og der korttidsvirkende betaagonister, tatt ved behov, ikke gir tilstrekkelig klinisk kontroll av astmaen. Tyggetabletter kan også være et behandlingsalternativ til lavdose inhalasjonssteroider for pasienter 2-5 år med mild vedvarende astma som ikke nylig har hatt alvorlige astmaanfall som har krevd bruk av orale kortikosteroider, og som har vist at de ikke er i stand til å bruke inhalasjonssteroider. Tyggetabletter er også indisert for å forebygge astma hos barn ≥2 år der hovedårsaken er anstrengelsesutløst bronkokonstriksjon.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Inntas om kvelden. Bør gis under tilsyn av voksne ved administrering til barn. **Granulat:** Kan tas med eller uten mat. Kan enten tas direkte i munnen eller blandet med en skje med kald eller romtemperert «bløt mat» (f.eks. eplesaus, iskrem, gulrotpuré og ris). Doseposen bør åpnes like før bruk. Hele dosen av granulat bør tas umiddelbart (innen 15 minutter) etter at doseposen er åpnet. Dersom granulatet er blandet med mat, bør det ikke lagres for fremtidig bruk. Det er ikke meningen at granulat skal løses i væske før administrering, men væske kan tas umiddelbart etterpå. **Tyggetabletter:** Skal tas uten mat (1 time før eller 2 timer etter mat). Skal tygges.

**Pakninger og priser:** **Granulat:** 28 stk.<sup>1</sup> (dosepose) kr 227,90 (trinnpris: kr 162,10). **Tyggetabletter:** 28 stk.<sup>1</sup> (bliste) kr 168,40 (trinnpris: kr 94,40). 98 stk.<sup>1</sup> (bliste) kr 498,80 (trinnpris: kr 239,70).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se R03D C03\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Singulair 4 mg «MSD»

## Montelukast «Teva»

C **Leukotrienreseptorantagonist.**

ATC-nr.: R03D C03

T **TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg:** Hver tablett inneholder: Montelukastnatrium tilsv. montelukast 10 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

T **TYGGETABLETTER 5 mg:** Hver tyggetablett inneholder: Montelukastnatrium tilsv. montelukast 5 mg, aspartam 0,5 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172). Kirsebærsmak. **Indikasjoner:** **Tabletter:** Til behandling av astma som tilleggsbehandling for pasienter >15 år med mild til moderat vedvarende astma som ikke er tilstrekkelig kontrollert med inhalasjonssteroider og der korttidsvirkende betaagonister, tatt ved behov, ikke gir tilstrekkelig klinisk kontroll av astma. For astmapasienter der montelukast er indisert for astma, kan montelukast også føre til symptomlindring av sesongrelatert allergisk rhinitt. Forebygging av astma hos pasienter >15 år der hovedkomponenten er anstrengelsesutløst bronkokonstriksjon. **Tyggetabletter:** Behandlingen av astma som tilleggsbehandling hos pasienter fra 6-14 år med mild til moderat vedvarende astma, som ikke er tilstrekkelig kontrollert med inhalasjonssteroider og der korttidsvirkende betaagonister, tatt ved behov, ikke gir tilstrekkelig klinisk kontroll av astma. Behandlingsalternativ til lavdose inhalasjonssteroider for pasienter med mild, vedvarende astma som ikke nylig har hatt alvorlige astma-anfall som har krevd bruk av orale kortikosteroider, og som har vist at de ikke er i stand til å bruke inhalasjonssteroider. Forebygging av astma, hos pasienter fra 6-14 år, der hovedkomponenten er anstrengelsesutløst bronkokonstriksjon.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** **Tabletter:** Tas om kvelden. Kan tas med eller uten mat. **Tyggetabletter:** Tas om kvelden, 1 time før eller 2 timer etter mat.

**Pakninger og priser:** **Tabletter:** 28 stk.<sup>1</sup> (bliste) kr 172,30 (trinnpris: kr 95,90). 98 stk.<sup>1</sup> (bliste) kr 512,40 (trinnpris: kr 244,70). **Tyggetabletter:** 28 stk.<sup>1</sup> (bliste) kr 172,20 (trinnpris: kr 94,70). 98 stk.<sup>1</sup> (bliste) kr 512,20 (trinnpris: kr 240,90).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se R03D C03\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Singulair 5 mg og 10 mg «MSD»

## Moxonidin «Actavis»

C **Selektiv imidazolinreseptorantagonist.**

ATC-nr.: C02A C05

T **TABLETTER, filmdrasjerte 0,2 mg og 0,4 mg:** Hver tablett inneholder: Moxonidin 0,2 mg, resp. 0,4 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Mild til moderat essensiell hypertensjon.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Svelges med væske, f.eks. vann. Kan tas med eller uten mat.

**Pakninger og priser:** **0,2 mg:** 98 stk.<sup>1</sup> (bliste) kr 324,90 (trinnpris: kr 180,80). **0,4 mg:** 98 stk.<sup>1</sup> (bliste) kr 484,90 (trinnpris: kr 264,70).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C02A C05\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Physiotens «Mylan Healthcare Norge AS»



## Mycophenolatmofetil Accord «Accord»

- C *Immunsuppressivt middel.* ATC-nr.: L04A A06
- T **TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg:** *Hver tablett inneh.:* Mykofenolatmofetil 500 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigotin (E 132), rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).  
**Indikasjoner:** I kombinasjon med ciklosporin og kortikosteroider som profylakse mot akutt reaksjon hos pasienter som har fått allogen nyre-, hjerte- eller levertransplantasjon.  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele med et glass vann. Skal ikke deles eller knuses.  
**Pakninger og priser:** 50 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 404,60 (trinnpris: kr 404,60).  
**Refusjon:**  
<sup>1</sup>Se L04A A06\_1 i Refusjonslisten.

### Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

CellCept «Roche»

## Myfenax «Teva»

- C *Immunsuppressivt middel.* ATC-nr.: L04A A06
- T **KAPSLER, harde 250 mg:** *Hver kapsel inneh.:* Mykofenolatmofetil 250 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Karmin (E 132), gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Trykkfarge: Sort jernoksid (E 172), skjellakk, propylenglykol, kaliumhydroksid.
- T **TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg:** *Hver tablett inneh.:* Mykofenolatmofetil 500 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigotin (E 132), rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).  
**Indikasjoner:** I kombinasjon med ciklosporin og kortikosteroider som profylakse mot akutt reaksjon etter nyre-, hjerte- eller levertransplantasjon.  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Svelges hele med et glass vann. Skal ikke knuses. **Kapsler:** Skal ikke åpnes. **Tabletter:** Skal ikke deles.  
**Pakninger og priser:** **Kapsler:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 417,20 (trinnpris: kr 417,20). **Tabletter:** 50 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 404,60 (trinnpris: kr 404,60).  
**Refusjon:**  
<sup>1</sup>Se L04A A06\_1 i Refusjonslisten.

### Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

CellCept «Roche»

## Mykofenolat Accord «Accord»

- C *Immunsuppressivt middel.* ATC-nr.: L04A A06
- T **KAPSLER, harde 250 mg:** *Hver kapsel inneh.:* Mykofenolatmofetil 250 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigotin (E 132), gult, rødt og sort jernoksid (E 172), skjellakk, titandioksid (E 171).  
**Indikasjoner:** I kombinasjon med ciklosporin og kortikosteroider som profylakse mot akutt reaksjon hos pasienter som har fått allogen nyre-, hjerte- eller levertransplantasjon.  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele med et glass vann. Skal ikke knuses. Skal ikke åpnes.  
**Pakninger og priser:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 417,20 (trinnpris: kr 417,20).  
**Refusjon:**  
<sup>1</sup>Se L04A A06\_1 i Refusjonslisten.

### Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

CellCept «Roche»

## Mykofenolatmofetil Accord «Accord»

- C *Immunsuppressivt middel.* ATC-nr.: L04A A06
- PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 500 mg:** *Hvert hetteglass inneh.:* Mykofenolatmofetilhydroklorid tilsv. mykofenolatofetil 500 mg, polysorbat 80, sitronsyre, saltsyre, natriumklorid, natriumhydroksid.  
**Indikasjoner:** I kombinasjon med ciklosporin og kortikosteroider til profylakse av akutt transplantatavstøtning hos pasienter som får allogene nyre- eller levertransplantasjoner.  
**Pakninger og priser:** 4 × 20 ml (hettegl.) kr 534,00.

### Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

CellCept «Roche»

## Mykofenolsyre Accord «Accord»

C *Immunosuppressivt middel.* ATC-nr.: L04A A06

T **ENTEROTABLETTER 180 mg og 360 mg:** Hver enterotablett inneh.: Mykofenolsyre (som mykofenolatnatrium) 180 mg, resp. 360 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 180 mg: Gult og svart jernoksid (E 172), indigokarmin (E 132), titandioksid (E 171). 360 mg: Gult, rødt og svart jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** I kombinasjon med ciklosporin og kortikosteroider til profylakse mot akutt transplantatavvisning hos voksne pasienter som mottar allogene nyretransplantater.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Skal tas konsekvent med eller uten mat. Bør ikke knuses. Der- som det er nødvendig å knuse enterotablettene, må inhalasjon av pulveret eller direkte kontakt mel- lom pulver og hud/slimhinner unngås.

**Pakninger og priser:** **180 mg:** 120 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1248,00. **360 mg:** 120 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 2460,10.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se L04A A06\_2 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Myfortic «Novartis»

## Naproxen «Mylan»

CF *Antiflogistikum.* ATC-nr.: M01A E02

T **TABLETTER 250 mg og 500 mg:** Hver tablett inneh.: Naproxen 250 mg, resp. 500 mg, laktose, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** Revmatoid artritt, juvenil revmatoid artritt, artrose, mb. Bekhterev. Akutte anfall av urinsyregikt. Akutte inflammasjonstilstander i muskel-skjelettsystemet. Primær dysmenoré. Pri- mær og spiralindusert menoragi. Akutte anfall av migrene. Smarter etter mindre operative inngrep.

**Reseptfri bruk:** Egenbehandling av menstruasjonssmerter.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan deles (delestrek).

**Pakninger uten resept:** Tablett 250 mg 20 stk. er unntatt fra reseptplikt.

**Pakninger og priser:** **250 mg:** 20 stk. (blister, reseptfri pakn.) kr \*. 20 stk. (blister) kr 87,20. 50 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 74,50. 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 112,80. **500 mg:** 10 stk. (blister) kr 51,60. 50 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 112,80. 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 189,40.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se M01A E02\_2 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Naproxen Orion «Aurobindo»

## Naproxen-E «Mylan»

C *Antiflogistikum.* ATC-nr.: M01A E02

T **ENTEROTABLETTER 250 mg, 375 mg og 500 mg:** Hver enterotablett inneh.: Naproxen 250 mg, resp. 375 mg og 500 mg, laktose, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** Revmatoid artritt, juvenil revmatoid artritt, artrose, mb. Bekhterev. Akutte anfall av urinsyregikt. Akutte inflammasjonstilstander i muskel-skjelettsystemet. Primær dysmenoré. Pri- mær og spiralindusert menoragi.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Skal svelges hele.

**Pakninger og priser:** **250 mg:** 20 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 80,90. 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 259,50. **375 mg:** 20 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 106,10. 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 385,70. **500 mg:** 10 stk. (endose) kr 73,90. 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 412,90.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se M01A E02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Napren-E «Takeda»

## Naratriptan Orifarm «Orifarm Generics»

C *Migrenemiddel.* ATC-nr.: N02C C02

**T** **TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg:** Hver tablett inneholder: Naratriptanhydroklorid tilsv. naratriptan 2,5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172), indigotin (E 132).

**Indikasjoner:** Akutt behandling av hodepinefasen ved migræne med eller uten aura.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Bør svelges hele med et glass vann.

**Pakninger og priser:** 6 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 319,20 (trinnspris: kr 262,60). 18 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 885,10 (trinnspris: kr 715,30).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N02C C02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Naramig «GlaxoSmithKline»

## Natriumfluorid Morningside «Morningside Healthcare»

**C** **Kariesprofylaktikum.** ATC-nr.: A01A A01

**TANNPASTA 5 mg/g:** 1 g inneholder: Fluor 5 mg (som natriumfluorid) tilsv. 5000 ppm fluor, natriumbenzoat, sorbitoløsning (ikke-krystalliserende), propylenglykol, natriumbenzoat, sakkarinnatrium, hjelpestoffer. Fargestoff: Brilljantblå FCF (E 133). Smak av grønne mynte (spearmint).

**Indikasjoner:** Forebygging av dental karies hos ungdom og voksne, særlig blant pasienter som er utsatt for flere typer karies (koronal og/eller rotkaries).

**Oppbevaring og holdbarhet:** Holdbarhet: 6 måneder etter anbrudd.

**Pakninger og priser:** 51 g (tube) kr 95,80.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Duraphat «Colgate Palmolive A/S» tannpasta

## Nemdatine «Actavis»

**C** **Middel mot demens.** ATC-nr.: N06D X01

**T** **TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 20 mg:** Hver tablett inneholder: Memantinhydroklorid 10 mg, resp. 20 mg tilsv. memantin 8,31 mg, resp. 16,62 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: 10 mg: Titandioksid (E 171). 20 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Behandling av pasienter med moderat til alvorlig grad av Alzheimers sykdom.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør tas 1 gang pr. dag, til samme tid hver dag. Tas med eller uten mat.

**Pakninger og priser:** **10 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 277,60 (trinnspris: kr 197,40). 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 763,40 (trinnspris: kr 552,10). **20 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 410,70 (trinnspris: kr 345,20). 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1346,80 (trinnspris: kr 1068,60).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N06D X01\_2 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Ebixa «Lundbeck»

## Nifenova «Alternova»

**C** **Kalsiumantagonist.** ATC-nr.: C08C A05

**T** **DEPOTTABLETTER 30 mg og 60 mg:** Hver depottablett inneholder: Nifedipin 30 mg, resp. 60 mg, laktosemonohydrat 15 mg, resp. 30 mg, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina).

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas 1 gang daglig med litt væske, fortrinnsvis om morgenen. Kan tas med eller uten mat. Grapefruktjuice skal unngås. Svelges hele. Skal ikke tygges, knuses eller deles.

**Pakninger og priser:** **30 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 319,00 (trinnspris: kr 252,10). **60 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 578,90 (trinnspris: kr 345,90).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C08C A05\_2 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Adalat Oros «Bayer AB»

## Nitisinone MDK «MDK Mendelikabs»

C *Middel mot tyrosinemi.* ATC-nr.: A16A X04

H **KAPSLER, harde 2 mg, 5 mg og 10 mg:** Hver kapsel inneh.: Nitisinon 2 mg, resp 5 mg og 10 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Behandling av voksne og pediatriske (i alle aldre) pasienter med bekreftet diagnose på areditær tyrosinemi type-1 (HT-1) i kombinasjon med diettmessig restriksjon av tyrosin og fenylalanin.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas peroralt 1 gang daglig. For pasienter med kroppsvekt <20 kg er det imidlertid anbefalt å dele den totale daglige dosen i 2 administreringer pga. begrensede data fra denne pasientgruppen. Tas konsekvent med eller uten mat; hvis pasienten starter opp behandlingen ved å ta preparatet sammen med mat, anbefales det å fortsette med dette under hele behandlingen. Ved svelgevansker kan kapslene åpnes og pulveret blandes med litt vann eller annet flytende diettprodukt like før inntak. Andre legemiddelformer av nitisinon er tilgjengelig for pediatriske pasienter som har besvær med å svelge kapsler.

**Pakninger og priser:** **2 mg:** 60 stk.<sup>1</sup> (flaske) kr 8413,10 (trinnpris: kr 5481,20). **5 mg:** 60 stk.<sup>1</sup> (flaske) kr 16785,40 (trinnpris: kr 10923,20). **10 mg:** 60 stk.<sup>1</sup> (flaske) kr 30442,70 (trinnpris: kr 19800,40).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>H-resept: A16A X04\_1 Nitisinon

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Orfadin «Swedish Orphan Biovitrum»

## Nystatin Orifarm «Orifarm Generics»

C *Antimykotikum.* ATC-nr.: A07A A02

T **MIKSTUR, suspensjon 100 000 IU/ml: 1 ml inneh.:** Nystatin 100 000 IU, xylitol, karmellosenatrium, metylparahydroksybenzoat (E 218), peppermynteolje, natriumhydroksid/saltsyre (til pH-justering), renset vann.

**Indikasjoner:** Orale og intestinale Candida-infeksjoner. Som tilleggsbehandling til andre lokalt appliserte legemidler med nystatin som profylakse mot re-infeksjon.

**Oppbevaring og holdbarhet:** *Uåpnet flaske:* Krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. *Åpnet flaske:* Kan oppbevares ved høyst 25°C i høyst 2 måneder.

**Pakninger og priser:** 100 ml<sup>1</sup> kr 236,70.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se A07A A02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Nystimex «RPH Pharmaceuticals»

## Olanzapine Accord «Accord»

C *Antipsykotikum.* ATC-nr.: N05A H03

T **TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg og 10 mg:** Hver tablett inneh.: Olanzapin 2,5 mg, resp. 5 mg, 7,5 mg og 10 mg, laktose. Fargestoff: Alle styrker: Titandioksid (E 171). 15 mg: Indigokarmin (E 132). 20 mg: Rødt jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** Behandling av schizofreni. Effektiv for å vedlikeholde klinisk forbedring under terapi hos pasienter som har vist innledende behandlingsrespons. Behandling av moderat til alvorlig manisk episode. Hos pasienter med manisk episode som har respondert på behandling med olanzapin, er olanzapin indisert for forebygging av tilbakefall hos pasienter med bipolar lidelse.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat.

**Pakninger og priser:** **2,5 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 179,50 (trinnpris: kr 89,30). **5 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 260,40 (trinnpris: kr 102,90). **7,5 mg:** 56 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 638,70 (trinnpris: kr 246,80). **10 mg:** 56 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 925,00 (trinnpris: kr 303,30).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N05A H03\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Zyprexa «Lilly»

## Olanzapine Teva «Teva»

C *Antipsykotikum.* ATC-nr.: N05A H03

T **SMELTETABLETTER 5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg:** Hver smeltetablett inneh.: Olanzapin 5 mg, resp. 10 mg, 15 mg og 20 mg, aspartam, laktose, mannitol, sukrose, hjelpestoffer. Sitronsmak.

T **TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg og 10 mg:** Hver tablett inneh.: Olanzapin 2,5 mg, resp. 5 mg, 7,5 mg og 10 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** *Voksne:* Behandling av schizofreni. Opprettholder effektivt klinisk bedring i løpet av vedlikeholdsbehandlingen hos pasienter som har vist initial behandlingsrespons. Behandling av moderat til alvorlig manisk episode. Forebygging av nye episoder hos pasienter med bipolar lidelse, som har respondert på olanzapinbehandling i manisk fase.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas 1 gang daglig. Bør tas til samme tid hver dag. Kan tas med eller uten mat. **Smeltetabletter:** Kan lett brette og må derfor håndteres forsiktig, se pakningsvedlegget. Skal ikke tas på med våte hender. Puttes i munnen og vil oppløses med en gang slik at den lett kan svelges. Kan også legges i et fullt glass/kopp med vann, appelsin- eller eplejuice, melk eller kaffe og røre rundt. Skal drikkes umiddelbart. **Tabletter:** Bør svelges hele med vann.

**Pakninger og priser:** **Smeltetabletter: 5 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 274,70 (trinnpris: kr 107,60). **10 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 462,60 (trinnpris: kr 176,70). **15 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 690,30 (trinnpris: kr 260,50). **20 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 889,00 (trinnpris: kr 317,20). **Tabletter: 2,5 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 179,50 (trinnpris: kr 89,30). **5 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 260,40 (trinnpris: kr 102,90). **7,5 mg:** 56 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 638,70 (trinnpris: kr 246,80). **10 mg:** 56 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 925,00 (trinnpris: kr 303,30).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N05A H03\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Zyprexa, Zyprexa Velotab «Lilly»

## Olmesartan Medoxomil Accord «Accord»

C *Angiotensin II-reseptorantagonist.* ATC-nr.: C09C A08

T **TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg, 20 mg og 40 mg:** Hver tablett inneh.: Olmesartanmedoxomil 10 mg, resp. 20 mg og 40 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Essensiell hypertensjon hos voksne. Behandling av hypertensjon hos barn og ungdom i alderen 6-18 år.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Det anbefales at dosen tas til omtrent samme tid hver dag for å gjøre det lettere å overholde behandlingsplanen. Svelges med tilstrekkelig mengde væske, f.eks. et glass vann. Kan tas med eller uten mat. Skal ikke tygges.

**Pakninger og priser:** **10 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 165,00. 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 486,90. **20 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 197,60. 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 601,00. **40 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 228,90. 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 710,70.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C09C A08\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Olmotec «Daiichi Sankyo»

## Olmesartan medoxomil Krka «KRKA»

C *Angiotensin II-reseptorantagonist.* ATC-nr.: C09C A08

T **TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg, 20 mg og 40 mg:** Hver tablett inneh.: Olmesartanmedoxomil 10 mg, resp. 20 mg og 40 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Behandling av essensiell hypertensjon.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Det anbefales at dosen tas omtrent til samme tid hver dag for å gjøre det lettere å overholde behandlingsplanen. Kan tas med eller uten mat. Skal svelges med tilstrekkelig mengde væske, f.eks. et glass vann. Skal svelges hele. Skal ikke tygges.

**Pakninger og priser:** **10 mg:** 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 486,90. **20 mg:** 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 601,00. **40 mg:** 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 710,70.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C09C A08\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Olmotec «Daiichi Sankyo»

## Omeprazol Pensa «Pensa Pharma»

CF *Syrepumpehemmer, saltsyresekresjonshemmende middel.*

ATC-nr.: A02B C01

T **ENTEROKAPSLER, harde 10 mg og 20 mg:** Hver enterokapsel inneh.: Omeprazol 10 mg, resp. 20 mg, sukrose, hjelpestoffer. Fargestoff: Sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171), skjellakk.

**Indikasjoner: Voksne:** Behandling av reflukssymptomer (f.eks. halsbrann, sure oppstøt). Behandling av duodenalsår. Profylakse mot residiv av duodenalsår. Behandling av magesår. Profylakse mot residiv av magesår. I kombinasjon med riktig type antibiotika for eradikering av *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) hos pasienter med magesårssykdom. Behandling av NSAID-assosierte magesår og duodenalsår. Forebygging av NSAID-assosierte magesår og duodenalsår hos risikopasienter. Behandling av refluksøsofagitt. Langsiktig behandling av pasienter med tilhelet refluksøsofagitt. Symptomatisk behandling av gastroøsofageal reflukssykdom. Behandling av Zollinger-Ellisons syndrom. **Barn >1 år og vekt ≥10 kg:** Behandling av refluksøsofagitt. Symptomatisk behandling av halsbrann og sure oppstøt ved gastroøsofageal reflukssykdom. **Barn og ungdom >4 år:** I kombinasjon med antibiotika ved behandling av duodenalsår forårsaket av *H. pylori*.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør tas om morgenen. Kan tas med eller uten mat. Bør svelges hele med et 1/2 glass vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses. Pasienter med svelgevansker og barn som kan drikke eller svelge halvt flytende føde kan åpne kapselen og blande innholdet med en spiseskje vann uten kullsyre (ev. fruktjuice eller eplemos om ønskelig). Blandingen bør tas omgående (eller innen 30 minutter) og skal alltid omrøres rett før den drikkes og skylles ned med et 1/2 glass vann. Melk eller kullsyreholdig vann skal ikke brukes. De enterodrasjerte små kulene skal ikke tygges eller knuses.

**Pakninger og priser: 10 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (plastboks) kr 524,00 (trinnpris: kr 224,60). **20 mg:** 14 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 113,60 (trinnpris: kr 73,80). 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 191,00 (trinnpris: kr 115,50). 56 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 345,80 (trinnpris: kr 156,90). 100 stk.<sup>1</sup> (plastboks) kr 589,10 (trinnpris: kr 254,90).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se A02B C01\_1 i Refusjonslisten.

Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Omeprazol Bluefish «Bluefish»

## Omeprazol Sandoz «Sandoz»

C *Syrepumpehemmer, saltsyresekresjonshemmende middel.*

ATC-nr.: A02B C01

T **ENTEROKAPSLER, harde 10 mg og 20 mg:** Hver enterokapsel inneh.: Omeprazol 10 mg, resp. 20 mg, sukrose, hjelpestoffer. Fargestoff: Kinolingult (E 104), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner: Voksne:** Behandling av duodenalsår. Profylakse mot residiv av duodenalsår. Behandling av magesår. Profylakse mot residiv av magesår. Eradikering av *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) i kombinasjon med egnet antibiotika ved peptisk sykdom. Behandling av NSAID-relaterte mage- og duodenalsår. Profylakse mot NSAID-relaterte mage- og duodenalsår hos risikopasienter. Behandling av refluksøsofagitt. Langtidsbehandling av pasienter med tilhelet refluksøsofagitt. Behandling av symptomatisk gastroøsofageal reflukssykdom. Behandling av Zollinger-Ellisons syndrom. **Barn og ungdom: Barn >1 år og ≥10 kg:** Behandling av refluksøsofagitt. Symptomatisk behandling av halsbrann og sure oppstøt ved gastroøsofageal reflukssykdom. **Barn og ungdom >4 år:** Behandling av duodenalsår forårsaket av *H. pylori*, i kombinasjon med antibiotika.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør tas om morgenen. Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele med et 1/2 glass vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses. Pasienter med svelgevansker og barn som kan drikke eller svelge halvt flytende føde kan åpne kapselen og svelge innholdet direkte med et 1/2 glass vann eller blande innholdet med lett sur væske, f.eks. yoghurt, fruktjuice eller eplemos. Ikke bruk melk eller kullsyreholdig vann. Blandingen bør tas umiddelbart (eller innen 30 minutter) og skal alltid omrøres rett før den drikkes og skylles ned med et 1/2 glass vann. Alternativt kan pasienten suge på kapselen og svelge kornene med et 1/2 glass vann. De enterodrasjerte små kulene/kornene skal ikke tygges eller knuses.

**Pakninger og priser: 10 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 524,00 (trinnpris: kr 224,60). **20 mg:** 14 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 113,60 (trinnpris: kr 73,80). 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 191,00 (trinnpris: kr 115,50). 56 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 345,80 (trinnpris: kr 156,90). 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 589,10 (trinnpris: kr 254,90).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se A02B C01\_1 i Refusjonslisten.

Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Omeprazol Bluefish «Bluefish»

## Ondansetron «Hameln»

C *Antiemetikum.*

ATC-nr.: A04A A01

**INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 2 mg/ml: 1 ml inneh.:** Ondansetronhydroklorididihydrat tilsv. ondansetron 2 mg, natrium 3,34 mg (som natriumsitratdihydrat og natriumklorid), sitronsyremonohydrat, vann til injeksjonsvæsker.

**Indikasjoner:** Indisert for forebygging og behandling av kvalme og brekninger forårsaket av kjemoterapi og strålebehandling, og for å forebygge og behandle av postoperativ kvalme og brekninger (PONV). Indisert for behandling av kjemoterapiindusert kvalme og brekninger (CINV) hos barn  $\geq 6$  måneder, og for å forebygge og behandle PONV hos barn  $\geq 1$  måned.

**Pakninger og priser:** 10  $\times$  2 ml (amp.) kr 638,80. 10  $\times$  4 ml (amp.) kr 1028,70.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Zofran «Novartis»

## Ondansetron Accord «Accord»

C *Antiemetikum.*

ATC-nr.: A04A A01

T **INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 2 mg/ml: 1 ml inneh.:** Ondansetronhydroklorididihydrat tilsv. ondansetron 2 mg, sitronsyremonohydrat, natriumsitrat, natriumklorid, natriumhydroksid (til pH-justering), hydroklorisyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.

**Indikasjoner:** *Voksne:* Behandling av kvalme og brekninger forårsaket av kjemoterapi eller strålebehandling, profylakse og behandling av postoperativ kvalme og brekninger (PONV). *Barn:* Behandling av kjemoterapiindusert kvalme og brekninger hos barn  $\geq 6$  måneder. Profylakse og behandling av postoperativ kvalme og brekninger hos barn  $\geq 1$  måned.

**Pakninger og priser:** 5  $\times$  2 ml<sup>1</sup> (amp.) kr 337,50 (trinnspris: kr 219,30). 5  $\times$  4 ml<sup>1</sup> (amp.) kr 532,50 (trinnspris: kr 318,40).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se A04A A01\_2 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Zofran «Novartis»

## Ondansetron Bluefish «Bluefish»

C *Antiemetikum.*

ATC-nr.: A04A A01

T **TABLETTER, filmdrasjerte 4 mg og 8 mg: Hver tablett inneh.:** Ondansetronhydroklorididihydrat tilsv. ondansetron 4 mg, resp. 8 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Til behandling av kvalme og oppkast forårsaket av cytotoxisk kjemoterapi og strålebehandling, og til å forebygge og behandle postoperativ kvalme og oppkast. *Barn og ungdom:* Behandling av kvalme og oppkast forårsaket av kjemoterapi hos barn  $\geq 6$  måneder. Forebygging og behandling av postoperativ kvalme og oppkast hos barn  $\geq 1$  måned.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Bør svelges med et glass vann. Tablett 8 mg kan deles (delestrek).

**Pakninger og priser:** **4 mg:** 10 stk.<sup>1</sup> (blistre) kr 258,90 (trinnspris: kr 229,30). 50 stk.<sup>1</sup> (blistre) kr 1101,20 (trinnspris: kr 996,70). 100 stk.<sup>1</sup> (blistre) kr 2166,20 (trinnspris: kr 1967,80). **8 mg:** 10 stk.<sup>1</sup> (blistre) kr 291,90 (trinnspris: kr 291,90). 30 stk.<sup>1</sup> (blistre) kr 803,20 (trinnspris: kr 803,20). 50 stk.<sup>1</sup> (blistre) kr 1314,50 (trinnspris: kr 1314,50). 100 stk.<sup>1</sup> (blistre) kr 2592,70 (trinnspris: kr 2592,70).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se A04A A01\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Zofran «Novartis»

## Ondansetron Bluefish «Bluefish»

C *Antiemetikum.*

ATC-nr.: A04A A01

T **SMELTETABLETTER 4 mg og 8 mg: Hver smeltetablett inneh.:** Ondansetron 4 mg, resp. 8 mg, aspartam, glukose, mannitol, sorbitol, svoveldioksid (E 220), hjelpestoffer. Jordbærsmak.

**Indikasjoner:** *Voksne:* Behandling av kvalme og oppkast forårsaket av cytotoxisk kjemoterapi og strålebehandling, og forebygging av postoperativ kvalme og oppkast hos voksne. *Barn:* Behandling av kvalme og oppkast forårsaket av kjemoterapi hos barn  $\geq 6$  måneder. Forebygging og behandling av postoperativ kvalme og oppkast hos barn  $\geq 1$  måned.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Tas ut av pakken med tørre hender, plasseres på tungen, hvor den raskt oppløses og så svelges med eller uten vann.

**Pakninger og priser:** **4 mg:** 10 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 258,90. **8 mg:** 10 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 291,90.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se A04A A01\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Zofran «Novartis»

## Ondansetron Fresenius Kabi «Fresenius Kabi»

C *Antiemetikum.* ATC-nr.: A04A A01

T **INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 2 mg/ml: 1 ml inneh.:** Ondansetronhydrokloriddihydrat tilsv. ondansetron 2 mg, natriumklorid, sitronsyremonohydrat, natriumsitrat (E 331), vann til injeksjonsvæsker.

**Indikasjoner: Voksne:** Behandling av kvalme og brekninger forårsaket av cytotoksisk kjemoterapi og strålebehandling. Profylakse og behandling av postoperativ kvalme og brekninger (PONV).

**Barn:** Behandling av kvalme og brekninger forårsaket av kjemoterapi (CINV) hos barn  $\geq 6$  måneder. Profylakse og behandling av postoperativ kvalme og brekninger (PONV) hos barn  $\geq 1$  måned.

**Pakninger og priser:** 5  $\times$  2 ml<sup>1</sup> (amp.) kr 337,50 (trinnpris: kr 219,30). 5  $\times$  4 ml<sup>1</sup> (amp.) kr 532,50 (trinnpris: kr 318,40).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se A04A A01\_2 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Zofran «Novartis»

## Oralcon «CampusPharma»

C *Antikonsepsjonsmiddel.* ATC-nr.: G03A A07

**TABLETTER, drasjerte:** Hver tablett inneh.: Levonorgestrel 150  $\mu$ g, etinylostradiol 30  $\mu$ g, laktose, sukrose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Oral antikonsepsjon.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Skal tas omtrent på samme tidspunkt hver dag. Kan tas med eller uten mat.

**Pakninger og priser:** 3  $\times$  21 stk. (blister) kr 88,00 (trinnpris: kr 78,00).

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Microgynon «Bayer AB»

## Orisild «Orion»

C *Middel mot pulmonal arteriell hypertensjon.* ATC-nr.: G04B E03

H **TABLETTER, filmdrasjerte 20 mg:** Hver tablett inneh.: Sildenafilsitrat tilsv. sildenafil 20 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Voksne: Pulmonal arteriell hypertensjon (PAH), klassifisert som WHO funksjonsklasse II og III, for å forbedre arbeidskapasiteten. Effekt er vist ved primær pulmonal hypertensjon og pulmonal hypertensjon assosiert med bindevevssykdommer. *Barn og ungdom 1-17 år:* Pulmonal arteriell hypertensjon. Effekt i form av forbedring av fysisk arbeidskapasitet eller pulmonal hemodynamikk er vist ved primær pulmonal hypertensjon og pulmonal hypertensjon forbundet med kongenital hjertesykdom.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør tas med ca. 6-8 timers mellomrom, med eller uten mat. Svelges hele.

**Pakninger og priser:** 90 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 4871,90.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>H-resept: G04B E03\_1 Sildenafil

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Revatio «Pfizer»

## Oxaliplatin Fresenius Kabi «Fresenius Kabi»

C *Cytostatikum.* ATC-nr.: L01X A03



**KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml:** 1 hetteglass inneh.: Oksaliplatin 50 mg, resp. 100 mg og 200 mg, vann til injeksjonsvæsker.

**Indikasjoner:** Oksaliplatin i kombinasjon med 5-fluorouracil (5-FU) og folinsyre (FS) er indisert for adjuvant behandling av stadium III (Duke's C) koloncancer etter fullstendig reseksjon av primærtumoren og til behandling av metastaserende kolorektalcancer.

**Pakninger og priser:** 10 ml (hettegl.) kr 2248,40. 20 ml (hettegl.) kr 4460,50. 40 ml (hettegl.) kr 8884,70.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Oksaliplatin SUN «SUN Pharma»

## Oxycodone Actavis «Actavis»

A **Korttidsvirkende opioidanalgetikum ved sterke smerter.** ATC-nr.: N02A A05

T **KAPSLER, harde 5 mg, 10 mg og 20 mg:** Hver kapsel inneh.: Oksykodonhydroklorid 5 mg, resp. 10 mg og 20 mg, tilsv. oksykodon 4,5 mg, resp. 9 mg og 18 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigotin (E 132), gult, rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

△ **Indikasjoner:** Sterke smerter som kun kan behandles tilfredsstillende med opioidanalgetika.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas med eller uten mat. Svelges hele med tilstrekkelig mengde væske. Samtidig inntak av grapefrukt/grapefruktjuice eller alkohol skal unngås.

**Pakninger og priser:** 5 mg: 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 109,80 (trinnspris: kr 79,60). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 180,90 (trinnspris: kr 117,00). 10 mg: 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 159,50 (trinnspris: kr 97,20). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 301,90 (trinnspris: kr 170,40). 20 mg: 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 222,00 (trinnspris: kr 132,50). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 543,70 (trinnspris: kr 277,30).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N02A A05\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

OxyNorm «Mundipharma» kaps., mikst.

## Oxycodone Hameln «Hameln»

A **Korttidsvirkende opioidanalgetikum ved sterke smerter.** ATC-nr.: N02A A05

T **INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml og 50 mg/ml:** 1 ml inneh.: Oksykodonhydroklorid 10 mg og 50 mg tilsv. oksykodon 9 mg og 45 mg, sitronsyremonohydrat, natriumsitratdihydrat, natriumklorid, saltsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.

△ **Indikasjoner:** *Voksne:* Behandling av moderate til alvorlige smerter ved kreft og postoperative smerter. Behandling av alvorlige smerter som krever bruk av sterke opioider.

**Pakninger og priser:** 10 mg/ml: 10 × 1 ml<sup>1</sup> (glassamp.) kr 205,50. 10 × 2 ml<sup>1</sup> (glassamp.) kr 350,90. 50 mg/ml: 10 × 1 ml<sup>1</sup> (glassamp.) kr 787,40.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N02A A05\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

OxyNorm «Mundipharma» inf./inj.

## Paclitaxel Fresenius Kabi «Fresenius Kabi»

C **Cytostatikum.** ATC-nr.: L01C D01

**KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE 6 mg/ml:** 1 ml inneh.: Paklitaksel 6 mg, etanol (vannfri), makrogolglyserolricinoleat, sitronsyre (vannfri).

**Indikasjoner:** *Ovariekarsinom:* Førstelinjehandling av ovariecancer til pasienter med fremskreden sykdom eller restsykdom (>1 cm) etter innledende laparotomi, i kombinasjon med cisplatin. Andrelinjehandling av metastatisk ovariekreft etter behandlingssvikt med platinabasert standardterapi. *Brystkarsinom:* Som adjuvant behandling av lymfeknutepositiv brystcancer etter behandling med antrasyklin og cyklofosamid (AC) (som alternativ til forlenget AC-behandling). Førstelinjehandling av lokalavansert eller metastaserende brystkreft i kombinasjon med antrasyklin hos pasienter hvor antrasyklinbehandling er egnet, eller i kombinasjon med trastuzumab hos pasienter med overekspresjon av human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER-2) på et 3+ nivå bestemt ved immunhistokjemi hvor behandling med antrasykliner ikke er egnet. Som monoterapi for behandling av metastatisk brystkarsinom hos pasienter hvor standard antrasyklinbehandling har sviktet eller ikke er egnet. *Avansert ikke småcellet lungekarsinom (NSCLC):* I kombinasjon med cisplatin, til pasienter som ikke er egnet for potensielt kurativ kirurgi og/eller strålebehandling.

*Aids-relatert Kaposi sarkom (KS):* Til behandling av pasienter med fremskreden aids-relatert Kaposi sarkom hvor liposomal antrasyklinbehandling har sviktet.

**Pakninger og priser:** 5 ml (hettegl.) kr 1307,90. 16,7 ml (hettegl.) kr 4283,60. 25 ml (hettegl.) kr 6394,60. 50 ml (hettegl.) kr 12752,90.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Paclitaxel Accord «Accord»

## Padviram «Sandoz»

C *Antiviralt middel.*

ATC-nr.: J05A R06

H **TABLETTER, filmdrasjerte 600 mg/200 mg/245 mg:** Hver tablett inneh.: Efavirenz 600 mg, emtricitabin 200 mg, tenofoviridisoproksilsuksinat tilsv. tenofoviridisoproksil 245 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Kombinasjonspreparat med fast dose efavirenz, emtricitabin og tenofoviridisoproksil. Indisert til behandling av infeksjoner forårsaket av humant immunsviktvirus-1 (hiv-1) hos voksne  $\geq 18$  år med virologisk suppresjon av hiv-1 RNA-nivåer på  $< 50$  kopier/ml ved nåværende antiviral kombinasjonsbehandling i  $> 3$  måneder. Pasientene skal ikke ha erfart virologisk svikt ved tidligere antiretroviral behandling, og de skal ikke ha utviklet virusstammer med mutasjoner som viser signifikant resistens overfor noen av de 3 komponentene i preparatet. Fordelene med et kombinasjonspreparat med fast dose efavirenz, emtricitabin og tenofoviridisoproksil er hovedsakelig vist ved 48 ukers data fra en studie hvor pasienter med stabil virologisk suppresjon ved antiviral kombinasjonsbehandling byttet til kombinasjonspreparat med fast dose efavirenz, emtricitabin og tenofoviridisoproksil. Det foreligger foreløpig ikke data fra studier med kombinasjonspreparat med fast dose efavirenz, emtricitabin og tenofoviridisoproksil hos behandlingsnaive pasienter eller hos pasienter som er kraftig behandlet tidligere. Det finnes ingen data som støtter kombinasjonen av efavirenz, emtricitabin og tenofoviridisoproksil og andre antiretrovirale legemidler.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør tas ved sengetid, for å øke toleransen for efavirenz med hensyn på nevrologiske bivirkninger. Bør tas på tom mage (vanligvis 1 time før eller 2 timer etter mat). Skal svelges hele med vann.

**Pakninger og priser:** 30 stk.<sup>1</sup> (flaske) kr 8599,10.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>H-resept: J05A R06\_1 Emtricitabin, tenofoviridisoproksil og efavirenz

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Atripla «Gilead»

## Palonosetron Accord «Accord»

C *Antiemetikum.*

ATC-nr.: A04A A05

**INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 50 µg/ml: 1 ml inneh.:** Palonosetronhydroklorid tilsv. palonosetron 50 µg, mannitol, dinatriumedetat, natriumsitrat, sitronsyremonohydrat, natriumhydroksid og saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.

**Indikasjoner:** *Voksne:* Forebygging av akutt kvalme og oppkast forbundet med høy emetogen kjemoterapi mot kreft. Forebygging av kvalme og oppkast forbundet med moderat emetogen kjemoterapi mot kreft. *Barn fra 1 måneds alder:* Forebygging av akutt kvalme og oppkast forbundet med høy emetogen kjemoterapi mot kreft, og forebygging av kvalme og oppkast forbundet med moderat emetogen kjemoterapi mot kreft.

**Pakninger og priser:** 5 ml (hettegl.) kr 719,10.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Aloxi «Helsinn Birex Pharmaceuticals»

## Palonosetron Fresenius Kabi «Fresenius Kabi»

C *Antiemetikum.*

ATC-nr.: A04A A05

**INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 50 µg/ml: 1 ml inneh.:** Palonosetronhydroklorid tilsv. palonosetron 50 µg, mannitol, dinatriumedetatdihydrat, natriumsitratdihydrat, vannfri sitronsyre, natriumhydroksid og saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker. Natriuminnh.: 0,04 mmol (eller 0,91 mg) pr. ml. pH 4,7-5,3. Osmolalitet 270-330 mOsmol/kg.

**Indikasjoner:** *Voksne, ungdom og barn > 1 måned:* Forebygging av akutt kvalme og oppkast forbundet med høyemetogen kjemoterapi mot kreft. Forebygging av kvalme og oppkast forbundet med moderat emetogen kjemoterapi mot kreft.

**Pakninger og priser:** 5 ml (hettegl.) kr 719,10. 10 × 5 ml (hettegl.) kr 6864,50.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Aloxi «Helsinn Birex Pharmaceuticals»

## Pantoprazol Krka «KRKA»

**C** *Protonpumperhemmer, saltsyresekresjonshemmende middel.* ATC-nr.: A02B C02

**T** **ENTEROTABLETTER 20 mg og 40 mg:** Hver enterotablett inneh.: Pantoprazolnatriumsesquihydrat tilsv. pantoprazol 20 mg, resp. 40 mg, sorbitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** **20 mg:** *Voksne:* Behandling av symptomer tilknyttet gastroøsofageal refluks forårsaket av tilbakelekking av magesyre. Langtidsbehandling og forebygging av refluksøsofagitt. Forebygging av sår i magesekken og tolvfingertarmen forårsaket av betennelsesdempende og smertestillende legemidler (NSAID som ibuprofen) hos risikopasienter med behov for kontinuerlig behandling med slike legemidler. *Barn ≥12 år:* Behandling av symptomer tilknyttet gastroøsofageal refluks forårsaket av tilbakelekking av magesyre. Langtidsbehandling og forebygging av refluksøsofagitt. **40 mg:** *Voksne:* Behandling av refluksøsofagitt. Behandling av infeksjon knyttet til bakterien *Helicobacter pylori* hos pasienter med sår i tolvfingertarmen og magesekken, i kombinasjon med 2 antibiotika. Behandling av mage- og tolvfingertarmsår. Behandling av Zollinger-Ellisons syndrom og andre tilstander der det produseres for store mengder magesyre. *Barn ≥12 år:* Behandling av refluksøsofagitt.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas 1 time før mat. Skal svelges hele med vann. Skal ikke tygges eller knuses.

**Pakninger og priser:** **20 mg:** 14 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 48,00 (trinnpris: kr 48,00). 56 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 83,40 (trinnpris: kr 83,40). 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 118,70 (trinnpris: kr 118,70). **40 mg:** 14 stk.<sup>2</sup> (blister) kr 53,90 (trinnpris: kr 53,90). 28 stk.<sup>2</sup> (blister) kr 71,50 (trinnpris: kr 71,50). 56 stk.<sup>2</sup> (blister) kr 106,80 (trinnpris: kr 106,80). 98 stk.<sup>2</sup> (blister) kr 159,70 (trinnpris: kr 159,70).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se A02B C02\_1 i Refusjonslisten.

<sup>2</sup>Se A02B C02\_2 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Somac «Takeda»

## Pantoprazol Pensa «Pensa Pharma»

**C** *Protonpumperhemmer, saltsyresekresjonshemmende middel.* ATC-nr.: A02B C02

**T** **ENTEROTABLETTER 20 mg og 40 mg:** Hver enterotablett inneh.: Pantoprazolnatriumsesquihydrat tilsv. pantoprazol 20 mg, resp. 40 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 20 mg: Gult jernoksid (E 172), kinolingult (E 104), titandioksid (E 171). 40 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** **Enterotabletter 20 mg:** *Voksne og ungdom ≥12 år:* Symptomatisk gastroøsofageal reflukssykdom. Langtidsbehandling av refluksøsofagitt og forebygging av tilbakefall. *Voksne:* Forebygging av gastroduodenalsår induisert av ikke-selektive ikke-steroid antiinflammatoriske legemidler (NSAID), hos pasienter i risikosonen med behov for kontinuerlig NSAID-behandling. **Enterotabletter 40 mg:** *Voksne og ungdom ≥12 år:* Refluskøsofagitt. *Voksne:* Eradikering av *Helicobacter pylori* i kombinasjon med passende antibiotikabehandling hos pasienter med *H. pylori*-assosiert ulcus. Ventrikkel- og duodenalsår. Zollinger-Ellisons syndrom og andre sykdommer forbundet med patologisk hypersekresjonsforhold.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Skal tas 1 time før mat. Skal svelges hele med litt vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses eller deles.

**Pakninger og priser:** **20 mg:** 14 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 48,00 (trinnpris: kr 48,00). 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 59,80 (trinnpris: kr 59,80). 56 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 83,40 (trinnpris: kr 83,40). 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 118,70 (trinnpris: kr 118,70). **40 mg:** 14 stk.<sup>2</sup> (blister) kr 53,90 (trinnpris: kr 53,90). 28 stk.<sup>2</sup> (blister) kr 71,50 (trinnpris: kr 71,50). 56 stk.<sup>2</sup> (blister) kr 106,80 (trinnpris: kr 106,80). 98 stk.<sup>2</sup> (blister) kr 159,70 (trinnpris: kr 159,70).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se A02B C02\_1 i Refusjonslisten.

<sup>2</sup>Se A02B C02\_2 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Somac «Takeda»

## Pantoprazol SUN «SUN Pharma»

C *Syrepumpehemmer, saltsyresekresjonshemmende middel.* ATC-nr.: A02B C02

**PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 40 mg:** Hvert hetteglass inneh.: Pantoprazolnatriumsesquihydrat tilsv. pantoprazol 40 mg.

**Indikasjoner:** Refluksøsofagitt. Ventrikkel- og duodenalsår. Zollinger-Ellisons syndrom og andre tilstander med patologisk høy sekresjon.

**Pakninger og priser:** 5 stk. (hettegl.) kr 284,00.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Somac «Takeda»

## Paracetamol Norfri «Evolan Pharma»

CF *Analgetikum. Antipyretikum.* ATC-nr.: N02B E01

**MIKSTUR, oppløsning 24 mg/ml: 1 ml inneh.:** Paracetamol 24 mg, glyserol, flytende sorbitol, povidon, natriumsitrat, kaliumsorbat, sitronsyremonohydrat, natriummetabisulfitt (E 223), sakkarinnatrium, rensert vann. Jordbærsmak.

**Indikasjoner:** Korttidsbehandling av feber, f.eks. ved forkjølelse og influensa, milde til moderate smerter, som f.eks. hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel- og leddsmerter. Under legekontroll forebyggende mot komplikasjoner ved høy feber, langvarige hodesmerter og muskel- og leddplager. **Reseptfri bruk:** Korttidsbehandling av feber, f.eks. ved forkjølelse og influensa, milde til moderate smerter, som f.eks. hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel- og leddsmerter. Ved høy feber må lege kontaktes.

**Pakninger uten resept:** 60 ml er unntatt fra reseptplikt.

**Pakninger og priser:** 60 ml kr \*.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Pinex «Actavis»

## Paracetamol Norfri «Evolan Pharma»

CF *Analgetikum. Antipyretikum.* ATC-nr.: N02B E01

**BRUSETABLETTER 500 mg:** Hver brusetablett inneh.: Paracetamol 500 mg, sorbitol, sakkarinnatrium, smaks- og hjelpestoffer. Natrium, ca. 503 mg/brusetablett. Sitronsmak.

**Indikasjoner:** Korttidsbehandling av feber, f.eks. ved forkjølelse og influensa, milde til moderate smerter, som f.eks. hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel- og leddsmerter. Under legekontroll forebyggende mot komplikasjoner ved høy feber, langvarige hodesmerter og muskel- og leddplager. **Reseptfri bruk:** Korttidsbehandling av feber, f.eks. ved forkjølelse og influensa, milde til moderate smerter, som f.eks. hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel- og leddsmerter. Ved høy feber må lege kontaktes.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Oppløses i et glass vann. Kan ikke deles i like doser.

**Pakninger uten resept:** 20 stk. er unntatt fra reseptplikt.

**Pakninger og priser:** 20 stk. (plastrør) kr \*.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Paracet «Karo Pharma»

## Paracetamol Orifarm «Orifarm Generics»

CF *Analgetikum. Antipyretikum.* ATC-nr.: N02B E01

T **TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg:** Hver tablett inneh.: Paracetamol 500 mg, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** Voksne og barn >15 kg (3 år). Lette til moderate kortvarige smerter som menstruasjonssmerter, tannpine, hodepine, muskel- og leddsmerter, f.eks. ved feber og forkjølelse. Ubehag ved feber. Forebyggende mot komplikasjoner ved høy feber, langvarige hodesmerter og muskel- og leddplager.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan deles i like doser (delestrek).

**Pakninger og priser:** 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 65,80. 300 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 124,80.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N02B E01\_2 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Panodil «GlaxoSmithKline Consumer Healthcare»

## Paroxetin «Actavis»

- C *Antidepressiv, SSRI.* ATC-nr.: N06A B05
- T **TABLETTER, filmdrasjerte 20 mg:** Hver tablett inneh.: Paroksetin 20 mg, soyalecitin (E 322), hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).  
**Indikasjoner:** Behandling av: Depresjon. Tvangslidelse. Panikklidelse med og uten agorafobi. Sosial angstlidelse/sosial fobi. Generalisert angstlidelse. Posttraumatisk stresslidelse.  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas med mat. Bør ikke tygges. Kan deles i 2 like doser (delestrek).  
**Pakninger og priser:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 329,20 (trinnpris: kr 206,90).  
**Refusjon:**  
<sup>1</sup>Se N06A B05\_1 i Refusjonslisten.

### Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Seroxat «GlaxoSmithKline»

## Paroxetin HEXAL «HEXAL»

- C *Antidepressiv.* ATC-nr.: N06A B05
- T **TABLETTER, filmdrasjerte 20 mg:** Hver tablett inneh.: Paroksetin (som hydroklorid) 20 mg. Fargestoff: Titandioksid (E 171).  
**Indikasjoner:** Behandling av: Depressiv episode. Tvangslidelse. Panikklidelse med og uten agorafobi. Sosial angstlidelse/sosial fobi. Generalisert angstlidelse. Posttraumatisk stresslidelse.  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør tas om morgenen. Bør tas med mat. Bør svelges hele med et glass vann. Skal ikke tygges. Kan deles i 2 like doser ved behov (delestrek).  
**Pakninger og priser:** 20 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 114,70 (trinnpris: kr 70,70). 60 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 212,00 (trinnpris: kr 136,00). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 329,20 (trinnpris: kr 205,50). 250 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 768,50 (trinnpris: kr 469,20).  
**Refusjon:**  
<sup>1</sup>Se N06A B05\_1 i Refusjonslisten.

### Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Seroxat «GlaxoSmithKline»

## Pemetrexed «Sandoz»

- C *Folsyreanalog.* ATC-nr.: L01B A04
- PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 100 mg og 500 mg:** 1 hetteglass inneh.: Pemetrekseddinatrium tilsv. pemetreksed 100 mg, resp. 500 mg, mannitol, salt-syre/natriumhydroksid (til pH-justering).  
**Indikasjoner:** *Malignt pleuralt mesoteliom:* Pemetreksed i kombinasjon med cisplatin er indisert til behandling av kjemoterapi-naive pasienter med ikke-resecerbar malignt pleuralt mesoteliom. *Ikke-småcellet lungekreft:* Pemetreksed i kombinasjon med cisplatin er indisert som førstelinjebehandling av pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer annet enn predominant plateepitelhistologi. Pemetreksed er indisert som monoterapi for vedlikeholdsbehandling av lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft annet enn predominant plateepitelhistologi hos pasienter med sykdom som ikke har vist progresjon umiddelbart etter platinabasert kjemoterapi. Pemetreksed er indisert som monoterapi til andrelinjebehandling av pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft annet enn predominant plateepitelhistologi.  
**Pakninger og priser:** **100 mg:** 1 stk. (hettegl.) kr 2699,00. **500 mg:** 1 stk. (hettegl.) kr 12949,50.

### Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Alimta «Lilly»

## Pemetrexed Accord «Accord»

- C *Folsyreanalog.* ATC-nr.: L01B A04

**PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 100 mg, 500 mg og 1000 mg:** 1 hetteglass inneh.: Pemetrekseddinatriumhemipentahydrat tilsv. pemetreksed 100 mg, resp. 500 mg og 1000 mg, mannitol, saltsyre og natriumhydroksid (til pH-justering).

**Indikasjoner:** *Malignt pleuralt mesoteliom:* I kombinasjon med cisplatin til behandling av kjemoterapi naive pasienter med ikke-resecerbar malignt pleuralt mesoteliom. *Ikke-småcellet lungecancer:* I kombinasjon med cisplatin som førstelinjebehandling av pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft annet enn predominant plateepitelhistologi. Som monoterapi for vedlikeholdsbehandling av lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft annet enn predominant plateepitelhistologi, hos pasienter med sykdom som ikke har vist progresjon umiddelbart etter platinabasert kjemoterapi. Som monoterapi til annenlinje behandling av pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft annet enn predominant plateepitelhistologi.

**Pakninger og priser:** **100 mg:** 1 stk. (hettegl.) kr 2699,00. **500 mg:** 1 stk. (hettegl.) kr 12949,50. **1000 mg:** 1 stk. (hettegl.) kr 26664,10.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Alimta «Lilly»

## Pilexam «Pilum Pharma»

**C Fibrinolysehemmer.** ATC-nr.: B02A A02

**T INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 100 mg/ml: 1 ml inneh.:** Traneksamsyre 100 mg, vann til injeksjonsvæsker.

**Indikasjoner:** Forebygging og behandling av blødninger pga. generell eller lokal fibrinolyse hos voksne og barn  $\geq 1$  år. Spesifikke indikasjoner inkluderer: Blødninger forårsaket av generell eller lokal fibrinolyse som menoragi og metroragi, gastrointestinal blødning, blødende urinveislidelser, etter prostatakirurgi eller kirurgiske prosedyrer som påvirker urinveiene. Øre-nese-hals-kirurgi (adenektomi, tonsillektomi, tannekstraksjoner). Gynekologisk kirurgi eller lidelser av obstetrisk opprinnelse. Thorax- og abdominal-kirurgi og andre større kirurgiske inngrep som hjertekar-kirurgi. Behandling av blødning grunnet administrering av fibrinolytisk middel.

**Pakninger og priser:** 10  $\times$  5 ml<sup>1</sup> (amp.) kr 326,10.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se B02A A02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Cyklkapron «Pfizer»

## Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi «Fresenius Kabi»

**C Antibiotikum.** ATC-nr.: J01C R05

**T PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE 2 g/0,25 g og 4 g/0,5 g:** Hvert hetteglass inneh.: Piperacillinatrium tilsv. piperacillin 2 g, resp. 4 g, tazobaktamnatrium tilsv. tazobaktam 0,25 g, resp. 0,5 g.

**Indikasjoner:** *Voksne og ungdom:* Alvorlig pneumoni, inkl. sykehuservvert og respiratorrelatert pneumoni, urinveisinfeksjoner (inkl. pyelonefritt) med komplikasjoner, intraabdominale infeksjoner med komplikasjoner, hud- og bløtdelsinfeksjoner (inkl. diabetisk fotinfeksjon) med komplikasjoner. Behandling av pasienter med bakteremi som opptrer i forbindelse med, eller mistenkes å være forbundet med, noen av ovennevnte infeksjoner. Behandling av pasienter med nøytropeni med feber, mistenkt forårsaket av en bakterieinfeksjon. *Barn (2-12 år):* Intraabdominale infeksjoner med komplikasjoner. Kan brukes ved behandling av barn, ungdom og voksne med nøytropeni med feber mistenkt forårsaket av bakterieinfeksjon.

**Pakninger og priser:** **2 g/0,25 g:** 10 stk.<sup>1</sup> (hettegl.) kr 819,50. **4 g/0,5 g:** 10 stk.<sup>1</sup> (hettegl.) kr 1344,40.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se J01C R05\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Piperacillin/Tazobactam «Stragen»

## Pramipexole Orion «Orion»

**C Antiparkinsonmiddel.** ATC-nr.: N04B C05

- T** **TABLETTER 0,088 mg, 0,18 mg og 0,7 mg:** Hver tablett inneh.: Pramipeksolbase 0,088 mg, resp. 0,18 mg og 0,7 mg, mannitol, hjelpestoffer.  
**Indikasjoner:** Hos voksne for behandling av tegn og symptomer på idiopatisk Parkinsons sykdom, alene eller i kombinasjon med levodopa, dvs. gjennom hele sykdomsforløpet til sene stadier hvor effekten av levodopa avtar eller varierer og fluktuasjoner i terapeutisk effekt oppstår («end of dose» eller «on off»-fluktuasjoner).  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Svelges med vann. *Tabletter 0,18 mg:* Kan deles i 2 like deler. *Tabletter 0,7 mg:* Kan deles i 2 like deler.  
**Pakninger og priser:** **0,088 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 89,50 (trinnpris: kr 66,00). **0,18 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 117,10 (trinnpris: kr 87,80). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 267,40 (trinnpris: kr 208,10). **0,7 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 772,30 (trinnpris: kr 624,30).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N04B C05\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Oprymeia «KRKA»

## Prasugrel Krka «KRKA»

- C** *Plateaggregasjonshemmer.* ATC-nr.: B01A C22
- T** **TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg og 10 mg:** Hver tablett inneh.: Prasugrel 5 mg, resp. 10 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 10 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).  
**Indikasjoner:** Prasugrel gitt samtidig med acetylsalisylsyre (ASA) er indisert for forebygging av aterotrombotiske hendelser hos voksne med akutt koronarsyndrom, dvs. ustabil angina, hjerteinfarkt uten ST-segmentelevation (UA/NSTEMI) eller hjerteinfarkt med ST-segmentelevation (STEMI), som gjennomgår primær eller forsinket perkutan koronarintervensjon (PCI).  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Bolusdosen på 60 mg i fastende tilstand kan sørge for hurtigst innsettende virkning. Skal ikke knuses eller deles.  
**Pakninger og priser:** **5 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 547,70. **10 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 547,70.  
**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se B01A C22\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Efient «Daiichi Sankyo»

## Prednisolon Alternova «Alternova»

- C** *Kortikosteroid.* ATC-nr.: H02A B06
- T** **TABLETTER 2,5 mg, 5 mg og 20 mg:** Hver tablett inneh.: Prednisolon 2,5 mg, resp. 5 mg og 20 mg, laktose, hjelpestoffer.  
**Indikasjoner:** Alvorlige lidelser der først og fremst antiinflammatorisk og immunsuppressiv effekt tilsiktes.  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan deles i like doser (delestrek).  
**Pakninger og priser:** **2,5 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (plastboks) kr 68,00. **5 mg:** 50 stk.<sup>1</sup> (plastboks) kr 63,00. 100 stk.<sup>1</sup> (plastboks) kr 89,70. **20 mg:** 25 stk.<sup>1</sup> (plastboks) kr 72,20. 100 stk.<sup>1</sup> (plastboks) kr 165,90.  
**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se H02A B06\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Prednisolon «Takeda»

## Provaqomyl «Mylan»

- C** *Antimalariamiddel.* ATC-nr.: P01B B51
- TABLETTER, filmdrasjerte 250 mg/100 mg:** Hver tablett inneh.: Atovakvon 250 mg, proguanilhydroklorid 100 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult, rødt og svart jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).  
**Indikasjoner:** Profylakse mot malaria forårsaket av Plasmodium falciparum. Behandling av akutt, ukomplisert malaria forårsaket av P. falciparum. Siden legemidlet har effekt mot både legemiddel-følsomme og legemiddelresistente stammer av P. falciparum, anbefales det spesielt som profylakse og til behandling av malaria forårsaket av P. falciparum i områder der patogenet kan være resistent overfor andre antimalarialegemidler. Offisielle retningslinjer og lokal informasjon om prevalens av

resistens overfor antimalariamidler bør tas med i vurderingen. Offisielle retningslinjer vil normalt inkludere retningslinjer fra WHO og nasjonale helsemyndigheter.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tablettene bør tas sammen med mat eller melkeholdig drikke og til samme tid hver dag. Ved oppkast den første timen etter inntak, bør ny dose tas.

**Pakninger og priser:** 12 stk. (blister) kr 324,80 (trinnspris: kr 158,90).

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Malarone «GlaxoSmithKline»

## Quetiapin Sandoz «Sandoz»

C *Antipsykotikum.* ATC-nr.: N05A H04

T **TABLETTER, filmdrasjerte 25 mg, 100 mg, 200 mg og 300 mg:** Hver tablett inneh.: Kvetiapinfumarat tilsv. kvetiapin 25 mg, resp. 100 mg, 200 mg og 300 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: 25 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 100 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 200 mg og 300 mg: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Behandling av schizofreni. Behandling av bipolar lidelse. Behandling av moderate til alvorlige maniske episoder ved bipolar lidelse. Behandling av alvorlige depressive episoder ved bipolar lidelse. Forebygging av tilbakefall av maniske eller depressive episoder hos pasienter med bipolar lidelse, som tidligere har respondert på behandling med kvetiapin.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Svelges med et glass vann. Bør helst tas på samme tidspunkt hver dag. Kan tas med eller uten mat, men samtidig inntak av grapefrukt/grapefruktjuice skal unngås. *Tabletter 100 mg:* Kan deles i like doser (delestrek). *Tabletter 200 mg:* Kan deles i like doser (delestrek). *Tabletter 300 mg:* Kan deles i like doser (delestrek).

**Pakninger og priser:** **25 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 334,70 (trinnspris: kr 195,20). 120 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 394,40 (trinnspris: kr 227,00). **100 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 628,90 (trinnspris: kr 407,00). **200 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 885,10 (trinnspris: kr 613,20). **300 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1141,20 (trinnspris: kr 840,20).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N05A H04\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Seroquel «AstraZeneca»

## Quetiapine Accord «Accord»

C *Antipsykotikum.* ATC-nr.: N05A H04

T **DEPOTTABLETTER, filmdrasjerte 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg og 400 mg:** Hver depottablett inneh.: Kvetiapinfumarat tilsv. kvetiapin 50 mg, resp. 150 mg, 200 mg, 300 mg og 400 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: 50 mg: Rødt og gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 150 mg: Titandioksid (E 171). 200 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 300 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 400 mg: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Behandling av schizofreni. Behandling av bipolar lidelse: Moderate til alvorlige maniske episoder ved bipolar lidelse. Depressive episoder ved bipolar lidelse. Forebygging av tilbakefall hos pasienter med bipolar lidelse der manisk eller depressiv episode har respondert på behandling med kvetiapin. Tilleggsbehandling av depressive episoder hos pasienter med unipolar depresjon («Major Depressive Disorder», MDD) som har hatt suboptimal respons på antidepressiv monoterapi. Før behandling bør legen vurdere mulig risiko og nytte ved kvetiapinbehandling.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas uten mat. Skal svelges hele. Skal ikke tygges. Skal ikke deles eller knuses.

**Pakninger og priser:** **50 mg:** 10 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 130,30 (trinnspris: kr 57,60). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 568,30 (trinnspris: kr 250,20). **150 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 863,20 (trinnspris: kr 240,00). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 905,20 (trinnspris: kr 438,40). **200 mg:** 60 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 557,60 (trinnspris: kr 277,60). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 905,20 (trinnspris: kr 438,40). **300 mg:** 10 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 311,90 (trinnspris: kr 117,10). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 998,20 (trinnspris: kr 504,80). **400 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1302,10 (trinnspris: kr 696,40).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N05A H04\_2 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Seroquel Depot «AstraZeneca»

## Quetiapine Teva «Teva»



C *Antipsykotikum.* ATC-nr.: N05A H04

T **TABLETTER, filmdrasjerte 25 mg, 100 mg, 200 mg og 300 mg:** Hver tablett inneh.: Kvetiapininfumarat tilsv. kvetiapin 25 mg, resp. 100 mg, 200 mg og 300 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 25 mg og 100 mg: Paraoransje (E 110).

**Indikasjoner:** Behandling av schizofreni. Behandling av moderate til alvorlige maniske episoder ved bipolar lidelse. Behandling av depressive episoder ved bipolar lidelse. Forebygging av tilbakefall av maniske eller depressive episoder hos pasienter med bipolar lidelse som tidligere har respondert på behandling med kvetiapin.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat, men grapefrukt/grapefruktjuice skal unngås. Svelges hele med et glass vann.

**Pakninger og priser:** **25 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 334,70 (trinnspris: kr 195,20). **100 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 628,90 (trinnspris: kr 407,00). **200 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 885,10 (trinnspris: kr 613,20). **300 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1141,20 (trinnspris: kr 840,20).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N05A H04\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Seroquel «AstraZeneca»

## Ramipril «Actavis»

C *ACE-hemmer.* ATC-nr.: C09A A05

T **TABLETTER 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg og 10 mg:** Hver tablett inneh.: Ramipril 1,25 mg, resp. 2,5 mg, 5 mg og 10 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: 2,5 mg: Gult jernoksid (E 172). 5 mg: Gult jernoksid (E 172), rødt jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** Behandling av hypertensjon. Reduksjon av kardiovaskulær mortalitet og morbiditet hos høyrisikopasienter med: Manifest aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom (tidligere diagnostisert koronar hjertesykdom eller slag, eller perifer vaskulær sykdom) eller diabetes med tillegg av minst én kardiovaskulær risikofaktor. Behandling av nyresykdom: Begynnende glomerulær diabetisk nefropati definert ved tilstedeværelse av mikroalbuminuri, manifest glomerulær diabetisk nefropati definert ved tilstedeværelse av makroproteinuri hos pasienter med minst én kardiovaskulær risikofaktor, manifest glomerulær ikke-diabetisk nefropati definert ved tilstedeværelse av makroproteinuri >3 g/dag. Behandling av symptomatisk hjertesvikt. Sekundærprofylakse etter akutt hjerteinfarkt: Reduksjon av mortalitet under den akutte fasen av hjerteinfarkt hos pasienter med kliniske symptomer på hjertesvikt med oppstart >48 timer etter akutt hjerteinfarkt.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør tas til samme tid hver dag. Tas med eller uten mat. Svelges med væske. **Tabletter 2,5 mg, 5 mg og 10 mg:** Kan deles (delestrek).

**Pakninger og priser:** **1,25 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 111,90 (trinnspris: kr 111,90). **2,5 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 62,00 (trinnspris: kr 62,00). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 111,90 (trinnspris: kr 111,90). **5 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 72,40 (trinnspris: kr 72,40). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 123,50 (trinnspris: kr 123,50). **10 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 182,40 (trinnspris: kr 182,40).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C09A A05\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Triatec «sanofi-aventis»

## Ramipril HEXAL «HEXAL»

C *ACE-hemmer.* ATC-nr.: C09A A05

T **TABLETTER 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg og 10 mg:** Hver tablett inneh.: Ramipril 1,25 mg, resp. 2,5 mg, 5 mg og 10 mg, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** **Hypertensjon. Kardiovaskulær profylakse:** Reduksjon av kardiovaskulær morbiditet og mortalitet hos pasienter med: Manifest aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom (tidligere diagnostisert koronar hjertesykdom eller slag, eller perifer vaskulær sykdom) eller diabetes med tillegg av minst én kardiovaskulær risikofaktor. **Behandling av nyresykdom:** Begynnende glomerulær diabetisk nefropati definert ved tilstedeværelse av mikroalbuminuri, manifest glomerulær diabetisk nefropati definert ved tilstedeværelse av makroproteinuri hos pasienter med minst én kardiovaskulær risikofaktor, manifest glomerulær ikke-diabetisk nefropati definert ved tilstedeværelse av makroproteinuri >3 g/dag. **Behandling av symptomatisk hjertesvikt. Sekundærprofylakse etter akutt hjerteinfarkt:** Reduksjon av mortalitet under den akutte fasen av hjerteinfarkt hos pasienter med kliniske symptomer på hjertesvikt med oppstart >48 timer etter akutt hjerteinfarkt.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas til samme tid hver dag. Tas med eller uten mat. Svelges hele med væske. Skal ikke tygges eller knuses. **Tabletter 1,25 mg:** Har delestrek, men den er kun for å lette deling slik at svelging blir enklere, og ikke for å dele den i like doser. **Tabletter 2,5 mg:**

Kan deles i 2 like doser (delestrek). *Tabletter 5 mg*: Kan deles i 2 like doser (delestrek). *Tabletter 10 mg*: Kan deles i 2 like doser (delestrek).

**Pakninger og priser:** **1,25 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 64,70 (trinnspris: kr 59,50). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 111,90 (trinnspris: kr 111,90). 100 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 111,90 (trinnspris: kr 111,90). **2,5 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 62,00 (trinnspris: kr 62,00). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 111,90 (trinnspris: kr 111,90). 100 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 111,90 (trinnspris: kr 111,90). **5 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 72,40 (trinnspris: kr 72,40). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 123,50 (trinnspris: kr 123,50). 100 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 123,50 (trinnspris: kr 123,50). **10 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 182,40 (trinnspris: kr 182,40).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C09A A05\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Triatec «sanofi-aventis»

## Rasagilin Accord «Accord»

**C MAO-B-hemmer.** ATC-nr.: N04B D02

**T TABLETTER 1 mg:** *Hver tablett inneholder:* Rasagilintartrat tilsv. rasagilin 1 mg, hjelpestoffer.  
**Indikasjoner:** Behandling av idiopatisk Parkinsons sykdom som monoterapi (uten levodopa) eller som tilleggshandling (med levodopa) hos pasienter med doseavhengige fluktasjoner.  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat.  
**Pakninger og priser:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 944,00 (trinnspris: kr 408,40). 112 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 3667,20 (trinnspris: kr 1525,00).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N04B D02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Azilect «Teva»

## Rasagiline Mylan «Mylan S.A.S.»

**C MAO-B-hemmer.** ATC-nr.: N04B D02

**T TABLETTER 1 mg:** *Hver tablett inneholder:* Rasagilintartrat tilsv. rasagilin 1 mg, hjelpestoffer.  
**Indikasjoner:** Behandling av idiopatisk Parkinsons sykdom (PD) som monoterapi (uten levodopa) eller som tilleggshandling (med levodopa) hos pasienter med doseavhengige fluktasjoner.  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas med mat eller uten mat.  
**Pakninger og priser:** 112 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 3667,20 (trinnspris: kr 1525,00).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N04B D02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Azilect «Teva»

## Repaglinide Accord «Accord»

**C Korttidsvirkende antidiabetikum.** ATC-nr.: A10B X02

**TABLETTER 0,5 mg, 1 mg og 2 mg:** *Hver tablett inneholder:* Repaglinid 0,5 mg, resp. 1 mg og 2 mg. Fargestoff: 1 mg: Gult jernoksid (E 172). 2 mg: Rødt jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** Repaglinid er indisert hos voksne med diabetes mellitus type 2 der hyperglykemi ikke lenger kan kontrolleres tilfredsstillende ved kostregulering, vektreduksjon og fysisk aktivitet. Repaglinid er også indisert i kombinasjon med metformin hos voksne med diabetes mellitus type 2 der tilstanden ikke kan kontrolleres tilfredsstillende med metformin alene. Behandlingen bør igangsettes som et tillegg til kostregulering og fysisk aktivitet, for å senke blodglukosenivået i forbindelse med måltider.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas vanligvis innen 15 minutter før hovedmåltidene, men tidspunktet kan varieres fra rett før til opptil 30 minutter før måltidet (dvs. preprandialt 2, 3 eller 4 måltider pr. dag). Ved ekstra eller utelatt måltid bør pasienten hhv. legge til eller utelate en dose.

**Pakninger og priser:** **0,5 mg:** 30 stk. (blister) kr 95,50. 120 stk. (blister) kr 244,00. **1 mg:** 120 stk. (blister) kr 246,30. **2 mg:** 120 stk. (blister) kr 248,00.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

NovoNorm «Novo Nordisk»

## Riluzol «Actavis»

C *Middel mot amyotrofisk lateralsklerose (ALS).* ATC-nr.: N07X X02

**TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg:** Hver tablett inneh.: Riluzol 50 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Indisert for å forlenge livet eller tiden til assistert ventilasjon hos pasienter med amyotrofisk lateralsklerose (ALS). Studier har vist at riluzol forlenger overlevelsen hos pasienter med ALS. Overlevelse er definert som pasienter som er i live, ikke intubert for assistert ventilasjon og uten trakeostomi. Det er ingen holdepunkter for at riluzol har effekt på motoriske funksjoner, lungefunksjon, fascikulasjoner, muskelstyrke eller motoriske symptomer. Riluzol har ikke vist effekt ved langt fremskredet ALS. Effekt og sikkerhet av riluzol er kun studert hos pasienter med ALS. Riluzol skal derfor ikke brukes av pasienter med andre typer motornevro sykdommer.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas hver 12. time, til samme tid hver dag (f.eks. morgen og kveld).

**Pakninger og priser:** 56 stk. (blister) kr 2110,20 (trinnspris: kr 1257,00).

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Rilutek «Aventis Pharma»

## Risperidon Sandoz «Sandoz»

C *Antipsykotikum.* ATC-nr.: N05A X08

T **TABLETTER, filmdrasjerte 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg og 4 mg:** Hver tablett inneh.: Risperidon 0,5 mg, resp. 1 mg, 2 mg, 3 mg og 4 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Titandioksid (E 171). 0,5 mg og 2 mg: Rødt jernoksid (E 172). 2 mg: Gult jernoksid (E 172). 3 mg og 4 mg: Kinolingult (E 104). 4 mg: Indigotin (E 132).

**Indikasjoner:** 0,5 mg: Behandling av alvorlige atferdsforstyrrelser assosiert med aggresjon, impulsivitet og selvskading diagnostisert iht. DSM-IV-kriterier hos barn ( $\geq 5$  år), ungdom og voksne med mental retardasjon. Det anbefales at preparatet forskrives av spesialister på barnenevrologi og barne- og ungdomspsykiatri eller av leger som har erfaring med behandling av atferdsforstyrrelser hos barn og ungdom, og forstyrrelser hos pasienter med mental retardasjon. 1 mg, 2 mg, 3 mg og 4 mg: Akutte og kronisk schizofrene psykoser og psykotiske tilstander. Langtidsbehandling for å forebygge tilbakefall ved kronisk schizofreni. Moderat til alvorlig mani hos pasienter med bipolar lidelse. Preparatet har ikke vist seg å forebygge tilbakevendende maniske og depressive episoder.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Svelges med et glass vann. Kan deles (delestrek).

**Pakninger og priser:** 0,5 mg: 20 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 64,70 (trinnspris: kr 64,70). 1 mg: 20 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 80,60 (trinnspris: kr 80,60). 60 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 116,40 (trinnspris: kr 116,40). 2 mg: 60 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 179,80 (trinnspris: kr 179,80). 3 mg: 60 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 260,00 (trinnspris: kr 260,00). 4 mg: 60 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 323,40 (trinnspris: kr 323,40).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N05A X08\_2 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Risperdal «Janssen»

## Ritonavir Accord «Accord»

C *Antiviralt middel, proteasehemmer.* ATC-nr.: J05A E03

H **TABLETTER, filmdrasjerte 100 mg:** Hver tablett inneh.: Ritonavir 100 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Behandling av hiv-1-infeksjon hos voksne og barn  $\geq 2$  år, i kombinasjon med anti-retrovirale midler.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Skal tas sammen med mat. Skal svelges hele. Skal ikke tygges. Skal ikke deles eller knuses.

**Pakninger og priser:** 30 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 379,20.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>H-resept: J05A E03\_1 Ritonavir

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Norvir «AbbVie»

## Rivastigmin Orion «Orion»

C *Acetylkolinesterasehemmer.* ATC-nr.: N06D A03

T **KAPSLER, harde 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg og 6 mg:** Hver kapsel inneh.: Rivastigminhydrogentartrat tilsv. rivastigmin 1,5 mg, resp. 3 mg, 4,5 mg og 6 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 3 mg, 4,5 mg og 6 mg: Rødt jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** Symptomatisk behandling av Alzheimers demens av mild til moderat alvorlig grad. Symptomatisk behandling av demens av mild til moderat alvorlig grad hos pasienter med idiopatisk Parkinsons sykdom.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas 2 ganger daglig sammen med frokost og kveldsmat. Svelges hele.

**Pakninger og priser:** **1,5 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 270,70 (trinnpris: kr 198,40). **3 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 303,10 (trinnpris: kr 214,60). **4,5 mg:** 56 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 510,90 (trinnpris: kr 374,30). **6 mg:** 56 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 514,20 (trinnpris: kr 377,10).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N06D A03\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Exelon «Novartis»

## Ropinirol Krka «KRKA»

C *Antiparkinsonmiddel.* ATC-nr.: N04B C04

T **DEPOTTABLETTER, filmdrasjerte 2 mg, 4 mg og 8 mg:** Hver depottablett inneh.: Ropinirolhydroklorid tilsv. ropinirol 2 mg, resp. 4 mg og 8 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 2 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 4 mg og 8 mg: Gult, rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Behandling av Parkinsons sykdom under følgende betingelser: Oppstartsbehandling som monoterapi, med hensikt å utsette behandling med levodopa. I kombinasjon med levodopa etter hvert som sykdommen utvikler seg, når effekten av levodopa blir mindre eller inkonsekvent og det oppstår fluktuasjoner i den terapeutiske virkningen («slutt på dose»- eller «on-off»-fluktuasjoner).

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas 1 gang daglig. Bør tas på samme tidspunkt hver dag. Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses eller deles.

**Pakninger og priser:** **2 mg:** 84 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 470,30 (trinnpris: kr 424,70). **4 mg:** 84 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 720,80 (trinnpris: kr 720,80). **8 mg:** 84 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1164,20 (trinnpris: kr 1164,20).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N04B C04\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Requip Depot «GlaxoSmithKline»

## Rosuvastatin Sandoz «Sandoz»

C *HMG-CoA-reduktasehemmer.* ATC-nr.: C10A A07

T **TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg, 10 mg, 20 mg og 40 mg:** Hver tablett inneh.: Rosuvastatin-kalsium tilsv. rosuvastatin 5 mg, resp. 10 mg, 20 mg og 40 mg, vannfri laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), gult og rødt jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** Voksne, ungdom og barn >6 år med primær hyperkolesterolemi (type IIa, inkl. heterozygot familiær hyperkolesterolemi) eller kombinert dyslipidemi (type IIb) som tillegg til diett når effekten av diett og annen ikke-medikamentell behandling (f.eks. trening, vektreduksjon) ikke er tilstrekkelig. Homozygot familiær hyperkolesterolemi, som et tillegg til diett og annen lipidsenkende behandling (f.eks. LDL-aferease) eller hvis slik behandling ikke er aktuell. Profylakse mot alvorlige kardiovaskulære hendelser hos pasienter som antas å ha høy risiko for en første kardiovaskulær hendelse, som supplement til korreksjon av andre risikofaktorer.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas når som helst på dagen. Tas med eller uten mat. Svelges hele med et glass vann.

**Pakninger og priser:** **5 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 131,30 (trinnpris: kr 99,80). **10 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 131,30 (trinnpris: kr 108,90). **20 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 353,00 (trinnpris: kr 278,50). **40 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 160,40 (trinnpris: kr 145,60). **100 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 450,00 (trinnpris: kr 400,70). **40 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 657,30 (trinnpris: kr 553,20).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C10A A07\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Crestor «AstraZeneca»

## Salmeterol/Fluticasone Cipla «Cipla»

C *Adrenergikum + kortikosteroid.* ATC-nr.: R03A K06

T INHALASJONSAEROSOL, suspensjon 25 µg/125 µg og 25 µg/250 µg: Hver dose inneh.: Salmeterolxinafoat tilsv. salmeterol 25 µg, flutikasonpropionat 125 µg, resp. 250 µg, norfluran (HFA 134a).

**Indikasjoner:** Standard behandling av astma der et kombinasjonspreparat (langtidsvirkende β<sub>2</sub>-agonist og inhalert kortikosteroid) er hensiktsmessig til pasienter som ikke er tilstrekkelig kontrollert med inhalerte kortikosteroider og inhalerte korttidsvirkende β<sub>2</sub>-agonister etter behov, eller til pasienter som allerede er tilstrekkelig kontrollert med både inhalerte kortikosteroider og langtidsvirkende β<sub>2</sub>-agonist.

**Pakninger og priser:** 25 µg/125 µg: 120 doser<sup>1</sup> kr 333,40 (trinnpris: kr 240,50). 25 µg/250 µg: 120 doser<sup>1</sup> kr 394,40 (trinnpris: kr 308,40).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se R03A K06\_2 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Seretide «GlaxoSmithKline»

## Salmex «Glenmark»

C *Adrenergikum + kortikosteroid.* ATC-nr.: R03A K06

T INHALASJONSPULVER 50 µg/100 µg, 50 µg/250 µg og 50 µg/500 µg: Hver dose inneh.: Salmeterolxinafoat tilsv. salmeterol 50 µg, flutikasonpropionat 100 µg, resp. 250 µg og 500 µg, laktose.

**Indikasjoner:** *Astma:* Regelmessig behandling av astma når bruk av et kombinasjonspreparat (langtidsvirkende β<sub>2</sub>-agonist og inhalert kortikosteroid) er egnet. Når tilstrekkelig kontroll ikke oppnås med inhalerte kortikosteroider og inhalert, korttidsvirkende β<sub>2</sub>-agonist ved behov, eller når tilstrekkelig god kontroll allerede er oppnådd med både inhalert kortikosteroid og langtidsvirkende β<sub>2</sub>-agonist. Merk: Styrken 50 µg/100 µg er ikke egnet til bruk hos voksne og barn med alvorlig astma. *Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols):* Symptomatisk behandling av pasienter med kols med en FEV<sub>1</sub> predikert normalverdi <60% (før bronkodilatator) og gjentatte eksaserbasjoner, som har betydelige symptomer til tross for regelmessig behandling med bronkodilatator.

**Pakninger og priser:** 50 µg/100 µg: 60 doser<sup>2</sup> kr 273,50 (trinnpris: kr 169,60). 3 × 60 doser<sup>2</sup> kr 748,00 (trinnpris: kr 436,30). 50 µg/250 µg: 60 doser<sup>2</sup> kr 273,50 (trinnpris: kr 236,40). 3 × 60 doser<sup>2</sup> kr 748,00 (trinnpris: kr 636,80). 50 µg/500 µg: 60 doser<sup>1</sup> kr 428,50 (trinnpris: kr 294,10). 3 × 60 doser<sup>1</sup> kr 1213,00 (trinnpris: kr 809,70).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se R03A K06\_1 i Refusjonslisten.

<sup>2</sup>Se R03A K06\_2 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Seretide «GlaxoSmithKline»

## Serkep «Mylan»

C *Adrenergikum + kortikosteroid.* ATC-nr.: R03A K06

T INHALASJONSAEROSOL, suspensjon 25 µg/125 µg og 25 µg/250 µg: Hver dose inneh.: Salmeterolxinafoat tilsv. salmeterol 25 µg, flutikasonpropionat 125 µg, resp. 250 µg, etanol, norfluran (HFA 134a).

**Indikasjoner:** Vedlikeholdsbehandling av astma når bruk av et kombinasjonspreparat (langtidsvirkende β<sub>2</sub>-agonist og inhalert glukokortikoid) er egnet. Til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig kontroll med inhalerte glukokortikoider og inhalert, korttidsvirkende β<sub>2</sub>-agonist ved behov, eller til pasienter som allerede har oppnådd tilstrekkelig kontroll med både inhalert glukokortikoid og langtidsvirkende β<sub>2</sub>-agonist. Kun til voksne ≥18 år.

**Pakninger og priser:** 25 µg/125 µg: 120 doser<sup>1</sup> kr 333,40 (trinnpris: kr 240,60). 25 µg/250 µg: 120 doser<sup>1</sup> kr 394,40 (trinnpris: kr 308,40).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se R03A K06\_2 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Seretide «GlaxoSmithKline»

## Sertralin Bluefish «Bluefish»

- C *Antidepressiv.* ATC-nr.: N06A B06
- T **TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg og 100 mg:** Hver tablett inneh.: Sertralinhydroklorid tilsv. sertralin 50 mg, resp. 100 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).  
**Indikasjoner:** Depressive episoder. Forebygging av tilbakefall av nye depressive episoder. Panikk lidelse, med eller uten agorafobi. Tvangslidelse (OCD) hos voksne samt barn og ungdom 6-17 år. Sosial angstlidelse. Posttraumatisk stresslidelse (PTSD).  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas som 1 dose daglig, morgen eller kveld. Kan tas med eller uten mat. **Tabletter 50 mg:** Kan deles for å lette svelging (delestrek).  
**Pakninger og priser:** **50 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 124,10 (trinnpris: kr 84,90). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 329,00 (trinnpris: kr 197,60). **100 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 621,70 (trinnpris: kr 311,50).  
**Refusjon:**  
<sup>1</sup>Se N06A B06\_1 i Refusjonslisten.

### Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Zolof «Pfizer»

## Sertralin HEXAL «HEXAL»

- C *Antidepressiv, SSRI.* ATC-nr.: N06A B06
- T **TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg og 100 mg:** Hver tablett inneh.: Sertralin (som hydroklorid) 50 mg, resp. 100 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).  
**Indikasjoner:** Depressive episoder. Forebygging av tilbakefall av nye depressive episoder. Panikk lidelse, med eller uten agorafobi. Tvangslidelse (OCD) hos voksne samt barn og ungdom i alderen 6-17 år. Sosial angstlidelse. Posttraumatisk stresslidelse (PTSD).  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Dosen skal tas 1 gang daglig, enten morgen eller kveld. Kan tas med eller uten mat. Kan deles i 2 like doser (delestrek).  
**Pakninger og priser:** **50 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 124,10 (trinnpris: kr 84,90). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 329,00 (trinnpris: kr 197,60). 250 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 768,00 (trinnpris: kr 438,50). **100 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 621,70 (trinnpris: kr 311,50). 250 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 1499,80 (trinnpris: kr 734,00).  
**Refusjon:**  
<sup>1</sup>Se N06A B06\_1 i Refusjonslisten.

### Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Zolof «Pfizer»

## Sertraline Accord «Accord»

- C *Antidepressiv, SSRI.* ATC-nr.: N06A B06
- T **TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg og 100 mg:** Hver tablett inneh.: Sertralinhydroklorid tilsv. sertralin 50 mg, resp. 100 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).  
**Indikasjoner:** Depressive episoder. Forebygging av tilbakefall av nye depressive episoder. Panikk lidelse, med eller uten agorafobi. Tvangslidelse (OCD) hos voksne samt barn og ungdom (6-17 år). Sosial angstlidelse. Posttraumatisk stresslidelse (PTSD).  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** 1 dose daglig, morgen eller kveld. Tas med eller uten mat. **Tabletter 50 mg:** Kan deles i 2 like doser (delestrek).  
**Pakninger og priser:** **50 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 124,10 (trinnpris: kr 84,90). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 329,00 (trinnpris: kr 197,60). **100 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 621,70 (trinnpris: kr 311,50).  
**Refusjon:**  
<sup>1</sup>Se N06A B06\_1 i Refusjonslisten.

### Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Zolof «Pfizer»

## Sevelamer Mylan «Mylan»

- C *Middel mot hyperfosfatemi.* ATC-nr.: V03A E02
- T **TABLETTER, filmdrasjerte 800 mg:** Hver tablett inneh.: Sevelamerkarbonat 800 mg, laktose 286,25 mg, hjelpestoffer.  
**Indikasjoner:** Behandling av hyperfosfatemi hos voksne som får hemodialyse eller peritoneal dialyse. Behandling av hyperfosfatemi hos voksne med kronisk nyresykdom som ikke får dialyse og med serumfosfor  $\geq 1,78$  mmol/liter. Preparatet bør brukes som én av flere behandlingsmetoder, som

kan inkludere kalsiumtilskudd, 1,25-dihydroksey-vitamin D<sub>3</sub> eller en av dets analoger, for å kontrollere utviklingen av bensykdommer forårsaket av nedsatt nyrefunksjon.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Skal tas 3 ganger daglig, med mat. Foreskrevet diett skal overholdes. Skal svelges hele. Skal ikke tygges. Skal ikke deles eller knuses.

**Pakninger og priser:** 180 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 1235,00 (trinnspris: kr 784,20).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se V03A E02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Renvela «Genzyme»

## Sevelamer Sandoz «Sandoz»

**C** *Middel mot hyperfosfatemi.* ATC-nr.: V03A E02

**T** **TABLETTER, filmdrasjerte 800 mg:** Hver tablett inneholder: Sevelamerkarbonat 800 mg, laktosemonohydrat 286,25 mg, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** Behandling av hyperfosfatemi hos voksne pasienter som får hemodialyse eller peritonealdialyse. Behandling av hyperfosfatemi hos voksne pasienter med kronisk nyresykdom som ikke får dialyse, med serumfosfat  $\geq 1,78$  mmol/liter. Bør brukes som én av flere behandlingsmetoder, som kan omfatte kalsiumtilskudd, 1,25-dihydroksey-vitamin D<sub>3</sub> eller en analog, for å kontrollere utviklingen av bensykdommer forårsaket av svekket nyrefunksjon.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Skal tas 3 ganger daglig til mat. Foreskrevet diett skal overholdes. Skal svelges hele. Skal ikke tygges. Skal ikke deles eller knuses.

**Pakninger og priser:** 180 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 1235,00 (trinnspris: kr 784,20).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se V03A E02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Renvela «Genzyme»

## Sildenafil «Actavis»

**C** *Middel mot erektil dysfunksjon.* ATC-nr.: G04B E03

**TABLETTER, filmdrasjerte 25 mg, 50 mg og 100 mg:** Hver tablett inneholder: Sildenafilsitrat tilsv. sildenafil 25 mg, resp. 50 mg og 100 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigokarminaluminiumslakk (E 132), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Indisert til voksne menn med erektil dysfunksjon, som er manglende evne til å få eller beholde en ereksjon som er tilstrekkelig for tilfredsstillende seksuell aktivitet. For at sildenafil skal ha effekt kreves seksuell stimulering.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas med eller uten mat. Samtidig matinntak kan forsinke effekten. Svelges hele med et glass vann.

**Pakninger og priser:** **25 mg:** 4 stk. (blister) kr 265,70 (trinnspris: kr 111,30). 12 stk. (blister) kr 724,50 (trinnspris: kr 261,30). **50 mg:** 4 stk. (blister) kr 318,10 (trinnspris: kr 130,20). 12 stk. (blister) kr 881,80 (trinnspris: kr 318,10). **100 mg:** 4 stk. (blister) kr 368,00 (trinnspris: kr 146,90). 12 stk. (blister) kr 983,50 (trinnspris: kr 344,60).

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Viagra «Pfizer»

## Simplex «Actavis»

**F** *Smørende øyesalve.* ATC-nr.: S01X A20

**T** **ØYESALVE:** 1 g inneholder: Flytende parafin 0,2 g, vaselin 0,8 g.

**Indikasjoner:** Sårt eller tørt øye. Lagofthalmus.

**Dosering:** Litt salve smøres på øyelokkranden og øyelokket, eller appliseres i øyet.

**Forsiktighetsregler:** Preparatet antas normalt ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner, men pasienten bør imidlertid informeres om å utvise forsiktighet dersom synet er svært tilsløret.

**Graviditet, amming og fertilitet:** Kan brukes under graviditet og amming.

**Egenskaper:** **Klassifisering:** Nøytral smørende øyesalve. **Virkningsmekanisme:** Beskytter hornhinnen mot uttørring.

**Oppbevaring og holdbarhet:** Oppbevares ved høyst 25°C. Åpnet tube bør ikke brukes lenger enn 4 uker pga. fare for mikrobiologisk kontaminasjon.

**Pakninger og priser:** 5 ml<sup>1</sup> (tube) kr \*.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se S01X A20\_1 i Refusjonslisten.

## Simvastatin Bluefish «Bluefish»

**C Serumkolesterolsenkende middel.** ATC-nr.: C10A A01

**T TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg, 20 mg, 40 mg og 80 mg:** Hver tablett inneh.: Simvastatin 10 mg, 20 mg, 40 mg, resp. 80 mg, laktose, butylhydroksyanisol (E 320), hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** *Hyperkolesterolemi:* Behandling av primær hyperkolesterolemi eller blandet dyslipidemi, som tillegg til diett, når respons på diett og andre ikke-farmakologiske tiltak (f.eks. fysisk trening og vektreduksjon) ikke er tilstrekkelig. Behandling av homozygot familiær hyperkolesterolemi (HoFH) som tillegg til diett og annen lipidsenkende behandling (f.eks. LDL-aferease) eller hvis slik behandling ikke er egnet. *Kardiovaskulær profylakse:* Reduksjon av kardiovaskulær mortalitet eller morbiditet hos pasienter med manifest aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom eller diabetes mellitus, med enten normalt eller forhøyet kolesterolnivå, som et tillegg til korreksjon av andre risikofaktorer og annen hjertebeskyttende behandling.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Dosen skal tas om kvelden. Kan tas med eller uten mat. Skal svelges med vann. Grapefruktjuice skal unngås.

**Pakninger og priser:** **10 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 116,40 (trinnpris: kr 66,80). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 303,40 (trinnpris: kr 65,20). **20 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 132,70 (trinnpris: kr 81,70). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 357,90 (trinnpris: kr 80,70). **40 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 191,90 (trinnpris: kr 95,10). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 554,90 (trinnpris: kr 95,50). **80 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 979,90 (trinnpris: kr 103,70).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C10A A01\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Zocor «MSD»

## Simvastatin HEXAL «HEXAL»

**C Serumkolesterolsenkende middel.** ATC-nr.: C10A A01

**T TABLETTER, filmdrasjerte 80 mg:** Hver tablett inneh.: Simvastatin 80 mg, laktosemonohydrat 561,8 mg, butylhydroksyanisol (E 320), hjelpestoffer. Fargestoff: Indigotin (E 132), kinolingult (E 104), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** *Hyperkolesterolemi:* Behandling av primær hyperkolesterolemi eller kombinert hyperlipidemi, som tillegg til diett, når det ikke oppnås tilstrekkelig effekt ved kosthold og annen ikke-farmakologisk behandling (f.eks. trening, vektreduksjon). Behandling av homozygot familiær hyperkolesterolemi som tillegg til diett og annen lipidsenkende behandling (f.eks. LDL-aferease) eller hvis slik behandling er uegnet. *Kardiovaskulær profylakse:* Reduksjon av kardiovaskulær mortalitet og morbiditet hos pasienter med manifest aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom eller diabetes mellitus, med enten normalt eller forhøyet kolesterolnivå, som tillegg til korreksjon av andre risikofaktorer og annen kardioprotektiv behandling.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Svelges med tilstrekkelig væske (et glass vann) om kvelden. Kan tas med eller uten mat, men samtidig inntak av grapefrukt/grapefruktjuice skal unngås. Kan deles i 2 like store doser (delestrek).

**Pakninger og priser:** 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 979,90 (trinnpris: kr 103,70).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C10A A01\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Zocor «MSD»

## Simvastatin Sandoz «Sandoz»

**C Serumkolesterolsenkende middel.** ATC-nr.: C10A A01

**T TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg, 20 mg og 40 mg:** Hver tablett inneh.: Simvastatin 10 mg, resp. 20 mg og 40 mg, laktose, butylhydroksyanisol (E 320), hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Titandioksid (E 171). 10 mg og 20 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172). 40 mg: Rødt jernoksid (E 172).



**Indikasjoner:** *Hyperkolesterolemi:* Behandling av primær hyperkolesterolemi eller kombinert hyperlipidemi, som tillegg til diett, når det ikke oppnås tilstrekkelig effekt ved kosthold og annen ikke-farmakologisk behandling (f.eks. trening, vektreduksjon). Behandling av homozygot familiær hyperkolesterolemi (HoFH) som tillegg til diett og annen lipidsenkende behandling (f.eks. LDL-aføring) eller hvis slik behandling er uegnet. *Kardiovaskulær profylakse:* Reduksjon av kardiovaskulær mortalitet og morbiditet hos pasienter med manifest aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom eller diabetes mellitus, med enten normalt eller forhøyet kolesterolnivå, som tillegg til korreksjon av andre risikofaktorer og annen kardioprotektiv behandling.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Svelges med tilstrekkelig væske (et glass vann) om kvelden. Kan tas med eller uten mat, men samtidig inntak av grapefrukt/grapefruktjuice skal unngås. Kan deles i 2 like store doser (delestrek).

**Pakninger og priser:** **10 mg:** 90 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 276,70 (trinnpris: kr 62,30). **20 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (bliste) kr 132,70 (trinnpris: kr 81,70). 90 stk.<sup>1</sup> (bliste) kr 325,70 (trinnpris: kr 76,20). **40 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (bliste) kr 191,90 (trinnpris: kr 95,10). 90 stk.<sup>1</sup> (bliste) kr 503,10 (trinnpris: kr 89,60).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C10A A01\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Zocor «MSD»

## Solifenacin Accord «Accord»

C *Urologisk spasmolytikum.*

ATC-nr.: G04B D08

T **TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg og 10 mg:** Hver tablett inneh.: Solifenacinsuksinat 5 mg, resp. 10 mg tilsv. solifenacin 3,8 mg resp. 7,5 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: 5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 10 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Symptomatisk behandling av urgeinkontinens og/eller økt vannlatingsfrekvens og -trang som kan forekomme hos pasienter med overaktiv blære.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas med eller uten mat. Skal svelges hele med væske.

**Pakninger og priser:** **5 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (bliste) kr 299,00 (trinnpris: kr 144,80). 100 stk.<sup>1</sup> (bliste) kr 912,10 (trinnpris: kr 397,90). **10 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (bliste) kr 359,30 (trinnpris: kr 167,30). 100 stk.<sup>1</sup> (bliste) kr 1113,00 (trinnpris: kr 473,00).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se G04B D08\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Vesicare «Astellas»

## Solifenacin Krka «KRKA»

C *Urologisk spasmolytikum.*

ATC-nr.: G04B D08

T **TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg og 10 mg:** Hver tablett inneh.: Solifenacinsuksinat 5 mg, resp. 10 mg, tilsv. solifenacin 3,8 mg, resp. 7,5 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoffer: 5 mg: Titandioksid (E 171). 10 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Symptomatisk behandling av urgeinkontinens og/eller hyppig vannlating og økt vannlatingstrang som kan forekomme hos pasienter med overaktiv blære.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas med eller uten mat. Bør svelges hele med væske.

**Pakninger og priser:** **5 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (bliste) kr 299,00 (trinnpris: kr 144,80). 100 stk.<sup>1</sup> (bliste) kr 912,10 (trinnpris: kr 397,90). **10 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (bliste) kr 359,30 (trinnpris: kr 167,30). 100 stk.<sup>1</sup> (bliste) kr 1113,00 (trinnpris: kr 473,00).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se G04B D08\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Vesicare «Astellas»

## Solifenacin Mylan «Mylan»

C *Urologisk spasmolytikum.*

ATC-nr.: G04B D08

T **TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg og 10 mg:** Hver tablett inneh.: Solifenacinsuksinat 5 mg, resp. 10 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 10 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Symptomatisk behandling av urgeinkontinens og/eller økt vannlatingsfrekvens og vannlatingstrang som kan forekomme hos pasienter med overaktiv blære.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas med eller uten mat. Skal svelges hel med væske.

**Pakninger og priser:** **5 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 299,00 (trinnpris: kr 144,80). 90 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 824,50 (trinnpris: kr 361,80). **10 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 359,30 (trinnpris: kr 167,30). 90 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1005,30 (trinnpris: kr 429,30).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se G04B D08\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Vesicare «Astellas»

## Spirolactone Orion «Orion»

C **Aldosteronantagonist.**

ATC-nr.: C03D A01

T **TABLETTER 25 mg, 50 mg og 100 mg:** Hver tablett inneh.: Spirolakton 25 mg, resp. 50 mg og 100 mg, laktose 57 mg, resp. 114 mg og 228 mg, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** Kronisk hjertesvikt (NYHA klasse III-IV) i tillegg til standardbehandling. Ødemer forårsaket av nefrose hvor annen behandling av ødemer ikke har effekt og spesielt når det er mistanke om hyperaldosteronisme. Ascites og ødem assosiert med langtkommen levercirrhose eller portal hypertensjon eller andre leversykdommer hvor annen behandling av ødemer ikke har effekt og spesielt når det er mistanke om hyperaldosteronisme. Hypertensjon, som tilleggsbehandling hos pasienter som ikke har hatt tilstrekkelig respons på andre antihypertensiver. Primær hyperaldosteronisme.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør tas til samme tid hver dag. Kan gis som én enkelt dose eller deles opp i to like doser. Svelges med 1 glass vann eller annen væske. Skal tas med mat (gir bedre absorpsjon). Kan knuses/deles i 2 like deler (delestrek).

**Pakninger og priser:** **25 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 112,30. **50 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 193,00. **100 mg:** 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 385,10.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C03D A01\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Spirix «Takeda»

## Stayveer «Janssen»

C **Endotelinreseptorantagonist.**

ATC-nr.: C02K X01

H **TABLETTER, filmdrasjerte 62,5 mg og 125 mg:** Hver tablett inneh.: Bosentanmonohydrat tilsv. bosentan 62,5 mg, resp. 125 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksider (E 172) og titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Behandling av pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) for å forbedre treningskapasiteten og symptomer hos pasienter med WHO funksjonsklasse II og III. Effekt er vist ved primær (idiopatisk og arvelig) PAH, PAH sekundært til skleroderma uten signifikant interstitiell pulmonal lidelse og PAH forbundet med medfødte systemisk-til-pulmonal shunter og Eisenmenger fysiologi. Også indisert for reduksjon av antall nye digitale sår hos pasienter med systemisk sklerose og aktiv digitalsår lidelse.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Svelges med vann og tas morgen og kveld. Tas med eller uten mat.

**Pakninger og priser:** **62,5 mg:** 56 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 15310,20. **125 mg:** 56 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 15310,20.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>H-resept: C02K X01\_1 Bosentan

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Tracleer «Janssen»

## Sumatriptan Aurobindo «Aurobindo»

C **Migrenemiddel.**

ATC-nr.: N02C C01

T **TABLETTER 50 mg og 100 mg:** Hver tablett inneh.: Sumatriptansuksinat tilsv. sumatriptan 50 mg, resp. 100 mg, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** For akutt behandling av migreneanfall med eller uten aura. Bør kun brukes i tilfeller hvor det foreligger en klar migrenediagnose.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør svelges hele med vann.

**Pakninger og priser:** **50 mg:** 6 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 209,00 (trinnpris: kr 72,40). 12 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 381,80 (trinnpris: kr 112,70). **100 mg:** 6 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 262,20 (trinnpris: kr 105,30). 18 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 714,00 (trinnpris: kr 251,70).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N02C C01\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Imigran «GlaxoSmithKline»

## Sumatriptan Bluefish «Bluefish»

C *Migrenemiddel.* ATC-nr.: N02C C01

T **TABLETTER 50 mg og 100 mg:** Hver tablett inneh.: Sumatriptansuksinat tilsv. sumatriptan 50 mg, resp. 100 mg, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** Akutt behandling av migreneanfall med eller uten aura.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Skal svelges hele med vann. Skal ikke tygges eller knuses.

**Pakninger og priser:** **50 mg:** 6 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 209,00 (trinnpris: kr 72,40). 12 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 381,80 (trinnpris: kr 112,70). **100 mg:** 6 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 262,20 (trinnpris: kr 105,30). 18 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 714,00 (trinnpris: kr 251,70).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N02C C01\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Imigran «GlaxoSmithKline»

## Sumatriptan SUN «SUN Pharma»

C *Migrenemiddel.* ATC-nr.: N02C C01

T **INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 12 mg/ml: 1 ferdigfylt penn inneh.:** Sumatriptan 6 mg, natrium 1,3 mg, vann til injeksjonsvæsker.

**Indikasjoner:** Subkutan injeksjon er indisert for akutt behandling av migreneanfall med eller uten aura, og for akutt behandling av clusterhodepine. Skal kun brukes i de tilfeller det foreligger en sikker diagnose av migrene eller clusterhodepine.

**Pakninger og priser:** 2 × 0,5 ml<sup>1</sup> (ferdigfylt penn) kr 410,20 (trinnpris: kr 307,90). 6 × 0,5 ml<sup>1</sup> (ferdigfylt penn) kr 1158,30 (trinnpris: kr 886,20).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N02C C01\_2 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Imigran «GlaxoSmithKline»

## Tacni «Teva»

C *Immunsuppressivt middel.* ATC-nr.: L04A D02

T **KAPSLER, harde 0,5 mg, 1 mg og 5 mg:** Hver kapsel inneh.: Takrolimus 0,5 mg, resp. 1 mg og 5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 0,5 mg: Titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172). 1 mg: Titandioksid (E 171). 5 mg: Titandioksid (E 171), rødt jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** Profylakse mot avstøting av transplantat ved allogen lever-, nyre- eller hjertetransplantasjon. Behandling av avstøting av allograft ved resistens mot andre immunsuppressive midler.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør inntas minst 1 time før eller 2-3 timer etter mat. Skal svelges hele sammen med vann.

**Pakninger og priser:** **0,5 mg:** 50 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 570,90. **1 mg:** 50 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 902,20. **5 mg:** 50 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 3308,60.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se L04A D02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Prograf «Astellas»

## Tadalafil Accord «Accord»

C *Legemiddel mot erektil dysfunksjon og pulmonal arteriell hypertensjon.* ATC-nr.: G04B E08

H **TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 20 mg:** Hver tablett inneholder: Tadalafil 10 mg, resp. 20 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** 10 mg og 20 mg: Behandling av erektil dysfunksjon hos voksne menn. Seksuell stimulering er nødvendig for at tadalafil skal ha effekt. 20 mg: Behandling av pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) klassifisert som WHO-funksjonsklasse II og III for å bedre mosjonsevnen. Effekt er påvist ved idiopatisk PAH (IPAH) og PAH forbundet med kollagen vaskulær sykdom.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Svelges hele med vann.

**Pakninger og priser:** 10 mg: 4 stk. (blister) kr 449,70 (trinnspris: kr 89,50). 20 mg: 4 stk. (blister) kr 467,70 (trinnspris: kr 89,50). 8 stk. (blister) kr 899,10 (trinnspris: kr 142,80). 12 stk. (blister) kr 1330,60 (trinnspris: kr 196,10). 56 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 5964,60.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>H-resept: G04B E08\_1 Tadalafil

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Cialis «Lilly»

Adcirca «Lilly»

## Tadalafil Sandoz «Sandoz»

C *Legemiddel mot erektil dysfunksjon.* ATC-nr.: G04B E08

**TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 20 mg:** Hver tablett inneholder: Tadalafil 10 mg, resp. 20 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** Behandling av erektil dysfunksjon hos voksne menn. Seksuell stimulering er nødvendig for at tadalafil skal ha effekt.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Svelges hele med vann. *Tabletter 20 mg:* Kan deles i 2 like doser (delestrek).

**Pakninger og priser:** 10 mg: 4 stk. (blister) kr 449,70 (trinnspris: kr 89,50). 20 mg: 4 stk. (blister) kr 467,70 (trinnspris: kr 89,50). 8 stk. (blister) kr 899,10 (trinnspris: kr 142,80). 12 stk. (blister) kr 1330,60 (trinnspris: kr 196,10).

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Cialis «Lilly»

## Tamsulosin «Actavis»

C *Alfablokker.* ATC-nr.: G04C A02

T **KAPSLER MED MODIFISERT FRISETTING, harde 0,4 mg:** Hver kapsel inneholder: Tamsulosinhydroklorid 0,4 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigotin (E 132), jernoksider (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Nedre urinsveissymptomer forbundet med benign prostatahyperplasi.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas etter frokost eller etter dagens første måltid. Skal svelges hele med et glass vann, stående eller sittende (ikke liggende). Skal ikke ødelegges eller åpnes, da dette kan påvirke den langtidsvirkende frisettingen av virkestoffet.

**Pakninger og priser:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 139,50 (trinnspris: kr 115,60). 90 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 346,10 (trinnspris: kr 253,30).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se G04C A02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Miktosan «Sandoz»

## Tamsulosin «Mylan»

C *Alfablokker.* ATC-nr.: G04C A02

T **KAPSLER MED MODIFISERT FRISETTING, harde 0,4 mg:** Hver kapsel inneholder: Tamsulosinhydroklorid 0,4 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigokarmin (E 132), gult, rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Nedre urinveissymptomer (LUTS) i forbindelse med benign prostatahyperplasi.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Skal tas etter frokost/dagens første måltid. Svelges hele. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses.

**Pakninger og priser:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 139,50 (trinnpris: kr 115,60). 90 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 346,10 (trinnpris: kr 253,30).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se G04C A02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Miktosan «Sandoz»

## Tamsulosin «ratiopharm»

C *Alfablokker.* ATC-nr.: G04C A02

T **DEPOTTABLETTER 0,4 mg:** Hver depottablett inneholdt: Tamsulosinhydroklorid 0,4 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** Nedre urinsveissymptomer (LUTS) forbundet med benign prostatahyperplasi (BPH).

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hel. Skal ikke knuses eller tygges, da dette vil påvirke depoteffekten.

**Pakninger og priser:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 139,50 (trinnpris: kr 115,60). 90 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 346,10 (trinnpris: kr 253,30).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se G04C A02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Omnice «Astellas»

## Tapin «Orifarm Generics»

CF *Lokalanestetikum til overflateanestesi.* ATC-nr.: N01B B20

T **KREM 25 mg/g + 25 mg/g:** 1 g inneholdt: Lidokain 25 mg, prilokain 25 mg, ricinusolje, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** *Voksne, ungdom og barn:* Topisk anestesi av huden i forbindelse med kanyleinføring, f.eks. intravenøse katetre eller ved blodprøvetaking, og ved overflatiske kirurgiske prosedyrer. *Voksne og ungdom ≥12 år:* Topisk anestesi av genitallimhinner, f.eks. før overflatiske kirurgiske prosedyrer eller infiltrasjonsanestesi. *Kun hos voksne:* Topisk anestesi av leggsår for å lette mekanisk rensing/debridement. **Reseptfri bruk:** I samråd med lege: Lokalbedøvende middel på huden, f.eks. ved nålestikk og mindre hudoperasjoner.

**Pakninger uten resept:** Krem 5 g er unntatt fra reseptplikt.

**Pakninger og priser:** 5 g kr \*. 5 × 5 g<sup>1</sup> kr 187,30.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N01B B20\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Emla «Aspen» krem

## Tapin «Orifarm Generics»

CF *Lokalanestetikum til overflateanestesi.* ATC-nr.: N01B B20

**MEDISINERT PLASTER 25 mg/25 mg:** Hvert medisinerende plaster inneholdt: Lidokain 25 mg, prilokain 25 mg, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** *Voksne, ungdom og barn:* Topikal anestesi av intakt hud i forbindelse med kanyleinføring (f.eks. intravenøse katetre eller ved blodprøvetaking) og overflatiske kirurgiske prosedyrer. **Reseptfri bruk:** I samråd med lege: Lokalbedøvende middel på huden, f.eks. ved nålestikk og mindre hudoperasjoner.

**Pakninger uten resept:** Plaster 2 stk. er unntatt fra reseptplikt.

**Pakninger og priser:** 2 stk. kr \*. 20 stk. kr 372,90.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Emla «Aspen» plaster

## Telmisartan «Actavis»

C *Angiotensin II-reseptorantagonist.* ATC-nr.: C09C A07

**T** **TABLETTER 40 mg og 80 mg:** Hver tablett inneh.: Telmisartan 40 mg, resp. 80 mg, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** *Hypertensjon:* Behandling av essensiell hypertensjon hos voksne. *Kardiovaskulær forebygging:* Reduksjon av kardiovaskulær morbiditet hos voksne med manifest aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom (tidligere koronar hjertesykdom, slag eller perifer arteriell sykdom) eller diabetes mellitus type 2 med dokumentert skade i målorgan.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør tas til samme tid hver dag. Tas med eller uten mat. Svelges med væske. *Tabletter 40 mg:* Kan deles i 2 like deler (delestrek).

**Pakninger og priser:** **40 mg:** 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 595,80 (trinnspris: kr 265,70). **80 mg:** 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 731,00 (trinnspris: kr 321,10).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C09C A07\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Micardis «Boehringer Ingelheim»

## Temozolomide Accord «Accord»

**C** *Cytostatikum.*

ATC-nr.: L01A X03

**H** **KAPSLER, harde 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg og 250 mg:** Hver kapsel inneh.: Temozolomid 20 mg, resp. 100 mg, 140 mg, 180 mg og 250 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Titandioksid (E 171), svart jernoksid (E 172). 20 mg og 180 mg: Gult jernoksid (E 172). 100 mg: Rødt jernoksid (E 172). 140 mg: Indigokarmin (E 132).

**Indikasjoner:** Behandling av voksne med nydiagnostisert glioblastoma multiforme samtidig med strålebehandling og som påfølgende monoterapibehandling. Behandling av barn  $\geq 3$  år, ungdom og voksne med maligne gliomer, slik som glioblastoma multiforme eller anaplastisk astrocytom, som har residiv eller progresjon etter standardbehandling.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas på fastende mage. Skal svelges hele med et glass vann. Skal ikke åpnes eller tygges.

**Pakninger og priser:** **20 mg:** 5 stk.<sup>1</sup> (pose) kr 484,10. 20 stk.<sup>1</sup> (pose) kr 1827,60. **100 mg:** 5 stk.<sup>1</sup> (pose) kr 1846,70. 20 stk.<sup>1</sup> (pose) kr 7277,90. **140 mg:** 5 stk.<sup>1</sup> (pose) kr 2465,40. 20 stk.<sup>1</sup> (pose) kr 9753,00. **180 mg:** 5 stk.<sup>1</sup> (pose) kr 3089,70. **250 mg:** 5 stk.<sup>1</sup> (pose) kr 4171,40.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>H-resept: L01A X03\_2 Temozolomid

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Temodal «MSD»

## Temozolomide SUN «SUN Pharma»

**C** *Cytostatikum.*

ATC-nr.: L01A X03

**H** **KAPSLER, harde 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg og 250 mg:** Hver kapsel inneh.: Temozolomid 20 mg, resp. 100 mg, 140 mg, 180 mg og 250 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Svart jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Voksne med nydiagnostisert glioblastoma multiforme samtidig med strålebehandling (RT) og som påfølgende monoterapibehandling. Behandling av barn  $\geq 3$  år, ungdom og voksne pasienter med maligne gliomer, slik som glioblastoma multiforme eller anaplastisk astrocytom som har residiv eller progresjon etter standardbehandling.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Dosen tas 1 gang daglig, fortrinnsvis til samme tid hver dag. Skal tas uten mat, f.eks. minst 1 time før planlagt måltid. Skal svelges hele med et glass vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses eller deles. Skal ikke åpnes.

**Pakninger og priser:** **20 mg:** 5 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 484,10. 20 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1827,60. **100 mg:** 5 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1846,70. 20 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 7277,90. **140 mg:** 5 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 2465,40. 20 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 9753,00. **180 mg:** 5 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 3089,70. **250 mg:** 5 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 4171,40.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>H-resept: L01A X03\_2 Temozolomid

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Temodal «MSD»

## Tenofovir disoproxil «Sandoz»

**C** *Antiviralt middel.*

ATC-nr.: J05A F07

**H TABLETTER, filmdrasjerte 245 mg:** Hver tablett inneholder: Tenofovirdisoprosil 245 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** *Hiv-1-infeksjon:* Indisert i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler til behandling av hiv-1-infiserte voksne. Hos voksne er fordelene av tenofovirdisoprosil ved hiv-1-infeksjon basert på resultater av en studie med behandlingsnaive pasienter, inkl. pasienter med høy virusmengde (>100 000 kopier/ml) og studier der tenofovirdisoprosil ble lagt til en stabil basistherapi (hovedsakelig trippelterapi) hos tidligere antiretroviralt behandlede pasienter som har vært utsatt for en tidlig virologisk svikt (<10 000 kopier/ml, hvor de fleste pasienter har <5000 kopier/ml). Preparatet er også indisert for behandling av hiv-1-infisert ungdom 12-<18 år, med NRTI-resistens eller toksisitet som hindrer bruk av førstelinjemidler. Generelt: Valg av tenofovirdisoprosil til behandling av antiretroviralt behandlede pasienter med hiv-1-infeksjon må baseres på individuell viral resistenstesting og/eller behandlingshistorikk til pasientene. *Hepatitt B-infeksjon:* Indisert for behandling av kronisk hepatitt B hos voksne med: - Kompensert leversykdom med påvist aktiv virusreplikasjon, vedvarende forhøyede serumalaninaminotransferase (ALAT)-nivåer og histologisk påvisning av aktiv inflammasjon og/eller fibrose. - Påvist lamivudinresistent hepatitt B-virus. - Dekompensert leversykdom. Indisert for behandling av kronisk hepatitt B hos ungdom 12-<18 år med kompensert leversykdom og påvist immunaktiv sykdom, f.eks. aktiv virusreplikasjon, vedvarende forhøyede ALAT-nivåer i serum og histologisk påvisning av aktiv inflammasjon og/eller fibrose.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Skal tas med mat én gang daglig. I spesielle tilfeller kan tablett oppløses i minst 100 ml vann, appelsinjuice eller druejuice, og drikkes omgående.

**Pakninger og priser:** 30 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 3881,80.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>H-resept: J05A F07\_1 Tenofovirdisoprosil

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Tenofovir disoproxil «Teva»

## Tenofovir disoproxil Mylan «Mylan»

**C Antiviralt middel.**

ATC-nr.: J05A F07

**H TABLETTER, filmdrasjerte 245 mg:** Hver tablett inneholder: Tenofovirdisoprosilmaleat tilsv. tenofovirdisoprosil 245 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), indigokarminaluminiumlakk (E 132).

**Indikasjoner:** *Hiv-1-infeksjon:* Indisert i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler til behandling av hiv-1-infiserte voksne. Hos voksne er nytten av tenofovirdisoprosil ved hiv-1-infeksjon basert på resultatene fra én studie med behandlingsnaive pasienter, inkl. pasienter med en høy virusmengde (>100 000 kopier/ml) og studier hvor tenofovirdisoprosil ble gitt i tillegg til stabil bakgrunnsbehandling (hovedsakelig trippelbehandling) hos pasienter tidligere behandlet med antiretrovirale midler som opplevde tidlig virologisk svikt (<10 000 kopier/ml, hvor hoveddelen av pasientene hadde <5000 kopier/ml). Preparatet er også indisert til behandling av hiv-1-infiserte ungdom 12-<18 år, med NRTI-resistens eller toksisitet som hindrer bruk av førstelinjepreparater. Generelt: Valg av tenofovirdisoprosil til behandling av pasienter med hiv-1-infeksjon som tidligere har brukt antiretrovirale midler, må baseres på individuell viral resistenstesting og/eller behandlingshistorikk til pasientene. *Hepatitt B-infeksjon:* Behandling av kronisk hepatitt B hos voksne med: - Kompensert leversykdom med tegn på aktiv virusreplikasjon, vedvarende forhøyede serumalaninaminotransferase-nivåer (ALAT) og histologiske tegn på aktiv inflammasjon og/eller fibrose. - Tegn på lamivudinresistent hepatitt B-virus. - Dekompensert leversykdom. Behandling av kronisk hepatitt B hos ungdom 12-<18 år med kompensert leversykdom med tegn på aktiv immun sykdom, dvs. aktiv virusreplikasjon, vedvarende forhøyede serumalaninaminotransferase-nivåer (ALAT) og histologiske tegn på aktiv inflammasjon og/eller fibrose.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Skal tas med mat 1 gang daglig. I spesielle tilfeller kan tablett oppløses i minst 100 ml vann, appelsin- eller druejuice, og drikkes omgående.

**Pakninger og priser:** 30 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 3881,80.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>H-resept: J05A F07\_1 Tenofovirdisoprosil

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Tenofovir disoproxil «Teva»

## Terbinafin «ratiopharm»

**CF Fungicid til utvortes bruk.**

ATC-nr.: D01A E15

**T KREM 10 mg/g:** 1 g inneholder: Terbinafinhydroklorid 10 mg, natriumhydroksid, benzyllkohol, sorbitanstearat, cetylpalmitat, cetylalkohol, cetostearylalkohol, polysorbat 60, isopropylmyristat, renset vann.

**Indikasjoner:** Soppinfeksjoner i huden forårsaket av dermatofytter som Trichophyton (f.eks. T. Rubrum, T. Mentagrophytes, T. Verrucosum, T. Violaceum), Microsporum canis og Epidermophyton floccosum. Gjærsoppinfeksjoner i huden, hovedsakelig de forårsaket av arten Candida (f.eks. Candida albicans). Pityriasis (tinea) versicolor, forårsaket av Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur).

**Oppbevaring og holdbarhet:** Oppbevares i originalpakningen. Skal ikke fryses. Hold tuben tett lukket. Holdbarhet etter anbrudd: 3 måneder.

**Pakninger og priser:** 30 g<sup>1</sup> kr 137,80.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se D01A E15\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Lamisil «GlaxoSmithKline Consumer Healthcare» krem

## Terbinafin Bluefish «Bluefish»

C *Fungicid til systemisk bruk.* ATC-nr.: D01B A02

T **TABLETTER 250 mg:** Hver tablett inneh.: Terbinafinhydroklorid tilsv. terbinafin 250 mg, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** Behandling av terbinafinfølsomme soppinfeksjoner i huden, som tinea corporis, tinea cruris, tinea pedis (forårsaket av dermatofytter, se SPC) når peroral behandling anses som hensiktsmessig basert på infeksjonens lokalisering, alvorlighetsgrad eller omfang. Behandling av onykomykose forårsaket av dermatofytter. *Merk:* Terbinafin administrert peroralt har ingen virkning mot pityriasis versicolor. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer vedrørende riktig bruk av antimykotika.

**Dosering:** Se SPC. *Administrering:* Kan tas med eller uten mat. Kan deles i 2 like deler (delestrek).

**Pakninger og priser:** 14 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 232,40 (trinnpris: kr 128,60). 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 428,60 (trinnpris: kr 231,50).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se D01B A02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Lamisil «Novartis»

## Terbinafin HEXAL «HEXAL»

C *Fungicid til systemisk bruk.* ATC-nr.: D01B A02

T **TABLETTER 250 mg:** Hver tablett inneh.: Terbinafinhydroklorid tilsv. 250 mg terbinafin, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** Behandling av terbinafinsensitive soppinfeksjoner som tinea corporis, tinea cruris og tinea pedis (forårsaket av dermatofytter, se SPC) når oral behandling anses egnet basert på infeksjonens lokalisering, alvorlighetsgrad eller utbredelse. Behandling av onykomykose (terbinafinsensitive soppinfeksjoner i neglene) forårsaket av dermatofytter. Det bør tas hensyn til nasjonale anbefalinger når det gjelder bruk og forskrivning av legemidler mot soppinfeksjon. *Merk:* I motsetning til topikalt terbinafin, er oralt terbinafin ikke effektivt mot pityriasis versicolor og vaginal candidiasis.

**Dosering:** Se SPC. *Administrering:* Svelges med vann. Bør helst tas på samme tidspunkt hver dag. Kan tas med eller uten mat. Kan deles i like doser (delestrek).

**Pakninger og priser:** 14 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 232,40 (trinnpris: kr 128,60). 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 428,60 (trinnpris: kr 231,50). 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1409,40 (trinnpris: kr 716,40).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se D01B A02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Lamisil «Novartis»

## Terbinafin Orifarm «Orifarm Generics»

C *Fungicid til systemisk bruk.* ATC-nr.: D01B A02

T **TABLETTER 250 mg:** Hver tablett inneh.: Terbinafinhydroklorid tilsv. terbinafin 250 mg, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** Behandling av terbinafinfølsomme soppinfeksjoner som tinea corporis, tinea cruris og tinea pedis forårsaket av dermatofytter når dette anses som hensiktsmessig pga. infeksjonssted,



alvorlighetsgrad eller omfang. Behandling av onykomykose (terbinafinfølsom soppinfeksjon i neglene) forårsaket av dermatofytter. Ingen effekt mot pityriasis versicolor. Offisielle lokale retningslinjer bør følges, f.eks. nasjonale anbefalinger mht. korrekt bruk og forskrivning av antimikrobielle legemidler.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Bør ikke deles.

**Pakninger og priser:** 14 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 232,40 (trinnpris: kr 128,60). 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 428,60 (trinnpris: kr 231,50). 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1409,40 (trinnpris: kr 716,40).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se D01B A02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Lamisil «Novartis»

## Terbinafinhydroklorid Norfri «Evolan Pharma»

CF **Fungicid til topikal bruk.**

ATC-nr.: D01A E15

**KREM 10 mg/g: 1 g inneh.:** Terbinafinhydroklorid 10 mg, natriumhydroksid, benzylalkohol, sorbitanstearat, cetylpalmitat, cetylalkohol, stearylalkohol, polysorbat 60, isopropylmyristat, renset vann.

**Indikasjoner:** Soppinfeksjoner i huden forårsaket av dermatofytter. Pityriasis versicolor. Kutan candidiasis. **Reseptfri bruk:** Behandling av fotsopp hos voksne og barn >12 år.

**Pakninger uten resept:** Krem inntil 15 g er unntatt fra reseptplikt.

**Pakninger og priser:** 15 g (tube) kr \*.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Lamisil «GlaxoSmithKline Consumer Healthcare»

## Topotecan Ebewe «EBEWE»

C **Cytostatikum.**

ATC-nr.: L01X X17

**KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 1 mg/ml:** Hvert hetteglass inneh.: Topotecanhydroklorid tilsv. topotecan 4 mg, vinsyre, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.

**Indikasjoner:** *Monoterapi:* Pasienter med metastatisk ovarialkreft etter svikt av førstelinje- eller påfølgende behandling. Pasienter med residiv av småcellet lungekreft (SCLC) hvor gjentatt behandling med førstelinjeregimet ikke er egnet. *I kombinasjon med cisplatin:* Pasienter med cervical kreft som residiverer etter strålebehandling og pasienter med sykdom i stadium IVB. Pasienter som tidligere er eksponert for cisplatin krever et uavbrutt, behandlingsfritt intervall for å rettferdiggjøre behandling med kombinasjonen.

**Oppbevaring og holdbarhet:** *Uåpnede hetteglass:* Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. *Fortynnet oppløsning:* Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er påvist i 7 dager ved 20-25°C og ved 2-8°C. Fra et mikrobiologisk ståsted bør oppløsningen brukes omgående. Hvis det ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstid og -betingelser for og under bruk brukerens ansvar, og er normalt maks. 24 timer ved 2-8°C, med mindre fortyning har funnet sted ved kontrollerte og godkjente aseptiske forhold.

**Pakninger og priser:** 5 × 4 ml (hettegl.) kr 15214,60.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Topotecan Accord «Accord»

## Tramadol «Actavis»

B **Analgetikum.**

ATC-nr.: N02A X02

T **KAPSLER, harde 50 mg:** Hver kapsel inneh.: Tramadolhydroklorid 50 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigotin (E 132), gult og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

△ **Indikasjoner:** Behandling av moderate til sterke smerter.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas med eller uten mat. Svelges hele med tilstrekkelig væske. Skal ikke deles/tygges.

**Pakninger og priser:** 20 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 82,50. 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 138,90.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N02A X02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Nobligan «Grünenthal»

## Tramadol HEXAL «HEXAL»

- B** *Analgetikum.* ATC-nr.: N02A X02
- T** **KAPSLER, harde 50 mg:** Hver kapsel inneholder: Tramadolhydroklorid 50 mg, hjelpestoffer. Fargestoffer: Titandioksid (E 171), indigotinlake (E 132).
- △ **Indikasjoner:** Moderate smerter.
- Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas med eller uten mat. Svelges hele med tilstrekkelig væske.
- Pakninger og priser:** 20 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 82,50. 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 138,90.
- Refusjon:**  
<sup>1</sup>Se N02A X02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Nobligan «Grünenthal»

## Tramadol/Paracetamol Orion «Orion»

- B** *Analgetikum.* ATC-nr.: N02A J13
- T** **TABLETTER, filmdrasjerte 37,5 mg/325 mg:** Hver tablett inneholder: Tramadolhydroklorid 37,5 mg, paracetamol 325 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172).
- △ **Indikasjoner:** Symptomatisk behandling av moderate til sterke smerter når det ikke er tilstrekkelig med analgetika med kun perifer effekt.
- Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Doseringsintervallet  $\geq 6$  timer. Svelges hele, med tilstrekkelig mengde væske. Skal ikke tygges. Skal ikke deles.
- Pakninger og priser:** 20 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 118,90. 60 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 179,40.
- Refusjon:**  
<sup>1</sup>Se N02A J13\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Trampalgin «Karo Pharma»

## Tranexamic acid «Stragen»

- C** *Fibrinolysehemmer.* ATC-nr.: B02A A02
- INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 100 mg/ml: 1 ml inneholder:** Traneksamsyre 100 mg, saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.
- Indikasjoner:** Forebygging og behandling av blødninger pga. generell eller lokal fibrinolyse hos voksne og barn  $> 1$  år. Spesifikke indikasjoner omfatter: Blødninger forårsaket av generell eller lokal fibrinolyse, som: Menoragi og metroragi, gastrointestinal blødning, blødningstilstand i urinveiene i forbindelse med prostataoperasjon eller kirurgiske inngrep som påvirker urinveiene, øre-, nese- og halsoperasjon (adenoidektomi, tonsillektomi, tannekstraksjoner), gynekologisk operasjon eller sykdomstilstand av obstetriske opprinnelse, thorax- og bukoperasjon samt andre større kirurgiske inngrep i f.eks. hjerte/kar, håndtering av blødning forårsaket av administrering av et fibrinolytisk middel.
- Pakninger og priser:** 5  $\times$  5 ml (amp.) kr 125,50.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Cyklokapron «Pfizer»

## Travoprost/Timolol Mylan «Mylan»

- C** *Glaukommiddel.* ATC-nr.: S01E D51
- T** **ØYEDRÅPER, oppløsning: 1 ml inneholder:** Travoprost 40  $\mu$ g, timololmaleat tilsv. timolol 5 mg, benzalkoniumklorid, makrogolglyserolhydroksystearat 40, trometamol, dinatriumedetat, borsyre, mannitol, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.
- Indikasjoner:** Til nedsettelse av intraokulært trykk (IOP) hos voksne med åpenvinkelglaukom eller okulær hypertensjon som ikke responderer tilstrekkelig på topikale betablokkere eller prostaglandinanaloger.
- Pakninger og priser:** 2,5 ml<sup>1</sup> (flaske) kr 173,30. 3  $\times$  2,5 ml<sup>1</sup> (flaske) kr 447,50.
- Refusjon:**

<sup>1</sup>Se S01E D51\_3 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

DuoTrav «Novartis»

## Ursochol «Orifarm Generics»

C *Gallesyrepreparat.* ATC-nr.: A05A A02

**KAPSLE, harde 250 mg:** Hver kapsel inneh.: Ursodeoksykolsyre 250 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** *Voksne:* Til oppløsning av gallesteiner av kolesterol i galleblæren. Gallesteinene bør være røntgenegative og ha en diameter på <15 mm. Galleblæren må fungere tross gallestein(e). Primær biliær cirrhose (PBC), stadiene I-III. *Barn og ungdom 6-18 år:* Sykdommer i lever og galveier forbundet med cystisk fibrose.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas oralt. Svelges hele med væske.

**Pakninger og priser:** 100 stk. (blister) kr 389,20 (trinnpris: kr 265,70).

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Ursolfalk «Dr. Falk»

## Ursodeoxycholic acid Orion «Orion»

C *Gallesyrepreparat.* ATC-nr.: A05A A02

**KAPSLE, harde 250 mg:** Hver kapsel inneh.: Ursodeoksykolsyre 250 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** *Voksne:* Til oppløsning av gallesteiner av kolesterol i galleblæren. Gallesteinene bør være røntgennegative og ha en diameter på <15 mm. Galleblæren må fungere tross gallestein(e). Primær biliær cirrhose (PBC), stadiene I-III. *Barn og ungdom (6-18 år):* Sykdommer i lever og galveier forbundet med cystisk fibrose.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Svelges hele med væske.

**Pakninger og priser:** 100 stk. (blister) kr 389,20 (trinnpris: kr 265,70).

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Ursolfalk «Dr. Falk»

## Valaciclovir Sandoz «Sandoz»

C *Antiviralt middel.* ATC-nr.: J05A B11

T **TABLETTER, filmdrasjerte 250 mg og 500 mg:** Hver tablett inneh.: Valaciklovirhydroklorid tilsv. valaciklovir 250 mg, resp. 500 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** *Infeksjoner med varicella zoster-virus (VZV) - herpes zoster:* Behandling av herpes zoster (helvetesild) og oftalmisk zoster hos immunkompetente voksne. Behandling av herpes zoster hos voksne pasienter med lett til moderat immunsuppresjon. *Infeksjoner med herpes simplex-virus (HSV):* Behandling og suppresjon av HSV-infeksjoner i hud og slimhinner, inkl. - behandling av 1. episode genital herpes hos immunkompetente voksne og unge og hos immunkompromitterte voksne, - behandling av tilbakefall av genital herpes hos immunkompetente voksne og unge og hos immunkompromitterte voksne, - suppresjon av tilbakevendende genital herpes hos immunkompetente voksne og unge og hos immunkompromitterte voksne. Behandling og suppresjon av tilbakevendende øyeinfeksjoner med HSV hos immunkompetente voksne og ungdom og hos immunsupprimerte voksne. Kliniske studier er ikke utført med HSV-infiserte pasienter som er immunkompromitterte av andre årsaker enn hiv-infeksjon. *Infeksjoner med cytomegalovirus (CMV):* Forebygging av infeksjoner og sykdom forårsaket av CMV etter transplantasjon av organ hos voksne og unge.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas til samme tid hver dag. Svelges hele med 1 glass vann.

**Pakninger og priser:** **250 mg:** 60 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 696,00 (trinnpris: kr 367,70). **500 mg:** 10 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 146,20 (trinnpris: kr 131,60). 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 366,10 (trinnpris: kr 322,30). 42 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 498,10 (trinnpris: kr 422,40).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se J05A B11\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Valtrex «GlaxoSmithKline»

## Valganciclovir Accord «Accord»

C *Antiviralt middel.* ATC-nr.: J05A B14

T **TABLETTER, filmdrasjerte 450 mg:** *Hver tablett inneholder:* Valganciclovirhydroklorid tilsv. valganciclovir 450 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Induksjons- og vedlikeholdsbehandling av CMV-retinititt hos voksne med ervervet immunsviktsyndrom (aids). Forebygging av CMV-sykdom hos CMV-negative voksne og barn (0-18 år) som har mottatt et organtransplantat fra en CMV-positiv donor.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Skal tas med mat når det er mulig. Skal svelges hele. Skal ikke deles eller knuses da preparatet anses å være potensielt teratogent og karsinogent. Ved berøring/håndtering av ødelagte, knuste eller delte tabletter, se SPC.

**Pakninger og priser:** 60 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 9761,80 (trinnpris: kr 6494,60).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se J05A B14\_2 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Valcyte «Roche»

## Valganciclovir Sandoz «Sandoz»

C *Antiviralt middel.* ATC-nr.: J05A B14

T **TABLETTER, filmdrasjerte 450 mg:** *Hver tablett inneholder:* Valganciclovirhydroklorid tilsv. valganciclovir 450 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), rødt jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** Induksjons- og vedlikeholdsbehandling av CMV-retinititt hos voksne med ervervet immunsviktsyndrom (aids). Forebygging av CMV-sykdom hos CMV-negative voksne og barn (fra nyfødt til 18 år) som har mottatt et organtransplantat fra en CMV-positiv donor.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør tas sammen med mat, hvis mulig. Tablettene skal svelges hele. Skal ikke deles eller knuses da preparatet anses for å være potensielt teratogent og karsinogent. Ved berøring/håndtering av ødelagte, knuste eller delte tabletter, se SPC.

**Pakninger og priser:** 60 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 9761,80 (trinnpris: kr 6494,60).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se J05A B14\_2 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Valcyte «Roche»

## Valsartan Krka «KRKA»

C *Angiotensin II-reseptorantagonist.* ATC-nr.: C09C A03

T **TABLETTER, filmdrasjerte 40 mg, 80 mg, 160 mg og 320 mg:** *Hver tablett inneholder:* Valsartan 40 mg, resp. 80 mg, 160 mg og 320 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Titandioksid (E 171). 80 mg, 160 mg og 320 mg: Rødt jernoksid (E 172). 40 mg, 160 mg og 320 mg: Gult jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** *Alle styrker:* Behandling av hypertensjon hos barn og ungdom 6-18 år. *80 mg, 160 mg og 320 mg:* Behandling av essensiell hypertensjon hos voksne. *40 mg, 80 mg og 160 mg:* Behandling av klinisk stabile, voksne pasienter med symptomatisk hjertesvikt eller asymptomatisk venstreventrikulær systolisk dysfunksjon etter et nylig (12 timer-10 dager) hjerteinfarkt. Behandling av symptomatisk hjertesvikt hos voksne når ACE-hemmere ikke tolereres, eller som tilleggshandling til ACE-hemmere når betablokkere ikke tolereres og mineralokortikoid-reseptorantagonister ikke kan brukes.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Bør tas med vann. Kan deles i 2 like doser (delestrek).

**Pakninger og priser:** **40 mg:** 28 stk.<sup>3</sup> (blister) kr 133,30 (trinnpris: kr 84,50). **80 mg:** 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 375,90 (trinnpris: kr 219,30). **160 mg:** 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 487,00 (trinnpris: kr 275,70). **320 mg:** 98 stk.<sup>2</sup> (blister) kr 937,70 (trinnpris: kr 341,80).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C09C A03\_1 i Refusjonslisten.

<sup>2</sup>Se C09C A03\_2 i Refusjonslisten.

<sup>3</sup>Se C09C A03\_3 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Diovan «Novartis»

## Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka «KRKA»

C *Angiotensin II-reseptorantagonist og diuretikum.* ATC-nr.: C09D A03

T **TABLETTER, filmdrasjerte 80 mg/12,5 mg, 160 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg, 320 mg/12,5 mg og 320 mg/25 mg:** Hver tablett inneh.: Valsartan 80 mg, resp. 160 mg, 160 mg, 320 mg og 320 mg, hydroklortiazid 12,5 mg, resp. 12,5 mg, 25 mg, 12,5 mg og 25 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Titandioksid (E 171). 80 mg/12,5 mg, 160 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg og 320 mg/12,5 mg: Rødt jernoksid (E 172). 80 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg og 320 mg/25 mg: Gult jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** Behandling av essensiell hypertensjon hos voksne. Fast dosekombinasjon er indisert hos pasienter hvor blodtrykket ikke er adekvat kontrollert med valsartan eller hydroklortiazid som monoterapi.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. Bør tas med vann. *Tabletter 320 mg/25 mg:* Kan deles i 2 like doser (delestrek).

**Pakninger og priser:** **80 mg/12,5 mg:** 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 434,60 (trinnpris: kr 228,60). **160 mg/12,5 mg:** 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 547,70 (trinnpris: kr 279,20). **160 mg/25 mg:** 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 604,90 (trinnpris: kr 300,40). **320 mg/12,5 mg:** 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1059,20 (trinnpris: kr 423,80). **320 mg/25 mg:** 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1173,60 (trinnpris: kr 435,40).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se C09D A03\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Diovan Comp «Novartis»

## Vardenafil Krka «KRKA»

C *Middel mot erektil dysfunksjon.* ATC-nr.: G04B E09

**TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 20 mg:** Hver tablett inneh.: Vardenafilhydrokloridtrihydrat tilsv. vardenafil 10 mg, resp. 20 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Behandling av erektil dysfunksjon hos menn. Erekttil dysfunksjon er manglende evne til å oppnå eller opprettholde en penil ereksjon tilstrekkelig for tilfredsstillende seksuell aktivitet. Seksuell stimulering er nødvendig for effekt.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas med eller uten mat. Innsettende virkning kan forsinkes tatt sammen med fettrikt måltid. Samtidig inntak av grapefrukt/grapefruktjuice bør unngås, da plasmaknivået av vardenafil kan øke.

**Pakninger og priser:** **10 mg:** 4 stk. (blister) kr 189,20 (trinnpris: kr 98,90). 12 stk. (blister) kr 495,00 (trinnpris: kr 224,30). **20 mg:** 4 stk. (blister) kr 341,60 (trinnpris: kr 161,40). 12 stk. (blister) kr 952,20 (trinnpris: kr 411,80).

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Levitra «Bayer AG»

## Venlafaxin Bluefish «Bluefish»

C *Antidepressiv, serotonin- og noradrenalinreopptakshemmer.* ATC-nr.: N06A X16

T **DEPOTKAPSLER, harde 75 mg og 150 mg:** Hver depotkapsel inneh.: Venlafaksinhydroklorid tilsv. venlafaksin 75 mg, resp. 150 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 75 mg: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 150 mg: Allurarød (E 129), paraoransje (E 110), brilliantblå FCF (E 133), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Behandling av depressive episoder. Forebygging av tilbakefall av depressive episoder. Behandling av generalisert angstlidelse. Behandling av sosial angstlidelse. Behandling av panikksyndrom med eller uten agorafobi.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas til omtrent samme tid hver dag. Bør tas med mat. Skal svelges hele sammen med væske. Skal ikke åpnes, knuses, tygges eller løses opp.

**Pakninger og priser:** **75 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 116,90 (trinnpris: kr 69,00). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 305,00 (trinnpris: kr 144,80). **150 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 197,50 (trinnpris: kr 98,10). 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 573,80 (trinnpris: kr 241,80).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N06A X16\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Efexor Depot «Pfizer»

## Venlafaxin Krka «KRKA»

C *Antidepressiv, serotonin- og noradrenalinreopptakshemmer.* ATC-nr.: N06A X16

T **DEPOTKAPSLER, harde 37,5 mg, 75 mg og 150 mg:** Hver kapsel inneh.: Venlafaksin 37,5 mg, resp. 75 mg og 150 mg, sukrose, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 75 mg og 150 mg: Gult jernoksid (E 172).

**Indikasjoner:** Depressive episoder. Korttidsbehandling av generalisert angstlidelse (iht. DSM-IV). Korttidsbehandling av sosial angstlidelse/sosial fobi. Behandling av panikksyndrom med eller uten agorafobi.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas til omtrent samme tid hver dag. Bør tas med mat. Skal svelges hele sammen med væske. Skal ikke deles, knuses, tygges eller løses opp.

**Pakninger og priser:** **37,5 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 111,50. **75 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 111,50 (trinnpris: kr 66,60). 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 299,60 (trinnpris: kr 142,60). **150 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 186,80 (trinnpris: kr 93,70). 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 563,00 (trinnpris: kr 237,60).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N06A X16\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Efexor Depot «Pfizer»

## Venorion «Orion»

C *Antidepressiv, serotonin- og noradrenalinreopptakshemmer.* ATC-nr.: N06A X16

T **DEPOTKAPSLER, harde 37,5 mg, 75 mg og 150 mg:** Hver depotkapsel inneh.: Venlafaksinhydroklorid 42,43 mg, resp. 84,86 mg og 169,72 mg tilsv. venlafaksin 37,5 mg, resp. 75 mg og 150 mg, sukrose. Fargestoff: Rødt og sort (kun depotkapsler 37,5 mg) jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Behandling av depressive episoder. Forebygging av tilbakefall av depressive episoder. Behandling av generalisert angstlidelse. Behandling av sosial angstlidelse. Behandling av panikklidelse, med eller uten agorafobi.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør tas med mat, til omtrent samme tid hver dag. Skal svelges hele sammen med væske. Skal ikke åpnes, knuses, tygges eller løses opp. Depotkapslene inneholder sfæroider som frigjør virkestoffet sakte til fordøyelsessystemet. Den uløselige delen av sfæroidene (skallet) skiller ut og kan ses i feces som små, hvite kuler eller granulatkorn.

**Pakninger og priser:** **37,5 mg:** 7 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 55,10 (trinnpris: kr 55,10). 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 111,50. **75 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 111,50 (trinnpris: kr 66,60). 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 299,60 (trinnpris: kr 142,60). **150 mg:** 28 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 186,80 (trinnpris: kr 93,70). 98 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 563,00 (trinnpris: kr 237,60).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N06A X16\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Efexor Depot «Pfizer»

## Vinelle «CampusPharma»

C *Antikonsepsjonsmiddel.* ATC-nr.: G03A C09

**TABLETTER, udrauerte:** Hver tablett inneh.: Desogestrel 75 µg, laktose, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** Antikonsepsjon.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Skal tas hver dag til omtrent samme tid slik at intervaller mellom 2 tabletter alltid er 24 timer. Skal tas i den rekkefølgen som er angitt på brettet. Svelges hele med vann.

**Pakninger og priser:** 3 × 28 stk. (kalenderpakn.) kr 184,40 (trinnpris: kr 118,50).

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Cerazette «MSD»

## Vinorelbin Accord «Accord»

C *Cytostatikum.* ATC-nr.: L01C A04

**KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml:** 1 ml inneh.: Vinorelbin (som vinorelbintartrat) 10 mg, vann til injeksjonsvæsker.

**Indikasjoner:** *Voksne:* Som monoterapi hos pasienter med metastaserende brystkreft (stadium 4) der kjemoterapi med antrasykliner og taksan er mislykket eller utilstrekkelig. Ikke-småcellet lungekreft (stadium 3 eller 4).

**Pakninger og priser:** 1 ml (hettegl.) kr 212,80. 5 ml (hettegl.) kr 919,10.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Navelbine «Pierre Fabre»

## Vinorelbin Ebewe «EBEWE»

C *Cytostatikum.* ATC-nr.: L01C A04

**KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml: 1 ml inneh.:** Vinorelbintartrat tilsv. vinorelbin 10 mg, nitrogen, vann til injeksjonsvæsker.

**Indikasjoner:** Ikke-småcellet lungekreft (stadium 3 eller 4). Som monoterapi til pasienter med metastatisk brystkreft (stadium 4), når behandling med antrasyklin- og taksanholdig kjemoterapi har sviktet eller ikke er egnet.

**Pakninger og priser:** 1 ml (hettegl.) kr 212,80. 5 ml (hettegl.) kr 919,10.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Navirel «Medac»

## Vinorelbine Orifarm «Orifarm Generics»

C *Antineoplastisk cytostatikum.* ATC-nr.: L01C A04

H **KAPSLER, myke 20 mg og 30 mg: Hver kapsel inneh.:** Vinorelbintartrat tilsv. vinorelbin 20 mg, resp. 30 mg, sorbitol. Fargestoff: 20 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 30 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Ikke-småcellet lungekreft hos voksne. Avansert brystkreft hos voksne som ikke kan få annen behandling.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Bør tas til et lite måltid for å redusere risikoen for kvalme. Skal svelges hele med vann. Skal ikke tygges. Skal ikke suges eller løses opp. Hvis man tygger eller suger på en kapsel ved et uhell, må man straks skylle munnen grundig og umiddelbart kontakte lege. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon og om hvordan man åpner blisterbrettet. Kontroller at ingen av kapslene er skadet før blisterbrettet åpnes. Skadede kapsler skal ikke svelges. Av sikkerhetsmessige årsaker skal skadede eller ikke-anvendte kapsler returneres til sykehuset eller apoteket for destruksjon i overensstemmelse med lokale retningslinjer for cytostatika.

**Pakninger og priser:** 20 mg: 1 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 551,20. 30 mg: 1 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 796,30.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>H-resept: L01C A04\_2 Vinorelbin

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Navelbine «Pierre Fabre»

## Vitamin B<sub>12</sub> depot Orifarm «Orifarm Generics»

C *B<sub>12</sub>-vitaminpreparat med protraisert virkning.* ATC-nr.: B03B A03

T **INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1 mg/ml: 1 ml inneh.:** Hydroksokobalaminklorid tilsv. hydroksokobalamin 1 mg, natriumklorid 3,5 mg, saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker. **Indikasjoner:** Pernisios anemi og andre vitamin B<sub>12</sub>-mangeltilstander, påvist klinisk eller laboratoriemessig. Profylakse etter ventrikkelreseksjon.

**Pakninger og priser:** 5 × 1 ml<sup>1</sup> (amp.) kr 538,60 (trinnpris: kr 242,20).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se B03B A03\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Vitamin B<sub>12</sub> Depot «Takeda»

## Voriconazole Accord «Accord»

C *Antimykotikum, triazololderivat.* ATC-nr.: J02A C03

- T** **TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg og 200 mg:** Hver tablett inneh.: Vorikonazol 50 mg, resp. 200 mg, laktose, hjelpestoffer.  
**Indikasjoner:** *Voksne og barn > 2 år:* Behandling av invasiv aspergillose. Behandling av candidemi hos ikke-nøytropene pasienter. Behandling av flukonazolresistente, alvorlige, invasive candida-infeksjoner (inkl. C. krusei). Behandling av alvorlige soppinfeksjoner forårsaket av *Scedosporium* spp. og *Fusarium* spp. Vorikonazol skal primært administreres til pasienter med progressive, mulig livstruende infeksjoner. Profylakse mot invasive soppinfeksjoner hos høyrisikopasienter med allogent, hematopoetisk stamcelletransplantat (HSCT).  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Skal tas minst 1 time før eller 1 time etter mat. Svelges hele med litt vann.  
**Pakninger og priser:** **50 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1605,50 (trinnpris: kr 1402,80). **200 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 5913,00 (trinnpris: kr 5253,00).  
**Refusjon:**  
<sup>1</sup>Se J02A C03\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

VFEND «Pfizer»

## Voriconazole Fresenius Kabi «Fresenius Kabi»

- C** *Antimykotikum, triazolderivat.* ATC-nr.: J02A C03
- T** **PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 200 mg:** Hvert hetteglass inneh.: Vorikonazol 200 mg, hydroksypropylbetadeks, L-arginin, saltsyre/natriumhydroksid (til pH-justering).  
**Indikasjoner:** *Voksne og barn ≥ 2 år:* Bredspektret triazolantimykotikum til behandling av invasiv aspergillose, behandling av candidemi hos ikke-nøytropene pasienter, behandling av flukonazolresistente, alvorlige, invasive Candida-infeksjoner (inkl. C. krusei), behandling av alvorlige soppinfeksjoner forårsaket av *Scedosporium* spp. og *Fusarium* spp. Skal primært administreres til pasienter med progressive, mulig livstruende infeksjoner. Profylakse mot invasive soppinfeksjoner hos høyrisikopasienter som har gjennomgått allogent, hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT).  
**Pakninger og priser:** 1 stk.<sup>1</sup> (hettegl.) kr 1077,80.  
**Refusjon:**  
<sup>1</sup>Se J02A C03\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

VFEND «Pfizer»

## Voriconazole Sandoz «Sandoz»

- C** *Antimykotikum.* ATC-nr.: J02A C03
- T** **TABLETTER, filmdrasjerte 50 mg og 200 mg:** Hver tablett inneh.: Vorikonazol 50 mg, resp. 200 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).  
**Indikasjoner:** *Voksne og barn > 2 år:* Behandling av invasiv aspergillose. Behandling av candidemi hos ikke-nøytropene pasienter. Behandling av flukonazol-resistente, alvorlige, invasive Candida-infeksjoner (inkl. C. krusei). Behandling av alvorlige soppinfeksjoner forårsaket av *Scedosporium* spp. og *Fusarium* spp. Skal primært administreres til pasienter med progressive, mulig livstruende infeksjoner. Profylakse mot invasive soppinfeksjoner hos høyrisikopasienter med allogent, hematopoetisk stamcelletransplantat (HSCT).  
**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Skal tas minst 1 time før eller 1 time etter mat.  
**Pakninger og priser:** **50 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1605,50 (trinnpris: kr 1402,80). **200 mg:** 30 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 5913,00 (trinnpris: kr 5253,00).  
**Refusjon:**  
<sup>1</sup>Se J02A C03\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

VFEND «Pfizer»

## Xylometazolinhydroklorid Norfri «Evolan Pharma»

- CF** *Slimhinneavsvellende middel.* ATC-nr.: R01A A07
- NESESPRAY, oppløsning 0,5 mg/ml:** 1 ml inneh.: Xylometazolinhydroklorid 0,5 mg, glyserol, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, renset vann. Uten konserveringsmiddel.



NESESPRAY, oppløsning **1 mg/ml**: 1 ml inneh.: Xylometazolinhydroklorid 1 mg, dinatriumedetat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, sorbitol, renset vann. Uten konserveringsmiddel.

**Indikasjoner:** Til drenering ved akutt rhinitt, sinusitt og akutt otitt. **Reseptfri bruk:** Voksne og barn >2 år: Korttidsbehandling av tett nese ved forkjølelse og akutt bihulebetennelse.

**Pakninger uten resept:** Nesespray inntil 10 ml er unntatt fra reseptplikt.

**Pakninger og priser:** **0,5 mg/ml:** 10 ml (plastflaske m/dosepumpe) kr \*. **1 mg/ml:** 10 ml (plastflaske m/dosepumpe) kr \*.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Otrivin «GlaxoSmithKline Consumer Healthcare»

## Ziprasidon «Actavis»

C *Antipsykotikum.* ATC-nr.: N05A E04

T **KAPSLER, harde 20 mg, 40 mg, 60 mg og 80 mg:** Hver kapsel inneh.: Ziprasidonhydroklorid tilsv. ziprasidon 20 mg, resp. 40 mg, 60 mg og 80 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 20 mg, 40 mg og 80 mg: Indigotin (E 132), titandioksid (E 171). 60 mg: Titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Behandling av schizofreni hos voksne. Behandling av maniske eller blandede episoder av moderat alvorlighetsgrad i forbindelse med bipolar lidelse hos voksne, ungdom og barn i alderen 10-17 år (forebygging av episoder i forbindelse med bipolar lidelse er ikke fastslått).

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Skal tas med mat. Skal svelges hele. Skal ikke tygges.

**Pakninger og priser:** **20 mg:** 56 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1074,80 (trinnpris: kr 462,10). **40 mg:** 56 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1115,10 (trinnpris: kr 478,60). **60 mg:** 56 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1214,40 (trinnpris: kr 519,30). **80 mg:** 56 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 1639,80 (trinnpris: kr 693,70).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N05A E04\_2 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Zeldox «Pfizer»

## Zolmitriptan «Actavis»

C *Migrenemiddel.* ATC-nr.: N02C C03

T **SMELTETABLETTER 2,5 mg:** Hver smeltetablett inneh.: Zolmitriptan 2,5 mg, mannitol, aspartam, hjelpestoffer. Appelsinsmak.

T **TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg:** Hver tablett inneh.: Zolmitriptan 5 mg, laktose vannfri, hjelpestoffer. Fargestoff: 5 mg: Gult jernoksid (E 172), rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Akutt behandling av migrene med eller uten aura.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Kan tas med eller uten mat. **Smeltetabletter:** Legges på tungen hvor den oppløses umiddelbart og kan svelges med spyttet. Væsketilførsel er ikke nødvendig. **Tabletter:** Svelges hele med vann.

**Pakninger og priser:** **Smeltetabletter:** 12 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 406,20 (trinnpris: kr 228,50). **Tabletter:** 18 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 958,10 (trinnpris: kr 484,40).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N02C C03\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Zomig, Zomig Rapimelt «Grünenthal»

## Zolmitriptan Sandoz «Sandoz»

C *Migrenemiddel.* ATC-nr.: N02C C03

T **SMELTETABLETTER 2,5 mg:** Hver smeltetablett inneh.: Zolmitriptan 2,5 mg, mannitol, aspartam, hjelpestoffer. Appelsinsmak.

T **TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg og 5 mg:** Hver tablett inneh.: Zolmitriptan 2,5 mg, resp. 5 mg, vannfri laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 2,5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 5 mg: Gult jernoksid (E 172), rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

**Indikasjoner:** Akutt behandling av migrene med eller uten aura.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** **Smeltetabletter:** Legges på tungen hvor den oppløses umiddelbart og kan svelges med spyttet. Væsketilførsel er ikke nødvendig. **Tabletter:** Svelges hele med vann.

**Pakninger og priser:** *Smeltetabletter:* 6 stk.<sup>1</sup> (bli­ster) kr 221,20 (trin­npris: kr 125,80). 12 stk.<sup>1</sup> (bli­ster) kr 406,20 (trin­npris: kr 228,50). *Tabletter: 2,5 mg:* 6 stk.<sup>1</sup> (bli­ster) kr 233,30 (trin­npris: kr 125,80). 18 stk.<sup>1</sup> (bli­ster) kr 627,50 (trin­npris: kr 331,70). *5 mg:* 6 stk.<sup>1</sup> (bli­ster) kr 343,50 (trin­npris: kr 176,30). 18 stk.<sup>1</sup> (bli­ster) kr 958,10 (trin­npris: kr 484,40).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N02C C03\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Zomig, Zomig Rapimelt «Grünenthal»

## Zolpidem Aurobindo «Aurobindo»

**B** *Hypnotikum.*

ATC-nr.: N05C F02

**T** **TABLETTER, film­drasjerte 5 mg og 10 mg:** *Hver tablett inne­h.:* Zolpidemtartrat 5 mg, resp. 10 mg, laktosemonohydrat 43,8 mg, resp. 87,6 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

△ **Indikasjoner:** Kortvarig behandling av søvnløshet. Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende stoffer skal kun forskrives hvis søvnforstyrrelsene er alvorlige, invalidiserer eller gir pasienten store plager.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas umiddelbart før sengetid eller i sengen, i én enkelt dose. *Tabletter 10 mg:* Kan deles i 2 like doser (delestrek).

**Pakninger og priser:** *5 mg:* 10 stk.<sup>1</sup> (bli­ster) kr 66,70. 30 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 80,20. 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 127,40. *10 mg:* 10 stk.<sup>1</sup> (bli­ster) kr 68,20. 30 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 84,70. 100 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 142,20.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N05C F02\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Stilnoct «sanofi-aventis»

## Zopiclone «Actavis»

**B** *Hypnotikum.*

ATC-nr.: N05C F01

**T** **TABLETTER, film­drasjerte 3,75 mg, 5 mg og 7,5 mg:** *Hver tablett inne­h.:* Zopiklon 3,75 mg, resp. 5 mg og 7,5 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: 3,75 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 7,5 mg: Titandioksid (E 171).

△ **Indikasjoner:** Forbigående og kortvarige søvnevansker hos voksne. Som støttet­erapi for en begrenset tid ved behandling av kroniske søvnevansker hos voksne.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Svelges med litt vann. Skal tas kort tid før sengetid. Bør inntas i oppreist/sittende stilling siden absorpsjonen kan forsinkes i liggende stilling. *Tabletter 7,5 mg:* Kan deles (delestrek).

**Pakninger og priser:** *3,75 mg:* 28 stk.<sup>1</sup> (bli­ster) kr 94,60. *5 mg:* 10 stk.<sup>1</sup> (bli­ster) kr 72,50 (trin­npris: kr 66,10). 30 stk.<sup>1</sup> (bli­ster) kr 97,50 (trin­npris: kr 85,30). 100 stk.<sup>1</sup> (bli­ster) kr 185,00 (trin­npris: kr 119,70). *7,5 mg:* 10 stk.<sup>1</sup> (bli­ster) kr 77,50 (trin­npris: kr 66,10). 30 stk.<sup>1</sup> (bli­ster) kr 112,50 (trin­npris: kr 85,30). 100 stk.<sup>1</sup> (bli­ster) kr 235,00 (trin­npris: kr 121,20).

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N05C F01\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Imovane «sanofi-aventis»

## Zopiklon «Mylan»

**B** *Hypnotikum.*

ATC-nr.: N05C F01

**T** **TABLETTER, film­drasjerte 5 mg og 7,5 mg:** *Hver tablett inne­h.:* Zopiklon 5 mg, resp. 7,5 mg, laktose 20,5 mg, resp. 30,8 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

△ **Indikasjoner:** Forbigående og kortvarige søvnevansker hos voksne. Som støttet­erapi for en begrenset tid ved behandling av kroniske søvnevansker hos voksne.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Skal tas kort tid før sengetid. *Tabletter 7,5 mg:* Kan deles (delestrek).

**Pakninger og priser:** *5 mg:* 10 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 72,50 (trin­npris: kr 66,10). 30 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 97,50 (trin­npris: kr 85,30). 100 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 185,00 (trin­npris: kr 119,70). 500 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 684,80. *7,5 mg:* 10 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 77,50 (trin­npris: kr 66,10). 30 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 112,50 (trin­npris: kr 85,30). 100 stk.<sup>1</sup> (endose) kr 235,00 (trin­npris: kr 121,20). 500 stk.<sup>1</sup> (boks) kr 935,20.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se N05C F01\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Imovane «sanofi-aventis»

## Zyloric «Aspen»

C **Hemmer av urinsyreproduksjonen.** ATC-nr.: M04A A01

T **TABLETTER 100 mg og 300 mg:** Hver tablett inneh.: Allopurinol 100 mg, resp. 300 mg, laktose, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** Arthritis urica og andre tilstander med hyperurikemi. Som profylakse mot og ev. behandling av urinsyrenefropati ved intensiv behandling med cytostatika eller radioterapi samt ved andre tilstander med økt nukleoproteinnedbrytning. Behandling og profylakse ved gjentatte tilfeller av kalsiumoksalat-/fosfatnyrestensanfall hos pasienter med hyperurikemi, urinsyrenefropati eller med tendens til å danne uratstener.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Svelges med 1 glass vann. Kan tas 1 gang daglig etter mat. Dersom daglig dosering overstiger 300 mg og gastrointestinal intoleranse påvises, kan et oppdelt doseregime være nødvendig. Kan deles (delestrek), men delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tablettene og ikke for å dele den i like doser.

**Pakninger og priser:** 100 mg: 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 80,20. 300 mg: 100 stk.<sup>1</sup> (blister) kr 173,20.

**Refusjon:**

<sup>1</sup>Se M04A A01\_1 i Refusjonslisten.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Allopur «Takeda»

## Zyrona «Orifarm Generics»

C **Antiandrogen + østrogen.** ATC-nr.: G03H B01

**TABLETTER, drasjerte:** Hver tablett inneh.: Cyproteronacetat 2 mg, etinyløstradiol 35 µg, laktose, sukrose, glyserol, hjelpestoffer.

**Indikasjoner:** Behandling av moderat til alvorlig akne forbundet med androgen følsomhet (med eller uten seboré) og/eller hirsutisme, hos kvinner i fertil alder. Skal kun brukes for behandling av akne hvis topikal behandling eller systemiske antibiotikabehandlinger ikke har lyktes. Er også et hormonelt prevensjonsmiddel, og skal ikke brukes i kombinasjon med andre hormonelle prevensjonsmidler.

**Dosering:** Se SPC. **Administrering:** Tas som angitt på pakningen, hver dag til ca. samme tid. 1 tablett tas daglig i 21 etterfølgende dager. Etter 7-dagers tablettfri periode starter man med nytt brett dagen etter. En bortfallsblødning inntreer normalt 2-3 dager etter at siste tablett er tatt, og kan fortsatt pågå ved begynnelse på neste brett. Se SPC/pakningsvedlegg for beskrivelse av behandlingsoppstart/inkl. ev. overgang fra annen prevensjon.

**Pakninger og priser:** 3 × 21 stk. (kalenderpakn.) kr 136,50.

**Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:**

Diane «Bayer AB»