PASIENTKORT

Apixaban Teva (apiksaban)

Dette kortet skal du/barnet/omsorgspersonen ha med seg til enhver tid

Vis dette kortet til apoteket, tannlegen og annet helsepersonell før behandling.

Jeg får antikoagulasjonsbehandling med Apixaban Teva (apiksaban) for å forebygge blodpropp.

Vennligst fyll ut denne delen eller be legen om å gjøre det

Navn:

Fødselsdato:

Indikasjon:

Dose: mg to ganger daglig

Legens navn:

Legens telefonnummer:

Informasjon til pasienter/omsorgspersoner

- Ta/gi Apixaban Teva regelmessig som du har fått beskjed om. Dersom du glemmer å ta/gi en morgendose, ta/gi den så snart du husker det, og den kan tas/gis sammen med kveldsdosen. En glemt kveldsdose kan bare tas/gis i løpet av samme kveld. Ikke ta/gi to doser neste morgen, men fortsett i stedet å følge doseringsplanen to ganger daglig som anbefalt neste dag.
- Ikke avbryt behandling med Apixaban Teva uten å ha snakket med legen, da det er en risiko for at du/pasienten kan få slag/blodpropp eller andre komplikasjoner.

- Apixaban Teva hjelper til med å fortynne blodet. Dette kan imidlertid føre til økt risiko for blødning.
- Tegn og symptomer på blødning inkluderer blåmerker eller blødninger under huden, tjærefarget avføring, blod i urinen, neseblod, svimmelhet, tretthet, blekhet eller svakhet, plutselig kraftig hodepine, opphosting av blod eller oppkast av blod.
- Dersom blødningen ikke stopper av seg selv, **ta kontakt med lege/legevakt øyeblikkelig**.
- Dersom du/pasienten skal opereres eller gjennomgå annen invasiv behandling, informer legen om at du/pasienten bruker Apixaban Teva.

Informasjon til helsepersonell

- Apixaban Teva (apiksaban) er et oralt antikoagulasjonsmiddel som virker ved direkte selektiv hemming av faktor Xa.
- Apixaban Teva kan øke risikoen for blødning. Apixaban Teva skal seponeres umiddelbart dersom en alvorlig blødning oppstår.
- Behandling med Apixaban Teva krever ikke rutinemessig overvåking av eksponering. En kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-analyse kan være nyttig i helt spesielle tilfeller, f.eks. ved overdose og akuttkirurgi (koagulasjonstester som protrombintid (PT), internasjonalt normalisert ratio (INR) og aktivert partiell tromboplastintid (aPTT) anbefales ikke) - se SmPC.
- Et middel som reverserer anti-faktor Xa-aktiviteten til apiksaban er tilgjengelig for voksne. Midlets sikkerhet og effekt er imidlertid ikke fastslått hos pediatriske pasienter (se preparatomtalen for andeksanet alfa).

teva

317267_s1C 12-6-26 D2.0.pdf, Cycle:2, Status:Null