

Aripiprazol Accord 5, 10, 15 og 30 mg tabletter

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FOR PASIENTER OG OMSORGSPERSONER

Aripiprazol tilhører en gruppe legemidler som kalles antipsykotiske legemidler.

Det brukes blant annet til behandling av ungdom som er 13 år og eldre, som har en tilstand som kjennetegnes ved symptomer som å føle seg «høy», ha store mengder energi, ha mye mindre behov for søvn enn det som er normalt, snakke veldig raskt og ha mange idéer og av og til være veldig irriterbar.

Hensikten med dette opplæringsmaterialet er at du bruker Aripiprazol riktig, er oppmerksom på eventuelle bivirkninger, og vet hva du skal gjøre i slike situasjoner. Du finner flere opplysninger om Aripiprazol i pakningsvedlegget som ligger i legemiddelpakningen. Yngre pasienter har økt risiko for bivirkninger forbundet med aripiprazole. Aripiprazol er derfor ikke anbefalt til bruk hos pasienter som er yngre enn 13 år.

Dosen av aripiprazole beregnes til mellom 10 mg og 30 mg én gang daglig med eller uten mat.

Behandlingen bør starte med 2 mg i 2 dager og deretter bør dosen økes langsomt opp til en daglig dose på 10 mg. Behandlingen skal ikke pågå i mer enn 12 uker.

Det er ikke sett økt nytte med doser over 10 mg daglig. Doser over 10 mg daglig kan gi bivirkninger som:

- vektøkning,

- stive muskler, ustødige eller skjelvende bevegelser (såkalt ekstrapyramidalt syndrom), inkludert muskelrykninger, ukontrollerte bevegelser i armer og bein (tardive dyskinesier)
- søvnighet (somnolens) / tretthet (fatigue)

Rådfør deg med legen din før du tar dette legemidlet dersom du har:

- høyt blodsukker (kjennetegnet ved symptomer slik som overdreven tørste, store mengder urin, økt matlyst og slapphet) eller forekomst av diabetes i familien
- anfall
- ufrivillige, uregelmessige muskelbevegelser, spesielt i ansiktet
- hjerte- og karsykdom, forekomst av hjerte-karsykdom i familien, dersom du har slag eller «minislag» eller unormalt blodtrykk
- blodpropp eller forekomst av blodpropp i familien, siden bruk av antipsykotika er forbundet med dannelsen av blodpropp
- tidligere tilfeller av overdreven gambling

Informer legen din hvis du merker at du går opp i vekt, utvikler uvanlige bevegelser, opplever søvnighet som påvirker vanlig daglig aktivitet, får problemer med å svelge eller får allergisymptomer.

Si straks ifra til legen din dersom du har tanker eller følelser om å skade deg selv.

Selv mordstanker og selvmordsforsøk er rapportert under behandling med aripiprazol.

Si straks ifra til legen din hvis du har muskelstivhet eller det er muskler du ikke kan bevege og du samtidig har høy feber, svette, endret sinnstilstand eller svært rask eller uregelmessig hjerterytme.

Dersom du får noen av disse symptomene skal du ikke slutte å ta dette legemidlet eller bruke andre legemidler til behandling av symptomene uten at dette først er avtalt med legen.

Du finner flere opplysninger om Aripiprazol i pakningsvedlegget som ligger i legemiddelpakningen.