

Pasientkort:

- Fyll ut kontaktinformasjonen i pasientkortet og erstatt den ved behov
- Sørg for at pasienten/omsorgsperson får pasientkortet og diskuter innholdet ved **hver årlige (minst) konsultasjon under behandling**
- Instruer pasienten/omsorgsperson til å vise dette kortet til alle leger og annet helsepersonell som er involvert i medisinsk behandling (f.eks. ved akutte medisinske hendelser)
- Minn pasienten på å kontakte lege ved symptomer på leverproblemer eller infeksjoner som angitt i pasientkortet
- Rådgi og informer kvinner som kan bli gravide, inkludert ungdommer/deres foreldre/omsorgspersoner om potensielle risikoer for fosteret før behandling og regelmessig etter

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av teriflunomid er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for teriflunomid kontinuerlig.

- Helsepersonell bes melde enhver mistenkte bivirkning på elektronisk meldeskjema: www.dmp.no/meldeskjema.

Pasienten har blitt informert om og har forstått informasjonen om nytte/risiko forbundet med denne behandlingen

Forskrivers navn: _____

Forskrivers signatur: _____

Once-daily
AUBAGIO[®]
(teriflunomide)

OPPLÆRINGSMATERIELL/ DISKUSJONSGUIDE FOR HELSEPERSONELL



- Snakk med pasientene om informasjonen nedenfor angående følgende risikoer
- Se oppdatert preparatomtale (SPC) og opplæringsmaterieell på www.felleskatalogen.no
- Helsepersonell bes melde nye, uventede og alvorlige mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema: www.dmp.no/meldeskjema
- Bivirkninger kan også meldes til Sanofi på e-post (medinfo-norge@sanofi.com) eller på telefon (469 18 001 kl. 10-14)

Pasientens navn:		Pasientens alder:	
Dato for første legebesøk:	Pasientens kjønn: <input type="checkbox"/> Mann <input type="checkbox"/> Kvinne		
Dato for første forskrivning:	Dagens dato:		



Fullstendig blodtelling

- ❑ Risiko for redusert antall blodceller (påvirker hovedsakelig hvite blodceller)
- ❑ Fullstendig blodtelling før oppstart av behandling og under behandlingen ved behov avhengig av kliniske tegn og symptomer



Infeksjoner/Alvorlige infeksjoner

- ❑ Risiko for (alvorlige opportunistiske) infeksjoner
- ❑ Lege må kontaktes ved symptomer på infeksjon eller om pasienten tar andre legemidler som påvirker immunsystemet
- ❑ Vurder en akselerert eliminasjonsprosedyre ved alvorlig infeksjon



Blodtrykk

- ❑ Risiko for høyt blodtrykk
- ❑ Sjekk blodtrykket før oppstart av behandling og regelmessig under behandlingen
- ❑ Lege må kontaktes ved utvikling av høyt blodtrykk



Leverbivirkninger

- ❑ Risiko for leverbivirkninger
- ❑ Sjekk leverfunksjonen før oppstart av behandlingen og regelmessig under behandlingen
- ❑ Tegn og symptomer på leversykdom
- ❑ Lege må kontaktes umiddelbart ved symptomer



Kvinner som kan bli gravide, inkludert ungdom

- ❑ Potensiell risiko for teratogenitet
- ❑ Sjekk graviditetsstatus før behandling
- ❑ Sjekk potensialet for graviditet hos alle fertile kvinner inkludert pasienter under 18 år
- ❑ Graviditet skal utelukkes
- ❑ Sikker prevensjon skal brukes før oppstart, under og etter behandling
- ❑ Lege skal kontaktes umiddelbart hvis de stopper å bruke prevensjon, eller før de endrer prevensjon
- ❑ Behandling med Aubagio skal avbrytes ved graviditet og lege kontaktes
- ❑ Vurder akselerert eliminasjonsprosedyre
- ❑ Rapportér ethvert tilfelle av graviditet til Sanofi ved å ringe 469 18 001 (kl. 10-14) eller ved å besøke www.sanofi.no, uavhengig av det observerte utfallet.
- ❑ Kontakt Sanofi for informasjon om måling av teriflunomid-plasmakonsentrasjon.

Foreldre/omsorgspersoner

- ❑ Foreldre/omsorgspersoner må kontakte lege med én gang jenta får menstruasjon