Generell informasjon:

- Dersom du opplever medisineringsfeil eller bivirkninger under behandling med Awiqli®, skal dette rapporteres umiddelbart til Novo Nordisk (se kontaktinformasjon under) eller direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du trenger hjelp.
- Dersom du bruker flere enheter Awiqli® enn du skal, kan blodsukkernivået bli for lavt. Kontroller blodsukkeret ditt, og hvis nødvendig spis glukosetabletter eller et annet mellommåltid med høyt sukkerinnhold som søtsaker, kjeks eller fruktjuice.
- Se rådene bakerst i pakningsvedlegget, som du finner i pakningen med Awiqli®, for informasjon om hva du skal gjøre dersom blodsukkernivået ditt blir for høyt eller for lavt.
- For å unngå feildosering eller mulig overdosering, skal du aldri bruke en sprøyte til å trekke oppløsningen opp fra pennen.
- Bruk alltid dosetelleren og dosepekeren for å velge dose, og juster dosevelgeren nøyaktig for å innstille den foreskrevne dosen med Awiqli®. Ikke tell penneklikkene for å velge dose.
- Dersom du er blind eller har dårlig syn, og ikke har muligheten til å lese bruksanvisningen, skal du ikke bruke pennen uten hjelp. Sørg for å få hjelp fra en person med godt syn som har fått opplæring i bruk av Awiqli® pennen.
- Dersom pennen ikke virker som den skal må du ikke bruke den. Kontakt ditt apotek eller Novo Nordisk (se kontaktinformasjon under).
- Dersom du har spørsmål, kontakt legen din.

Ytterligere informasjon

Se oppdatert pakningsvedlegg, preparatomtale (SmPC) og opplæringsmateriell på www.felleskatalogen.no.

Awiqli® og FlexTouch® er registrerte varemerker eiet av Novo Nordisk A/S
© Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark

Novo Nordisk Norway AS
Nydalsveien 28, NO-0484 Oslo

Telefon: + 47 22 18 50 50
www.novonordisk.no

Versjon 1.0 oktober 2026

Sikkerhetsinformasjon ! Etter krav fra Direktoratet for medisinske produkter

Introduksjon til ▼Awiqli®

insulin ikodek (insulin icodec), injeksjonsvæske


Veiledning til ukentlig behandling med Awiqli® og dosejustering ved overgang til behandling med Awiqli®

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning: www.dmp.no/pasientmelding

88229675 Awiqli patient sikkerhedsinfo_A5.indd 1-2
29/10/2026 13.43

Du har fått forskrevet Awiqli® for behandling av din diabetes.

Denne brosjyren gir informasjon om Awiqli® for å hjelpe deg med å ta behandlingen riktig én gang i uken og unngå medisineringsfeil.



Hva er Awiqli® og hva brukes det mot?

- Awiqli® er et ukentlig basalinsulin som brukes til å behandle diabetes hos voksne. Det er et langtidsvirkende insulin som du kun trenger å injisere én gang per uke for å kontrollere blodsukkernivået ditt.
- Awiqli® skal kun brukes én gang per uke. Forsikre deg om at du følger den ukentlige doseringsplanen nøyaktig slik legen din har foreskrevet.

Hva er medisineringsfeil?

Når du bruker Awiqli®, er det viktig at du er oppmerksom på at det kan oppstå medisineringsfeil.

- Medisineringsfeil kan oppstå som følge av utilsiktet forveksling mellom Awiqli® og andre insuliner, særlig hurtigvirkende insuliner.
- Medisineringsfeil kan også oppstå dersom Awiqli® doseres feil ved overgang fra daglige basalinsuliner til Awiqli® én gang per uke, eller dersom du bruker eller har brukt andre injiserbare diabeteslegemidler som tas én gang per uke.
- Snakk med legen din om hvordan du kan kjenne igjen forskjellene i utseende mellom Awiqli® og andre insulinpenner.
- Før du begynner å bruke Awiqli®, må du nøye lese instruksjonene i pakningsvedlegget som følger med Awiqli® pakningen.

Unngå forveksling:

- Dersom du bruker mer enn én type insulin, må du alltid forsikre deg om at du bruker riktig produkt ved å kontrollere produktets navn og styrke før hver injeksjon. Før du injiserer Awiqli®, må du forsikre deg om at etiketten på pennen viser Awiqli® 700 enheter/ml.
- Pennen kan gi en dose på 10 til 700 enheter Awiqli® i én injeksjon, i trinn på 10 enheter.
- I motsetning til andre insulinpenner, hvor dosen kan justeres i trinn på 1 eller 2 enheter om gangen, kan dosen på pennen med Awiqli® justeres i trinn på 10 enheter om gangen.
- Kontroller alltid hvor mange enheter som er valgt før du injiserer det ukentlige insulinet ditt.

For deg som bruker eller har brukt andre injiserbare diabeteslegemidler som tas én gang per uke

- Dersom du bruker eller har brukt et annet injiserbart diabeteslegemiddel som tas én gang per uke, må du passe ekstra på når du velger dosen med Awiqli® pennen. Dette fordi måten du velger dosen med Awiqli® på, er annerledes enn for andre injiserbare diabeteslegemidler som tas én gang per uke.
- Forsikre deg om at du har forstått instruksjonene om dosering og bruk som du har fått fra legen før du bruker Awiqli® pennen.
- Forsikre deg om at du alltid velger riktig dose med Awiqli® pennen slik legen din har foreskrevet.
- Før du injiserer, må du kontrollere antall enheter som er innstilt på pennen, dette for å unngå feildosering og utilsiktet overdosering.
- Velg aldri maksimal enkeltdose (700 enheter) på din Awiqli® penn med mindre dette er din foreskrevne dose.
- Dersom du er usikker når det gjelder dosering med Awiqli® én gang per uke, må du kontakte lege eller apotek.

Bytte til Awiqli® fra andre basalinsuliner

- Ved overgang fra insulin som tas én eller to ganger daglig til Awiqli®, vil legen fastsette den ukentlige dosen din basert på den nåværende basalinsulindosen din, blodsukkernivået ditt og andre relevante faktorer.
- Legen kan velge å forskrive en høyere startdose av Awiqli® basert på behovet ditt for blodsukkerkontroll. Denne høyere dosen gjelder kun for den første injeksjonen, og skal ikke brukes ved den andre injeksjonen eller ved senere injeksjoner.
- Før hver injeksjon skal du alltid kontrollere at du har valgt den foreskrevne dosen av Awiqli®. Dette er spesielt viktig ved den første injeksjonen og ved den andre injeksjonen. Kontroller også alltid hvor mange enheter som er valgt.
- Ved overgang til Awiqli®, og i ukene etter overgangen, bør du måle blodsukkernivået ditt oftere enn vanlig.