

Pasientveiledning for behandlingen med ▼ Beovu® (brolucizumab)

Hva er neovaskulær (våt) aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD)?

Våt AMD forekommer når unormale blodårer dannes og vokser under makula. Makula er en del av netthinnen bakerst i øyet og er ansvarlig for klart syn. De unormale blodkarene kan lekke væske eller blod inn i øyet, og dette kan forstyrre funksjonen til makula og føre til nedsatt syn.

Hvorfor har Beovu blitt foreskrevet til meg?

Beovu inneholder et virkestoff som tilhører en gruppe legemidler som kalles anti neovaskulerende midler. Legen injiserer Beovu i øyet ditt (intravitreal injeksjon) for å behandle våt AMD hos voksne.

Årsaken til veksten av blodkar i øyet er en forbindelse som kalles vaskulær endotel vekstfaktor-A (VEGF A). Beovu bindes til VEGF-A og blokkerer denne veksten. Dermed reduseres veksten av unormale blodkar i våt AMD, noe som på sin side reduserer lekkasje av væske eller blod inn i øyet.

Etter behandlingen

- Legen vil gjøre noen undersøkelser av øyet etter injeksjonen. Disse undersøkelsene kan være måling av trykket inne i øyet eller vurdering av tilstanden til synsnerven.
- Etter en intravitreal injeksjon som Beovu, kan følgende forekomme:
 - En mindre vanlig men alvorlig betennelse inne i øyet kalt endoftalmitt
 - En mindre alvorlig type betennelse kalt intraokulær betennelse
 - En allergisk reaksjon (immunrespons)
 - En midlertidig økning i trykket i øyet. Denne økningen er vanlig, men har vanligvis ingen symptomer

▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 i pakningsvedlegget for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.

Etter behandlingen (forts.)

- Det kan forekomme netthinneløsning (mindre vanlig) eller rift i netthinnen (vanlig)
- Det er viktig å kontakte lege snarest mulig dersom du opplever noen av følgende symptomer:
 - Plutselig nedsatt eller endret syn, inkludert et økt antall små partikler (fluer eller svarte flekker) i synsfeltet
 - Smerte, økt ubehag, eller rødhet i øyet
 - Lysglimt

Hva kan jeg gjøre etter behandlingen?

- Etter en injeksjon med Beovu kan du oppleve midlertidige synsproblemer (for eksempel tåkesyn). Du må ikke kjøre bil eller bruke maskiner så lenge det vedvarer.
- Husk å fortelle legen eller sykepleieren hvis du merker noen forandringer i synet ditt. Det er viktig å komme til avtalte kontroller hos legen din.

For mer informasjon, les pakningsvedlegget.

Det kan også søkes opp på www.Felleskatalogen.no.

Kontaktinformasjon til øyeklinikken:

Kontaktperson: _____

Telefon: _____

Adresse: _____

E-post: _____