

Ha alltid dette kortet med deg, og vis dette kortet til alle leger som gir deg behandling.

## Infeksjoner

CIMZIA® gir økt risiko for å få infeksjoner. Infeksjonene kan utvikle seg raskere og være mer alvorlige. Dette gjelder også tuberkulose, som først og fremst forekommer i lungene (pulmonal tuberkulose). I noen tilfeller kan tuberkulose oppstå i et annet organ (ekstrapulmonal tuberkulose) eller i flere organer samtidig (disseminert tuberkulose).

### Før behandling med CIMZIA®

- Du må ikke behandles med CIMZIA® dersom du har en alvorlig infeksjon.
- Du bør testes for hepatitt B-infeksjon. Dersom du er bærer av hepatitt B-virus bør du overvåkes nøye med hensyn til tegn og symptomer på aktiv hepatitt B-infeksjon. Behandlingen med CIMZIA® bør stoppes hos pasienter som utvikler en aktiv hepatitt B-infeksjon.
- Du bør testes for tuberkulose. Det er svært viktig at du sier fra til legen hvis du noen gang har hatt tuberkulose, eller hvis du har hatt nær kontakt med noen som har hatt tuberkulose.

Skriv ned datoen for siste tuberkulosestest nedenfor

Tuberkulintest/IGRA-test: \_\_\_\_\_

Røntgen av brystregionen: \_\_\_\_\_

## Under behandling med CIMZIA®

- Søk medisinsk hjelp umiddelbart dersom du utvikler symptomer som tyder på en infeksjon, som feber, vedvarende hoste, vekttap eller trøtthet.

## Hjertesvikt

### Før behandling med CIMZIA®

- Leger bør utvise forsiktighet hos pasienter med hjertesvikt. Du må ikke bruke CIMZIA® dersom du har moderat til alvorlig hjertesvikt.

### Under behandling med CIMZIA®

- Søk medisinsk hjelp umiddelbart dersom du utvikler symptomer som kan ha sammenheng med hjertesvikt (f.eks. kortpustethet eller hevelser i føttene).

## Allergiske reaksjoner

Dersom du får symptomer som kan skyldes allergiske reaksjoner, som tetthet i brystet, hvesing, svimmelhet, hevelser eller utslett, skal du slutte å bruke CIMZIA® og kontakte legen umiddelbart. Noen av disse reaksjonene kan oppstå etter at CIMZIA® er gitt for første gang.

### Pasienter som får vaksiner

Vær oppmerksom på at levende eller svekkede vaksiner ikke bør gis samtidig med CIMZIA®.

### Pasienter som må opereres

Dersom du må gjennomgå en operasjon under behandling med CIMZIA® bør du overvåkes nøye med hensyn til infeksjon, og passende tiltak bør igangsettes etter behov.

### Ondartede tilstander

Bruk av anti-TNF-behandling kan øke risikoen for kreft. Søk medisinsk hjelp umiddelbart dersom du får uforklarlig vekttap eller utmattelse (fatigue). Disse symptomene alene betyr imidlertid ikke nødvendigvis kreft.

Dette pasientkortet inneholder viktige sikkerhetsopplysninger som du må være oppmerksom på før du får CIMZIA® og under behandlingen med CIMZIA®.

For flere sikkerhetsopplysninger, se pakningsvedlegget som ligger i CIMZIA-pakningen.

CZF-OTI-025518-092013

13-MA-0047, NOV 2013

© 2009-2012 UCB Pharma SA. All rights reserved



UCB Pharma AS  
Grini Næringspark 8B  
1361 Østerås  
Norge

## Interaksjon med tester

Du bør informere legen hvis du får behandling med såkalte blodfortynnende legemidler (antikoagulanter), eller hvis det skal gjøres en blodlevringstest.

Påvirkning på enkelte blodlevringstester (koagulasjonsassay) er sett hos pasienter som er behandlet med CIMZIA®. CIMZIA® kan forårsake at disse testene feilaktig viser forlenget blodlevringstid selv om dette ikke er tilfelle. Denne effekten er sett med PTT-LA-test og STA-PTT A-tester fra Diagnostica Stago og "HemosIL APTT-SP liquid"- og "HemosIL lyophilised silica"-tester fra Instrumentation Laboratories. Andre aPTT-tester kan også bli påvirket. Det er ikke sett påvirkning på tester for trombintid (TT) og protrombintid. Det er ingen holdepunkter for at behandling med CIMZIA® påvirker blodlevringen (blodkoagulasjonen som skjer i kroppen).

Alle leger som behandler denne pasienten bør konsultere preparatomtalen for CIMZIA®.

## Datoer for behandling med CIMZIA®

Første injeksjon:

Påfølgende injeksjoner: \_\_\_\_\_

Pasientens navn:

Fastlegens navn og telefon:

Spesialistens navn og telefon: \_\_\_\_\_

- Se pakningsvedlegget for CIMZIA® for ytterligere informasjon.
- Sørg for at du ved alle besøk hos helsepersonell også har med deg en liste over alle de andre legemidlene du bruker.

Ha dette kortet med deg i 5 måneder etter den siste dosen med CIMZIA®, fordi bivirkningene kan oppstå lenge etter den siste dosen.



# CIMZIA®

## Pasientkort

### Viktig