

Informasjonskort til pasienten:

Hva Diane brukes mot

Diane brukes til behandling av hudlidelser slik som akne, svært fet hud og unormal hårvekst hos kvinner i fertil alder. Da Diane også virker som et prevensjonsmiddel, skal det kun forskrives dersom legen din mener at behandling med et hormonelt prevensjonsmiddel er hensiktsmessig.

Du skal kun bruke Diane hvis hudlidelsen du har ikke er blitt bedre etter at du har brukt andre behandlinger mot akne, inkludert andre behandlinger til bruk på huden og antibiotika.

VIKTIG INFORMASJON OM DIANE OG RISIKO FOR BLODPROPP

Alle legemidler som inneholder både østrogen-progestagen, slik som Diane, øker den sjeldne, men alvorlige, risikoen for blodpropp. Den totale risikoen for blodpropp er liten, men de kan være alvorlige og i svært sjeldne tilfeller også dødelige.

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre.

I hvilke situasjoner er risikoen for blodpropp høyest?

- det første året som du bruker Diane (inkludert hvis du begynner på nytt etter å ha holdt opp i 1 måned eller mer)
- hvis du er overvektig (kroppsmasseindeks (BMI) på over 30 kg/m²)
- hvis du er eldre enn 35 år
- hvis du har noen i din nære familie som har hatt blodpropp i ung alder (f.eks. under 50 år)
- hvis du har født barn i løpet av de siste ukene

Hvis du røyker og er over 35 år, anbefales det på det sterkeste at du slutter å røyke eller bruker en ikke-hormonell behandling mot akne og/eller hirsutisme (mannlig hårvekst hos kvinner).

Oppsøk lege umiddelbart hvis du får noen av følgende symptomer:

- Kraftig smerte eller hevelse i ett av beina, som kan være ledsaget av ømhet, varme eller endringer i hudfargen, f.eks. at huden blir blek, rød eller blå. Det kan hende du har fått en blodpropp i beina (**dyp venetrombose**).
- Plutselig uforklarlig kortpustethet eller rask pust, alvorlig smerte i brystet som kan bli kraftigere når du puster dypt, plutselig hoste uten noen åpenbar årsak (du kan hoste opp blod). Det kan hende du får en alvorlig komplikasjon av dyp venetrombose som kalles **lungeemboli**. Dette skjer hvis blodproppen vandrer fra beinet til lungene.
- Brystsmerte, ofte akutt, men noen ganger bare ubehag, trykk, tunghet, ubehag i overkroppen som stråler ut til ryggen, kjeven, halsen eller armen sammen med en metthetsfølelse som er forbundet med fordøyelsesbesvær eller kvalme, svetting, kvalme, oppkast eller svimmelhet. Det kan hende du har fått et **hjerteinfarkt**.
- Svakhet eller nummenhet i ansikt, arm eller bein, særlig på den ene siden av kroppen, problemer med å snakke eller forstå, plutselig forvirring, plutselig synstap eller tåkesyn, kraftig hodepine/migrene som er verre enn vanlig. Det kan hende du har fått et **slag**.

Vær oppmerksom på symptomer på blodpropp, særlig hvis du:

- akkurat er blitt operert
- har vært sengeliggende i lengre tid (f.eks. på grunn av skade eller sykdom, eller hvis du har beinet i gips)

- er på en lang reise (f.eks. langdistanseflyvning)

Husk å informere legen, sykepleieren eller kirurgen om at du bruker Diane hvis du:

- skal opereres eller er blitt operert
- blir spurt av helsepersonell om du bruker noen legemidler

Les det medfølgende pakningsvedlegget eller gå inn på nettsiden til Statens legemiddelverk

<http://legemiddelverket.no> for ytterligere informasjon.

Hvis du mistenker at du har en bivirkning som er forbundet med bruk av dette legemidlet, kan du rapportere det til helsepersonell eller direkte til Statens legemiddelverk.