

Patient Alert Card



Eliquis®
(apixaban)

Carry this card with
you at all times

Show this card to your pharmacist, dentist and
any other healthcare professionals that treat you.



7860

I am under anticoagulation treatment
with Eliquis (apixaban)
to prevent blood clots

Information for patients

- Take Eliquis regularly as instructed. If you miss a dose, take it as soon as you remember and continue to follow your dosing schedule.
- Do not stop taking Eliquis without talking to your doctor, as you are at risk of suffering from a stroke or other complications.
- Eliquis helps to thin your blood. However, this may increase your risk of bleeding.
- Signs and symptoms of bleeding include bruising or bleeding under the skin, tar-coloured stools, blood in urine, nose-bleed, dizziness, tiredness, paleness or weakness, sudden severe headache, coughing up blood or vomiting blood.
- If the bleeding does not stop on its own, seek medical attention immediately.
- If you need surgery or any invasive procedure, inform your doctor that you are taking Eliquis.

Juni 2021 CV-NO-2100009

January 2021

Information for healthcare professionals

- Eliquis (apixaban) is an oral anticoagulant acting by direct selective inhibition of factor Xa.
- Eliquis may increase the risk of bleeding. In case of major bleeding events, it should be stopped immediately.
- Treatment with Eliquis does not require routine monitoring of exposure. A calibrated quantitative anti-Factor Xa assay may be useful in exceptional situations, e.g., overdose and emergency surgery (prothrombin time (PT), international normalized ratio (INR) and activated partial thromboplastin time (aPTT) clotting tests are not recommended) – see SmPC.
- An agent to reverse the anti-factor Xa activity of apixaban is available.

Please complete this section or ask your doctor to do it

Name: _____

Birth Date: _____

Indication: _____

Dose: _____ mg twice daily

Doctor's Name: _____

Doctor's telephone: _____

Bristol Myers Squibb™

Pfizer

Pasientkort



Eliquis®
(apiksaban)

Ha med deg dette kortet
til enhver tid

Vis dette kortet til apoteket, tannlegen din og annet
helsepersonell som behandler deg.



7862

Informasjon til pasienter

- Ta Eliquis regelmessig som du har fått beskjed om.
Dersom du glemmer å ta en dose, ta den så snart du husker og fortsett å følge doseringsplanen din.
- Ikke avbryt behandling med Eliquis uten å ha snakket med legen din, da det er en risiko for at du kan få slag eller andre komplikasjoner.
- Eliquis hjelper til med å fortynne blodet ditt. Dette kan imidlertid føre til økt risiko for blødning.
- Tegn og symptomer på blødning inkluderer blåmerker eller blødninger under huden, tjærefarget avføring, blod i urinen, neseblod, svimmelhet, trøtthet, blekhet eller slapphet, plutselig alvorlig hodepine, opphosting av blod og oppkast av blod.
- Dersom blødningen ikke stopper av seg selv, ta kontakt med lege/legevakt øyeblikkelig.
- Dersom du skal opereres eller gjennomgå invasiv behandling, informer legen om at du bruker Eliquis.

Juni 2021 CV-NO-2100009

Januar 2021

Informasjon til helsepersonell

- Eliquis (apiksaban) er et oralt antikoagulant som virker direkte ved selektiv hemming av faktor Xa.
- Eliquis kan øke risikoen for blødning. Dersom en alvorlig blødning oppstår, skal Eliquis seponeres umiddelbart.
- Behandling med Eliquis krever ikke rutinemessig overvåking av eksponering. En kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-analyse kan være nyttig i helt spesielle tilfeller, f.eks. overdose og akutt kirurgi (protrombintid (PT), internasjonalt standardisert skala (INR) og aktivert partiell tromboplastintid (aPTT) koagulasjonstester anbefales ikke) – se SPC.
- Et middel som reverserer anti faktor Xa aktiviteten til Eliquis er tilgjengelig.

Vennligst fyll ut denne delen eller be legen din om å gjøre det

Navn: _____

Fødselsdato: _____

Indikasjon: _____

Dose: _____ mg to ganger daglig

Legens navn: _____

Legens telefonnummer: _____

Bristol Myers Squibb™

Pfizer