

Sjekkliste når du forskriver Emerade adrenalinpenn

Forklar for pasienten at:

□ Ved mangel på klinisk bedring eller ved forverring, kan det være nødvendig å administrere en ekstra dose med Emerade 5- 15 minutter etter den første injeksjonen. Det **anbefales at pasientene får foreskrevet to Emerade-penner som de skal ha med seg til enhver tid.**

□ **Når pasienten skal bruke Emerade (symptomer):**

- Kløe, spesielt under føttene, i hendene eller i hodet.
- Stikkende fornemmelse i munnen.
- Opphovning i munnen og halsen, på leppene og øynene.
- Kløe, rødming eller elveblest hvor som helst på kroppen.
- Svimmelhet, angst, kaldsvetting.
- Magesmerter, uvelhet og oppkast.
- Åndenød eller astmasymptomer.
- Plutselig svakhet, blodtrykksfall, bevisstløshet.
- Forvirring eller bevissthetstap.

Kritiske symptomer: Det er vanskelig å puste, munnen og svelget hovner opp, du blir plutselig trett og svimmel, eller du føler deg stadig dårligere.

Skulle pasienten få disse symptomene, skal hun injisere omgående adrenalin.

□ **Hvordan man bruker Emerade:**



Fjern nålbeskyttelsen.



Trykk mot låret, og det høres et klikk. Hold i 5 sekunder. Masser så injeksjonsstedet. Ring 113 og si "anafylaksi".

Iblant er en dose av adrenalin ikke tilstrekkelig for helt å stoppe en akutt allergisk reaksjon. Gjenta da injeksjonen med en ny adrenalinpenn etter 5–15 minutter.

□ **Hvilken dose har pasienten fått:**

- 150 mikrogram (gul)
- 300 mikrogram (grønn)
- 500 mikrogram (rød)

□ **Hvordan man oppbevarer Emerade:**

- Oppbevar under 25°C.
- La den ikke fryse.
- Oppbevares i originalforpakning.
- Oppbevar Emerade separat fra treningspenn for å unngå forveksling.
- Kontroller løsningen regelmessig, gjennom å løfte etiketten over visningsvinduet på adrenalinpennen, for å sikre at løsningen er klar og fargeløs. Kasser og erstatt Emerade om løsningen är missfarget eller inneholder en utfellelse.

□ **Gi treningspenn og pasientbrosjyre til pasienten.**

□ **Påminn pasienten om å se instruksjonsvideo på www.emerade.com/no.**

For ytterligere informasjon se oppdatert preparatomtale (SPC) på Legemiddelsøk hos www.legemiddelverket.no.