

# Påminnelsekort for pasienter

---

▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pakningsvedlegg for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.

*Versjon 2.0.0 - Akseptert av  
Statens legemiddelverk 29-Nov-2016*

**Erivedge**   
vismodegib ▼

Erivedge® kan skade eller føre til at ditt ufødte barn dør.

### **Kvinnelige pasienter som kan bli gravide må:**

- Alltid bruke **2 former** for anbefalt prevensjon under behandling og i 24 måneder etter siste dose (for ytterligere informasjon, vennligst se brosjyren "Erivedge graviditetsforebyggende program: Viktig sikkerhetsinformasjon om graviditetsforebygging og prevensjon for menn og kvinner som tar Erivedge").
- Ta graviditetstest hver måned for å sjekke om du er gravid.

### **Mannlige pasienter må:**

- Alltid bruke kondom (med sæddrepende middel, hvis tilgjengelig) ved samleie med kvinnelige partnere under behandling og i 2 måneder etter siste dose.
- Ikke donere sæd under behandlingen og i 2 måneder etter siste dose.

Snakk med legen din eller helsepersonell umiddelbart hvis du eller din seksualpartner har uteblitt menstruasjon, mistenker en graviditet eller er gravid.

- Kvinnelige pasienter: Snakk med legen din hvis du mistenker en graviditet mens du tar Erivedge og i løpet av 24 måneder etter din siste dose.
- Mannlige pasienter: Snakk med legen din hvis din kvinnelige partner mistenker at hun er gravid mens du tar Erivedge og i løpet av 2 måneder etter din siste dose.

### **Alle pasienter må:**

- Gi aldri dette legemidlet til noen andre.
- Ikke gi blod under behandlingen eller i 24 måneder etter siste dose.
- Leverer inn kapsler som ikke er brukt til apoteket når behandlingen er avsluttet.

## Telefonnummer ved nødkontakt:

Kontortid:

Etter kontortid: