



## PASIENTBROSJYRE

# EURneffy

(nasal adrenalinspray)

## Hvordan en alvorlig allergisk reaksjon identifiseres

Bruk nesepøyen umiddelbart ved første tegn på en alvorlig allergisk reaksjon etter eksponering for et allergen.

Symptomer kan bestå av:

- Hudkløe
- Hovent utslett (som et utslett fra brennesle)
- Rødming
- Hevelse i lepper, hals, tunge, hender og føtter
- Hvesing (pipende pust)
- Heshet
- Kortpustethet
- Kvalme
- Oppkast
- Magekramper
- Tap av bevissthet
- Engstelse
- Rask hjerterytme
- Krampeanfoll
- Diaré
- Tap av urinblærekontroll



**IKKE nøl med bruken,**  
da alvorlighetsgraden av  
symptomene kan endre seg raskt.

Sørg for at du, barnet ditt, familien din,  
omsorgspersoner, medarbeidere og lærere vet  
hvordan og når nesepøyen skal brukes.



## Oppbevaring og håndtering

Hver nesepøyen inneholder én enkelt dose adrenalin og leveres i en blisterpakning med bruksanvisning.

**Ha alltid  
2 nesepøyen  
med deg i tilfelle  
du trenger en dose  
nummer to.**



Sørg for å kontrollere utløpsdatoen regelmessig og skaffe en ny nesepøyen i god tid.

# Bruksanvisning for korrekt bruk for pasienter & omsorgspersoner


Denne bruksanvisningen er utformet for å gi råd om hva du bør gjøre i tilfelle en alvorlig allergisk reaksjon eller anafylaksi. Både pasienter og omsorgspersoner bør gjøre seg kjent med denne bruksanvisningen for å sikre at de kan gjenkjenne symptomer på en allergisk reaksjon og vite hvordan de trygt og effektivt kan administrere nesepøyen.



## 1. Hold

Hold nesepøyen som anvist. Hold nesepøyen med tommelen mot bunnen av stempelet og én finger på hver side av dysen.

*IKKE trekk i eller trykk på stempelet. Du skal IKKE forhåndsteste nesepøyen. Hver nesepøy inneholder kun én dose.*



## 2. Plasser

Sett spissen av nesepøyen inn i et nesebor til fingrene rører ved nesen. Hold den rett, pekende mot pannen.



## 3. Trykk

Trykk på stempelet med nok kraft til det presses opp og sprayer inn i neseboret.

*Nesepøyen skal IKKE holdes i vinkel mot indre eller ytre nesevegg.*

## + Etter bruk

**Ring 113 umiddelbart** for grundig overvåking av den anafylaktiske reaksjonen og i tilfelle ytterligere behandling er nødvendig. Hvis du ikke er i stand til å ringe selv, få noen andre til å ringe for deg.

## Ved bruk

Dersom det er nødvendig, kan pasienten ligge ned med føttene hevet, men sitte oppreist ved pusteproblemer. Bevisstløse pasienter skal legges på siden i stabilt sideleie for å unngå at de blir kvalt. Dersom symptomene ikke går over og dersom det er mulig, bør pasienten være sammen med en annen person inntil medisinsk hjelp ankommer.

## Overvåk pasientens symptomer

Dersom symptomene blir verre eller kommer tilbake etter ca. 10 minutter, eller i tilfelle feilbruk, skal du bruke en ny nesepøy for å gi en dose nummer to i SAMME nesebor som første dose.



## Hva er EURneffy?

En nasal adrenalinspray for voksne og barn med en kroppsvekt på 30 kg eller mer til akutt behandling av alvorlige allergiske reaksjoner, inkludert anafylaksi (plutselige, alvorlige og noen ganger livstruende allergiske reaksjoner), på insektsstikk eller -bitt, mat, legemidler og andre allergener (stoffer som forårsaker allergi) i tillegg til idiopatisk anafylaksi (anafylaksi uten kjent årsak) eller anafylaksi forårsaket av trening.

Opplæringsmateriell, inkludert en kopi av pakningsvedlegg og bruksanvisning, er tilgjengelig på nettstedet til [www.eurneffy.eu](http://www.eurneffy.eu)

### Melding av bivirkninger

Bivirkninger kan meldes på elektronisk skjema til DMP: [www.dmp.no/pasientmelding](http://www.dmp.no/pasientmelding)

**Lokal representant:**  
**ALK-Abelló Nordic**  
**Tlf: 99 44 60 40**  
**E-mail: [infono@alk.net](mailto:infono@alk.net)**