



Viktig sikkerhetsinformasjon,
din veiledning for



**EYLEA® EYLEA brukes
til behandling av
makulaødem sekundært
til retinal veneokklusjon
i sentralvene (CRVO)**



Øyelege/legesenter er:

Kontakt: _____

Telefon: _____

Adresse: _____

E-post: _____



Veiledning for Eylea

Legen din har forskrevet Eylea til deg fordi du har fått diagnosen retinal veneokklusjon i sentralvene, eller CRVO. Dette er en tilstand som medfører at det er vanskeligere å se klart. Behandling som Eylea kan bidra til å hindre at synet ditt forverres og kan bedre noen av symptomene du har.

Denne brosjyren inneholder også en audio-CD med all informasjon som finnes i denne brosjyren.

Om du velger å lese denne veiledningen eller å høre på CD, er dette materialet laget for å gi deg svar på dine spørsmål, slik at du kan få best mulig utbytte av behandlingen.

I denne brosjyren finner du:

Hva kan du forvente av behandling med Eylea

- Hvordan brukes Eylea?
- Hva hvis jeg har spørsmål om Eylea?

Hvordan du skal ta vare på øynene dine etter behandling med Eylea

- Hva kan jeg forvente?
- Når er det behov for å ta Eylea igjen?
- Er det bivirkninger ved bruk av Eylea?

Inkludert er også en kalender som hjelper deg å følge opp behandlingen med Eylea og avtaler.

Hvem kan bruke Eylea?

Eylea er til personer som har fått diagnosen CRVO.

Før oppstart av behandling med Eylea, må du fortelle legen eller sykepleieren dersom du:

- har en infeksjon i eller rundt øyet
- er rød i øyet, eller har noen form for øyesmerter
- tror du kan være allergisk overfor jod, smertestillende legemidler eller noen av de andre innholdsstoffene i Eylea
- tidligere har hatt problemer ved øyeinjeksjoner
- har grønn stær eller tidligere har hatt økt trykk i øyet
- ser eller har sett lysglimt eller flytende flekker i synsfeltet ditt
- tar andre legemidler, reseptpliktige eller reseptfrie
- er gravid, planlegger å bli gravid eller ammer. Det er ingen erfaring med bruk av Eylea hos gravide. Eylea bør ikke brukes under graviditet, rådfør deg derfor med lege før behandling med Eylea. Kvinner som kan bli gravide skal bruke sikker prevensjon under behandlingen og i minst 3 måneder etter siste injeksjon med Eylea
- har hatt eller skal ha et kirurgisk inngrep i øyet i perioden 4 uker før eller etter behandling med Eylea

Hvilke forberedelser bør jeg gjøre før behandlingstimen med Eylea?

Det kan hende legen din ber deg bruke øyedråper i noen dager før behandlingstimen. Etter behandlingen kan synet ditt være tåkete og du bør derfor ikke kjøre hjem.

Planlegg gjerne slik at en venn eller et familiemedlem kan ta deg med til timen din eller ordne transport til og fra på annen måte. Bruk ikke sminke på behandlingsdagen.

Hva skjer under behandlingstimen med Eylea?

En lege eller sykepleier vil gjøre deg klar for behandling med Eylea. Disse personene er høyt kvalifiserte fagfolk med erfaring i behandling av CRVO. De er klar over at behandlingsprosedyren kan høres skremmende ut og vil ta ekstra godt vare på deg for å sørge for at du er avslappet og komfortabel.

Du vil få øyedråper som virker som lokalbedøvelse, og øyet ditt og huden rundt vil bli rengjort med en øyeskyllevæske. Ansiktet ditt vil bli tildekket med en spesiell duk og øyet ditt vil bli holdt åpent. Øyedråpene vil gjøre synet ditt tåkete slik at du ikke vil se nålen.

En erfaren lege vil så sette injeksjonen inn i det hvite i øyet ditt. De fleste sier at injeksjonen er uten smerter og noen sier at de kan kjenne et lett trykk. Hele prosedyren kan føles litt ubehagelig, men den er over på få minutter.

Hva hvis jeg er bekymret eller har spørsmål?

Hvis du er bekymret eller har spørsmål bør du snakke med legen eller sykepleieren. De har svært mye erfaring og kjenner din individuelle situasjon slik at de kan svare deg.

Ikke vær redd for å spørre eller ta opp ting som bekymrer deg. Legen eller sykepleieren kan gi deg svar og berolige deg.

Hva skjer etter behandlingstimen med Eylea?

Det kan hende legen din vil utføre noen øyetester etter injeksjonen. Dette kan omfatte et lett puff med luft som brukes når trykket i øyet ditt måles. Etter injeksjonen vil synet ditt være tåkete, så du bør ikke planlegge å kjøre bil før synet ditt er normalt igjen.

De neste dagene kan du få et blodskutt øye eller se flekker som beveger seg i synsfeltet ditt. Begge deler bør forsvinne i løpet av noen få dager, og dersom de ikke forsvinner eller de forverres, bør du kontakte legen din.

Noen personer kan få lette smerter eller ubehag i øyet etter injeksjonen. Hvis smertene/ubehaget ikke forsvinner eller dette forverres, bør du kontakte legen din.

Når må jeg tilbake til ny behandlingstid?

Legen din vil sette opp en tid for din neste behandling med Eylea. Videre behandlingsplan blir satt opp for å møte dine individuelle behov.

Husk at du bør snakke med legen eller sykepleieren dersom du har spørsmål om behandlingen.

Snakk med legen før du avbryter behandlingen med Eylea.

Har Eylea bivirkninger?

Som alle legemidler, både reseptpliktige og reseptfrie, kan Eylea forårsake bivirkninger. Ikke alle som bruker Eylea vil få bivirkninger.

Bivirkninger kan omfatte:

- *Infeksjon inne i øyet:* Øyesmerter eller økt ubehag. Forverring av rødhet i øyet, følsomhet overfor lys, hevelse og synsendringer som plutselig nedsatt syn eller tåkesyn.
- *Infeksjon inne i øyet:* Øyesmerter eller økt ubehag. Forverring av rødhet i øyet, følsomhet overfor lys, hevelse og synsendringer som plutselig nedsatt syn eller tåkesyn.
- *Blakking av linsen (katarakt):* Skygger i synsfeltet, mindre klare linjer og former eller dårligere fargesyn.
- *Økt trykk i øyet:* Halo (ringer) rundt lys. Rødt øye, kvalme, oppkast og synsendringer.
- *Rift eller løsning av ett av lagene i netthinnen:* Plutselige lysglimt, en plutselig forekomst eller økning i antallet flytende flekker i synsfeltet, en gardinlignende effekt i deler av synsfeltet og synsendringer.

Kontakt legen din umiddelbart dersom du opplever noen av disse bivirkningene.



Audio-CD

*For fullstendig liste over bivirkninger,
se pakningsvedlegget som er vedlagt pasientbrosjyren.*



Bayer AS, Postbox 193, 1325 Lysaker
Telefon: 23 13 05 00
Fax: 24 11 19 90

*Eylea CRVO pasient veiledning v. 6.0 2017/08,
sist godkjent av SLV 2015/10*