

Fingolimod Accord

Graviditetsspesifikt pasientkort

Før oppstart av behandling med Fingolimod Accord

- Fingolimod Accord (fingolimod) er kontraindisert hos gravide kvinner og fertile kvinner (inkludert jenter i ungdomsalder) som ikke bruker sikker prevensjon.
- Legen din vil informere deg om risikoen for fosterskade og nødvendige tiltak ved behandlingsstart, og deretter ved jevne mellomrom, for å minimere denne risikoen.
- Det må tas en graviditetstest, og negativt resultat må bekreftes av lege før behandlingen starter.
- Legen din vil informere deg om viktigheten av å bruke sikker prevensjon mens du får behandling og i 2 måneder etter avsluttet behandling. Snakk med legen din om hva som er den mest effektive prevensjonsmetoden for deg.
- Les pakningsvedlegget for Fingolimod Accord som du får av legen din.

Mens du er under behandling med Fingolimod Accord

- Kvinner må unngå å bli gravide mens de behandles med Fingolimod Accord.
- Pasientene må bruke sikker prevensjon mens de tar Fingolimod Accord.
- Kvinner må unngå å bli gravide mens de behandles med Fingolimod Accord og i 2 måneder etter avsluttet behandling.
- Graviditetstester bør gjentas med passende intervaller.
- Legen din vil sørge for regelmessig rådgivning angående den alvorlige risikoen for fosterskade ved bruk av Fingolimod Accord.
- Dersom du blir gravid eller ønsker å bli gravid, må du rådføre deg med legen din fordi det er nødvendig å avslutte behandlingen med Fingolimod Accord.

Mens du behandles med Fingolimod Accord

- Dersom du blir gravid, vil legen din gi deg råd og veiledning.
- Legen din vil gi deg medisinske råd angående de skadelige effektene som Fingolimod Accord har på fosteret og vil gi deg en vurdering av det mulige utfallet.
- Det bør gjøres en ultralydundersøkelse, og behandling med Fingolimod Accord vil bli avsluttet

Etter avsluttet behandling med Fingolimod Accord

- Informer legen din umiddelbart dersom du tror at MS-sykdommen blir verre (f.eks. svakhet eller synsforandringer) eller hvis du merker nye symptomer etter at du har avsluttet behandlingen med Fingolimod Accord på grunn av graviditet.
- Det er nødvendig å bruke sikker prevensjon i 2 måneder etter avsluttet behandling med Fingolimod Accord fordi det tar så lang tid før Fingolimod Accord er ute av kroppen din.

Rapportering av bivirkninger kan også gjøres via Direktoratet for medisinske produkter,
www.dmp.no/pasientmelding

For mer informasjon om Fingolimod Accord, se pakningsvedlegget. Det kan også søkes opp på
www.felleskatalogen.no.