



Fingolimod Teva (fingolimod): Graviditetsspesifikt pasientkort

Før opstart av behandling med Fingolimod Teva



Fingolimod Teva (fingolimod) er kontraindisert hos gravide kvinner og fertile kvinner (inkludert jenter i ungdomsalder) som ikke bruker sikker prevensjon.

Legen din vil informere deg om risikoen for fosterskade og nødvendige tiltak ved behandlingsstart, og deretter ved jevne mellomrom, for å minimere denne risikoen.

Det må tas en graviditetstest, og negativt resultat må bekreftes av lege før behandlingen starter.

Legen din vil informere deg om viktigheten av å bruke sikker prevensjon mens du får behandling og i 2 måneder etter avsluttet behandling. Snakk med legen din om hva som er den mest effektive prevensjons- metoden for deg.

Les pakningsvedlegget for Fingolimod Teva som du får av legen din.

Mens du er under behandling med Fingolimod Teva

Kvinner må unngå å bli gravide mens de behandles med Fingolimod Teva. Pasientene må bruke sikker prevensjon mens de tar Fingolimod Teva. Kvinner må unngå å bli gravide mens de behandles med Fingolimod Teva og i 2 måneder etter avsluttet behandling.

Graviditetstester bør gjentas med passende intervaller.

Legen din vil sørge for regelmessig rådgivning angående den alvorlige risikoen for fosterskade ved bruk av Fingolimod Teva.

Dersom du blir gravid eller ønsker å bli gravid, må du rådføre deg med legen din fordi det er nødvendig å avslutte behandlingen med Fingolimod Teva.

Dersom du blir gravid, vil legen din gi deg råd og veiledning.

Legen din vil gi deg medisinske råd angående de skadelige effektene som Fingolimod Teva har på fosteret og vil gi deg en vurdering av det mulige utfallet.

Det bør gjøres en ultralydundersøkelse, og behandling med Fingolimod Teva vil bli avsluttet

Etter avsluttet behandling med Fingolimod Teva

Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf. +47 6677 5590
www.tevepharm.no



Informer legen din umiddelbart dersom du tror at MS-sykdommen blir verre (f.eks. svakhet eller synsforandringer) eller hvis du merker nye symptomer etter at du har avsluttet behandlingen med Fingolimod teva på grunn av graviditet.

Det er nødvendig å bruke sikker prevensjon i 2 måneder etter avsluttet behandling med Fingolimod Teva fordi det tar så lang tid før Fingolimod er ute av kroppen din.

For mer informasjon om Fingolimod Teva, se oppdatert SPC og opplæringsmateriell på www.Felleskatalogen.no

Bivirkninger kan meldes på elektronisk skjema til DMP: www.dmp.no/pasientmelding