

Pasientkort

 **Flixabi**[®] 100 mg
influximab

NO

Vis dette kortet
til enhver lege som
er involvert i
din behandling.


SAMSUNG BIOEPIIS

 Biogen[®]

Be legen din notere
type og dato for
den/de siste
undersøkelse(n)e for
TB under:

Test: _____

Dato: _____

Resultat: _____

Lag deg også en liste
over alle andre
legemidler som du
bruker og ta denne
med til ethvert besøk
hos lege.

Liste over allergier:

Liste over andre
legemidler:

Dato for oppstart av
Flixabi-behandling:

Nåværende
administrering:

Det er viktig at du og
legen din noterer ned
handelsnavnet og
produksjonsnummeret
til legemidlene dine.

Pasientnavn:

Legens navn:

Legens telefonnummer:

Ha dette kortet med
deg i fire måneder etter
din dose med Flixabi,
eller ved graviditet, i
minst 6 måneder etter
fødselen av barnet ditt.
Bivirkninger kan oppstå
i lang tid etter din siste
dose.

Dette pasientkortet inneholder viktig sikkerhetsinformasjon som du må være oppmerksom på før og under behandling med Flixabi.

Vis dette kortet til enhver lege som er involvert i din behandling.

Vennligst les pakningsvedlegget til Flixabi nøye før du starter å bruke dette legemidlet.

Infeksjoner

Før Flixabi-behandling

- Informer legen din dersom du har en infeksjon, selv om den er mindre alvorlig.
- Det er veldig viktig at du informerer legen din dersom du noen gang har hatt tuberkulose (TB), eller hvis du har vært i nær kontakt med noen som har hatt TB. Legen din vil teste deg for å se om du har TB. Be legen din notere type og dato for din(e) siste

undersøkelse(r) for TB på kortet.

- Informer legen din dersom du har hepatitt B eller hvis du vet eller mistenker at du er bærer av hepatitt B-viruset.

Under

Flixabi-behandling

- Informer legen din umiddelbart dersom du har tegn på en infeksjon. Tegnene inkluderer feber, tretthetsfølelse, (vedvarende) hoste, kortpustethet, vekttap, nattesvette,

diaré, sår, tannproblemer, svie ved vannlating eller influensalignende symptomer.

Graviditet og vaksiner

- Hvis du fikk Flixabi da du var gravid, er det viktig at du informerer legen til barnet ditt om dette før barnet ditt får noen vaksiner. Barnet ditt bør ikke få en «levende vaksine», slik som BCG (brukes til å forebygge tuberkulose), før 6 måneder etter fødselen.