

# Pasientkort voksne

## ▼HYRIMOZ® (adalimumab)

Informasjon til deg og helsepersonell som er involvert i din behandling.

Alle mulige bivirkninger er ikke oppført på dette kortet. Vennligst les pakningsvedlegget for Hyrimoz eller snakk med legen din for mer informasjon om bivirkninger.

**Dette kortet inneholder viktig sikkerhetsinformasjon som du må være klar over før og under behandling med Hyrimoz.**

- Du må alltid ha dette kortet med deg frem til 70 dager etter siste injeksjon med Hyrimoz.
- Vis dette kortet til alle leger eller annet helsepersonell som er involvert i behandlingen din.)

Registrer informasjon om eventuelle tuberkulose tester eller behandlinger du har fått, på baksiden av dette kortet.

### Innledning

Hyrimoz er et legemiddel som skal behandle visse sykdommer som rammer deler av immunsystemet. Selv om Hyrimoz kan være en effektiv behandling av disse sykdommene, kan noen mennesker få en eller flere bivirkninger. Det er viktig at du snakker med legen din om de mulige fordelene og bivirkningene av å ta Hyrimoz. Disse kan variere fra person til person.

- Formålet med dette kortet er å informere deg om noen av de mulige bivirkningene av Hyrimoz.
- Noen av de alvorlige bivirkningene som kan oppstå, omfatter infeksjoner, kreft og problemer med nervesystemet.
- Dette er ikke alle de mulige bivirkningene av Hyrimoz.

### FØR BEHANDLING MED HYRIMOZ

Informér legen din om eventuelle helseproblemer du har og eventuelle medisiner du bruker. Det hjelper legen å avgjøre om Hyrimoz er egnet for deg.

#### Informér legen din hvis du

- Har en infeksjon eller har symptomer på en infeksjon (for eksempel feber, sår, tretthetsfølelse, tannproblemer).
- Har tuberkulose eller har vært i nær kontakt med noen som har tuberkulose.
- Har eller har hatt kreft.
- Opplever nummenhet eller prikking, eller hvis du har problemer som påvirker nervesystemet, for eksempel multippel sklerose.

Legen din bør kontrollere deg for tegn og symptomer på tuberkulose før du får Hyrimoz. Det kan være nødvendig å behandle deg for tuberkulose før du kan få Hyrimoz.

### Vaksiner

- Du kan ta vaksiner bortsett fra levende vaksiner.
- Dersom du får Hyrimoz mens du er gravid, er det viktig at du informerer barnets lege før barnet blir vaksinert. Barnet må ikke få en levende vaksine, for eksempel BCG (brukes for å forebygge tuberkulose) innenfor 5 måneder etter din siste Hyrimoz-injeksjon under svangerskapet.

### UNDER BEHANDLING MED HYRIMOZ

For å forsikre deg om at Hyrimoz fungerer som det skal og er trygt for deg, bør du jevnlig diskutere med legen hvordan du har det. Informér legen umiddelbart om eventuelle endringer i tilstanden din.

#### Hold legen informert om hvordan Hyrimoz fungerer for deg.

- Det er viktig å ringe legen umiddelbart dersom du skulle få uvanlige symptomer. Det bidrar til å sikre at du får riktig behandling. Det senker også risikoen for at eventuelle bivirkninger blir verre.
- Mange bivirkninger, inkludert infeksjoner, kan håndteres dersom du forteller legen din om det med det samme.
- Hvis du opplever en bivirkning, vil legen din avgjøre om du bør fortsette eller slutte med Hyrimoz-behandlingen. Det er viktig å snakke med legen din for å finne ut hva som er riktig for deg.
- Siden det kan oppstå bivirkninger etter siste dose av Hyrimoz, må du informere legen om eventuelle problemer som oppstår i opptil 70 dager etter siste injeksjon av Hyrimoz.

#### Informér legen din om:

- Nye lidelser som eventuelt oppstår
- Nye medisiner du tar
- Eventuelle planlagte kirurgiske inngrep

### Rapportering av bivirkninger

Hvis du opplever bivirkninger, må du kontakte lege, apotek eller sykepleier. Dette gjelder også eventuelle bivirkninger som ikke er angitt i pakningsvedlegget.

Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning, se [www.legemiddelverket.no/pasientmelding](http://www.legemiddelverket.no/pasientmelding)

## Noen pasienter som bruker Hyrimoz, kan få alvorlige bivirkninger, inkludert:

### Infeksjoner

Hyrimoz hjelper folk med visse betennelsessykdommer. Det gjør det ved å blokkere en del av immunsystemet. Denne delen av immunsystemet bidrar også til å bekjempe infeksjoner. Det vil si at Hyrimoz kan gjøre det mer sannsynlig at du vil få en infeksjon eller forverre eventuelle infeksjoner du allerede har. Det omfatter blant annet forkjølelse, eller mer alvorlige infeksjoner som tuberkulose.

### Kreft

- Hvis du bruker Hyrimoz, kan risikoen for å få visse typer kreft øke.

### Problemer i nervesystemet

- Noen mennesker har opplevd nye eller forverrede problemer i nervesystemet ved bruk av Hyrimoz. Det omfatter multippel sklerose.

Vennligst les pakningsvedlegget for Hyrimoz for mer informasjon. Dette er ikke alle de mulige bivirkningene som kan oppstå under behandling med Hyrimoz.

### Kontakt legen din eller oppsøk akuttmottak umiddelbart dersom du opplever et av følgende symptomer på disse mulige alvorlige bivirkningene:

#### Infeksjoner

- Feber, frysninger, uvanlig svetting, uvelhet eller kraftigere tretthet enn vanlig, føler deg syk (kvalme eller oppkast), diaré, magesmerter, manglende appetitt eller vekttap, hoste eller opphosting av blod eller slim, kortpustethet, vannlatingsproblemer, sår i huden, sår, muskelsmerter, tannproblemer.

#### Kreft

- Nattesvette, hovne lymfeknuter (hovne kjertler) i hals, armhule, lyske eller andre områder, vekttap, nye hudlesjoner eller endring i hudlesjoner (for eksempel føflekker eller fregner) som du allerede har, kraftig og uforklarlig kløe.

#### Problemer med nervesystemet

- Nummenhet eller prikking, synsendringer, muskelsvekkelse, uforklart svimmelhet.

Informér legen din umiddelbart dersom du opplever uvanlige symptomer under behandling med Hyrimoz. Dette er ikke alle de mulige symptomene på disse bivirkningene.

## INFORMASJON TIL DEG OG HELSEPERSONELLET SOM ER INVOLVERT I DIN BEHANDLING.

### Tester for og behandling av tuberkulose (TB)

Kryss av i denne ruten hvis du noen gang har blitt testet for TB:  
 JA (Spør legen din hvis du er usikker.)

Kryss av i denne ruten hvis du noen gang har fått utført en test som var positiv for TB:  
 JA (Spør legen din hvis du er usikker.)

Kryss av i denne ruten hvis du noen gang har tatt piller for å behandle eller forebygge TB:  
 JA (Spør legen din hvis du er usikker.)

Vennligst les gjennom pakningsvedlegget for Hyrimoz for mer informasjon. Pakningsvedlegget kan søkes opp på [www.Felleskatalogen.no](http://www.Felleskatalogen.no). Hvis du har ubesvarte spørsmål, kan du snakke med legen din eller annet helsepersonell.

Ditt navn: \_\_\_\_\_

Legens navn (legen som forskrev Hyrimoz):  
\_\_\_\_\_

Legens telefonnummer: \_\_\_\_\_

Indikasjon: \_\_\_\_\_

Dato for første Hyrimoz-injeksjon: \_\_\_\_\_

Dose for Hyrimoz-injeksjonen: \_\_\_\_\_

Dato for din siste Hyrimoz-injeksjon (hvis du ikke lenger får Hyrimoz): \_\_\_\_\_

Fyll ut informasjonen for deg selv og helsepersonell som er involvert i behandlingen din.