



Algoritme for implementering av graviditetsforebyggende program

Evaluering av ny pasient

Mann

Start pomalidomidbehandling. Kondom nødvendig ved seksuell aktivitet (selv om vasektomert) i hele pomalidomid-behandlingsperioden, selv ved avbrutt dosering, og i 7 dager etter at behandlingen er avsluttet, hvis partneren er gravid eller en fertil kvinne som ikke bruker effektiv prevensjon.

Kvinne

Ikke-fertil (minst ett kriterium må være oppfylt)

- Alder ≥ 50 år og naturlig amenoré i ≥ 1 år (amenoré etter kreftbehandling eller under amming utelukker ikke fertilitet).
- Tidligere bilateral salpingo-ooforektomi eller hysterektomi.
- Prematur ovariesvikt bekreftet av en spesialist i gynekologi.
- Genotype XY, Turners-syndrom, uterusagenesi.

Start pomalidomidbehandling. Prevensjon og graviditetstesting ikke nødvendig.

Fertil

Dersom hun ikke allerede bruker effektiv prevensjon, initieres effektiv prevensjon til riktig tid, avhengig av metoden som brukes og menstruasjonssyklus, med mindre det praktiseres absolutt og kontinuerlig seksuell avholdenhet.

- Implantat, livmorinnlegg som avgir levonorgestrel, medroksyprogesteron-acetat-depot, eggledersterilisering, vasektomert partner, eller p-piller med kun ovulasjonshemmende progesteron (desogestrel).
- Prevensjon brukes under behandling, selv ved avbrutt dosering, og i 4 uker etter at behandlingen er avsluttet.

Graviditetstest i samsvar med lokal praksis etter 4 uker med effektiv prevensjon (selv ved seksuell avholdenhet).

Negativ

Start pomalidomidbehandling. Graviditetstesting med 4 ukers mellomrom (selv ved seksuell avholdenhet).

Positiv

IKKE START POMALIDOMID-BEHANDLING. Henvis til relevant opplært helsepersonell.