

**Risikominimeringsprogram**  
**Pasientbrosjyrer med viktig**  
**sikkerhetsinformasjon**



## INNHOOLD

---

Viktig sikkerhetsinformasjon til alle pasienter 4–9

---

Viktig sikkerhetsinformasjon for fertile kvinner 10–15

---

Viktig sikkerhetsinformasjon for infertile kvinner 16–18

---

Viktig sikkerhetsinformasjon for mannlige pasienter 19–21

---

## Viktig sikkerhetsinformasjon til alle pasienter

### Bivirkninger

---

Som alle legemidler kan Imnovid® forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Noen bivirkninger er mer vanlige enn andre, og noen bivirkninger er mer alvorlige enn andre. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du ønsker mer informasjon, og les pakningsvedlegget. Nesten alle bivirkninger er forbigående og kan enkelt forebygges eller behandles. Det viktigste du skal være oppmerksom på er hva du kan forvente, og hva du skal rapportere til legen din. Det er viktig at du rådfører deg med legen din dersom du får bivirkninger ved behandling med Imnovid.

Det vil bli tatt regelmessige blodprøver av deg før og under behandlingen med Imnovid. Dette fordi medisinen din kan medføre en senkning av antallet blodceller som bekjemper infeksjoner (hvite blodceller) og av antallet celler som stopper blødning (blodplater).

Legen din skal be deg få tatt en blodprøve:

- før behandlingen
- hver uke i løpet av de første 8 ukene av behandlingen
- deretter minst én gang hver måned så lenge du bruker Imnovid.

Som følge av disse prøvene, kan legen endre dosen av Imnovid eller avbryte behandlingen. Legen kan også endre dosen eller stoppe behandlingen på bakgrunn av din allmenntilstand.

## Hvordan du bruker legemidlet

---

Apoteket kan gi deg hjelp og råd om bruk av legemidler. Noen personer synes det er nyttig å merke av på en kalender hver dag når de har tatt legemidlene sine, eller sette på en alarm for å minne dem om å ta legemidlene sine.

### Imnovid®

- Legen din kommer til å forskrive en dose av Imnovid som passer for deg
- Imnovid tas oralt (via munnen) vanligvis én gang daglig i 21 dager etterfulgt av 7 dager fri. De totalt 28 dagene kalles en syklus
- Legen din kan justere dosen avhengig av resultater fra blodprøver og eventuelle bivirkninger du får
- Ikke ta flere kapsler enn legen din har forskrevet. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er i tvil
- Imnovid kapsler skal svelges hele, med et glass vann, med eller uten mat
- Imnovid kan tas når som helst på dagen, men det bør tas på omtrent samme tid hver dag.

### Deksametason

- Imnovid er godkjent til bruk i kombinasjon med deksametason, og det er derfor sannsynlig at du får begge legemidlene
- Dersom du også tar deksametasontabletter, kan du ta disse samtidig med Imnovid
- Deksametason tas vanligvis bare noen få dager hver uke. Følg instruksene fra legen/apoteket nøye.

## Hva du skal gjøre dersom du tar mer enn den foreskrevne dosen av Imnovid®:

---

Dersom du vet et uhell tar for mange kapsler, må du omgående kontakte legen din.

## Bruk av andre legemidler

---

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Dersom du går til en annen lege eller annet helsepersonell for behandling (tannlege for eksempel) skal du fortelle at du bruker Imnovid og deksametason.

## Hvordan du oppbevarer Imnovid trygt

---

- Oppbevar Imnovid på et trygt sted, utilgjengelig for barn.
- Oppbevar Imnovid kapsler i originalpakningen ved romtemperatur.
- Skal ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på esken.

## Ting å ta hensyn til ved håndtering av legemidlet: for pasienter, familiemedlemmer og pleiepersonell

---

Oppbevar blisterpakningen med kapslene i originalemballasjen.

Kapslene kan i enkelte tilfeller bli skadet når de presses ut av blisterpakningen, særlig hvis man presser mot midten av kapselen. Kapslene skal ikke presses ut av blisterpakningen ved å trykke på midten eller ved å trykke mot begge ender, da dette kan føre til at kapselen deformeres og blir ødelagt. Det anbefales at du bare presser på den ene enden av kapselen (se figuren nedenfor), fordi kapselen da bare utsettes for press på den ene siden, og det blir mindre risiko for deformering eller skade.



## Ta følgende forholdsregler når du håndterer legemidlet for å unngå mulig eksponering hvis du er familiemedlem og/eller pleiepersonell

---

- Bruk engangshansker ved håndtering av legemiddel eller emballasje (dvs. blisterpakninger eller kapsel).
- Bruk riktig teknikk når du tar av deg hanskene for å unngå at legemidlet kommer i kontakt med huden (se nedenfor).
- Legg hanskene i gjenlukkbare plastposer av polyetylen og kast dem i henhold til lokale anvisninger.
- Vask hendene grundig med såpe og vann etter at du har tatt av hanskene.

## Ta følgende ekstra forholdsregler for å unngå eksponering dersom en legemiddelpakning ser ut til å være skadet

- Dersom ytterkartongen er synlig skadet skal den **ikke** åpnes.
- Hvis blisterpakningene er skadet eller lekker, eller du ser at kapslene er skadet eller lekker skal du lukke ytterkartongen **umiddelbart**.
- Legg legemidlet i en gjenlukkbare plastpose av polyetylen.
- Returner den ubrukte pakningen til apoteket så snart som mulig slik at de kan kaste den på sikker måte.


## Ta egnede forholdsregler for å minimere eksponeringen ved å bruke egnet personlig verneutstyr hvis legemidlet lekker eller søles

- Hvis kapslene blir knust eller går i stykker, kan det bli frigitt støv som inneholder virkestoff. Unngå å spre og puste inn pulveret.
- Bruk engangshansker når du tørker opp pulveret.
- Legg en fuktig klut eller et håndkle over pulveret for at minst mulig pulver skal spres til luften. Tilfør ekstra væske slik at pulveret løses opp. Etter at pulveret er tørket opp, rengjøres området grundig med såpe og vann og tørkes tørt.
- Legg alt kontaminert materiell, iberegnet den fuktige kluten eller håndkleet og hanskene, i en gjenlukkbare plastpose av polyetylen og kast den i samsvar med lokale anvisninger for legemidler.
- Vask hendene grundig med såpe og vann etter at du har tatt av deg hanskene.
- Si umiddelbart fra til forskrivende lege og/eller apotek.

## Hvis innholdet i kapselen fester seg på hud eller slimhinner

- Hvis du berører legemiddelpulveret, skal du vaske det eksponerte området grundig med rennende vann og såpe.
- Hvis du har fått pulveret i øynene, skal du ta ut eventuelle kontaktlinser og kaste dem dersom dette er lett å få gjort. Skyll umiddelbart øynene med rikelige mengder vann i minst 15 minutter. Kontakt øyelege hvis det oppstår irritasjon.

## Korrekt teknikk for å ta av hansker



- Grip rundt utsiden av hansken i nærheten av håndleddet (1).
- Trekk hansken av hånden og vreg den (2).
- Hold den i den andre hånden, der hansken sitter på (3).
- Før fingrene på den hanskefrie hånden inn under håndleddet på den andre hansken. Vær forsiktig slik at du ikke berører utsiden av hansken (4).
- Trekk hansken av fra innsiden og lag en pose for begge hanskene.
- Kast dem i en egnet beholder.
- Vask hendene grundig med såpe og vann.

## Viktig sikkerhetsinformasjon for fertile kvinner

### Sammendrag

---

- Imnovid® er handelsnavnet til pomalidomid.
- Pomalidomid er strukturelt beslektet med thalidomid, som er kjent for å forårsake alvorlige livstruende fosterskader, og pomalidomid forventes derfor å være skadelig for ufødte barn.
- Pomalidomid er vist å gi fosterskader hos dyr og forventes å ha en tilsvarende effekt hos mennesker.
- Du må aldri dele Imnovid med noen andre.
- Du skal alltid returnere alle ubrukte kapsler til apoteket for trygg destruksjon så snart som mulig.
- Du skal ikke gi blod under behandlingen eller innen 7 dager etter avsluttet behandling, dette gjelder også ved avbrutt dosering.
- Informer legen din dersom du opplever bivirkninger mens du tar Imnovid.
- For ytterligere informasjon, se pakningsvedlegget.

### Sikkerhetsinformasjon

---

- Du må aldri ta Imnovid dersom:
  - Du er gravid
  - Du ammer
  - Du er en kvinne som kan bli gravid, selv om du ikke planlegger å bli gravid. Kvinner som kan bli gravide må bruke effektiv prevensjon i 4 uker før de begynner med Imnovid, i hele behandlingsperioden, og i 4 uker etter at behandlingen er avsluttet
  - Du er allergisk overfor Imnovid eller noen av de andre innholdstoffene i kapselen.

- Pomalidomid er strukturelt beslektet med thalidomid, som er kjent for å forårsake alvorlige livstruende fosterskader
- Imnovid® forventes å være skadelig for ufødte barn.

### Hva du skal rådføre deg med legen din om før du bruker Imnovid

---

- Dersom du er gravid, eller du tror at du kan være gravid, eller dersom du planlegger å bli gravid, da Imnovid forventes å være skadelig for ufødte barn
- Dersom du tror du er i stand til å bli gravid og trenger råd om effektiv prevensjon
- Dersom du ammer
- Dersom du tidligere har hatt en allergisk (overfølsomhets)reaksjon som utslett, kløe, hevelse, svimmelhet eller pusteproblemer, når du har tatt tilknyttede legemidler kalt "thalidomid" eller "lenalidomid"
- Dersom du tidligere har hatt en allergisk (overfølsomhets) reaksjon som utslett, kløe, hevelse, svimmelhet eller pusteproblemer, overfor noen av de andre innholdstoffene i Imnovid kapslen. Rådfør deg med apoteket
- Dersom du har hatt hjerteinfarkt, har hjertesvikt, har pusteproblemer eller dersom du røyker, har høyt blodtrykk, høye kolesterolnivåer eller har diabetes
- Dersom du har hatt nyreproblemer
- Dersom du har hatt leverproblemer
- Dersom du har hatt trombose (blodpropp)
- Dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.

## Krav ved behandlingsslutt

---

### Etter at du har fullført din behandling med Imnovid®, er det viktig at:

- Du returnerer alle ubrukte Imnovid kapsler til apoteket
- Du ikke gir blod før om 7 dager
- Du fortsetter å bruke den effektive prevensjonsmetoden i ytterligere 4 uker
- Legen din tar en siste graviditetstest etter 4 uker.

## Graviditetsforebyggende program

---

- Dersom Imnovid tas under graviditet, forventes alvorlige, livstruende fosterskader. Dersom du er gravid, dersom du tror at du kan være gravid eller dersom du planlegger å bli gravid, skal du fortelle det til legen din, og du MÅ IKKE ta Imnovid. Selv om du ikke har regelmessig menstruasjon eller nærmer deg overgangsalderen, kan du fortsatt være i stand til å bli gravid.
- For å sikre at et ufødt barn ikke eksponeres for Imnovid, kommer legen din til å fylle ut et pasientkort som bekrefter at du har blitt informert om kravet om at du IKKE må bli gravid under behandling med Imnovid og i én måned etter at du sluttet med Imnovid. For deg skal forskrivning av Imnovid begrenses til 4 ukers behandling, og fortsatt behandling krever en ny resept. Ideelt sett skal graviditetstest, utstedelsen av en resept og utlevering skje på samme dag. Utleveringen av Imnovid skal skje innen maksimalt 7 dager etter forskrivningen.
- Rådfør deg med legen din dersom du er gravid eller tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid, da Imnovid forventes å være skadelig for ufødte barn.
- Dersom du er i stand til å bli gravid, må du følge alle de nødvendige tiltakene som skal hindre at du blir gravid og sikre at du ikke er gravid under behandlingen. Før du starter behandlingen skal du rådføre deg med legen din dersom du er i stand til å bli gravid, selv om du tror at dette er lite sannsynlig.
- Dersom du er i stand til å bli gravid, og selv om du samtykker til og bekrefter hver måned at du ikke kommer til å være heteroseksuelt aktiv, skal du ta graviditetstester under tilsyn av legen din før behandling. Disse vil bli gjentatt hver 4. uke under behandlingen, inkludert ved avbrutt dosering, og 4 uker etter at behandlingen er avsluttet (hvis ikke det er bekreftet at du har gjennomgått en eggledersterilisering).
- Du skal starte din behandling med Imnovid® så snart som mulig etter at du har tatt en graviditetstest med negativt prøvesvar.
- Dersom du er i stand til å bli gravid, må du bruke effektive prevensjonsmetoder i 4 uker før du starter behandlingen, under behandlingen (inkludert ved avbrutt dosering), og i 4 uker etter avsluttet behandling. Legen din vil gi deg råd om aktuelle prevensjonsmetoder, da enkelte prevensjonstyper ikke er anbefalt sammen med Imnovid. Det er derfor nødvendig at du diskuterer dette med legen din.
- Hvor kan du få råd om prevensjonsmetoder: Før behandling med Imnovid startes vil du få rådgivning med hensyn til prevensjonsmetoder. Dette vil skje hos din hematolog/onkolog eller annen erfaren helseperson.
- Dersom du mistenker at du er gravid på noe tidspunkt mens du tar Imnovid eller i løpet av de 4 ukene etter at du avsluttet behandlingen, må du slutte med Imnovid omgående og omgående informere legen din. Legen vil henvise deg til en lege som er spesialisert eller erfaren innen teratologi for utredning og rådgivning.
- Informer legen som foreskriver prevensjonen din om at du bruker Imnovid.
- Informer legen som foreskriver Imnovid dersom du har endret eller sluttet med prevensjonsmetoden.

Før du starter behandling med Imnovid® skal du diskutere med legen din om det er noen mulighet for at du kan bli gravid. Noen kvinner som ikke har regelmessig menstruasjon eller som nærmer seg overgangsalderen, kan fortsatt være i stand til å bli gravide.

Hvis ikke du faller innenfor en av de følgende kategoriene, må du følge de graviditetsforebyggende rådene som gis i dette avsnittet:

- Du er minst 50 år gammel og det er minst ett år siden siste menstruasjon (dersom menstruasjonen har opphørt som følge av kreftbehandling eller under amming, er det fortsatt mulighet for at du kan bli gravid)
- Livmoren din er fjernet (hysterektomi)
- Egglederne dine og begge eggstokker er fjernet (bilateral salpingo-ooforektomi)
- Du har prematur eggstokksvikt, bekreftet av en spesialist i gynekologi
- Du har genotype XY, Turners-syndrom eller mangler livmor.

Du kan trenge en konsultasjon og prøver hos en spesialist i kvinnesykdommer for å bekrefte at du ikke kan bli gravid. Alle kvinner som er i stand til å bli gravide, selv om de ikke planlegger det, må følge forsiktighetsreglene som er beskrevet i dette avsnittet.

## Prevensjon for å forebygge graviditet

---

Dersom du er en kvinne som kan bli gravid må du enten:

- Bruke egnet prevensjon fra 4 uker før behandling med Imnovid®, under behandling med Imnovid, i eventuelle pauser i behandlingen med Imnovid og i 4 uker etter at du har sluttet med behandling med Imnovid eller
- Samtykke til at du ikke skal være seksuelt aktiv med en mannlig partner fra 4 uker før behandling med Imnovid, under behandling med Imnovid, i eventuelle pauser i behandlingen med Imnovid og i 4 uker etter at du har sluttet med behandling med Imnovid. Du vil bli bedt om å bekrefte dette hver måned.

Ikke alle prevensjonstyper egner seg ved behandling med Imnovid. Du og partneren din bør diskutere egnede prevensjonsformer som dere begge synes er akseptable med legen din. Ved behov kan sykehuset henvise deg til en spesialist for råd om prevensjon.



## Viktig sikkerhetsinformasjon for infertile kvinner

### Sammendrag

---

- Imnovid® er handelsnavnet til pomalidomid.
- Pomalidomid er strukturelt beslektet med thalidomid, som er kjent for å forårsake alvorlige livstruende fosterskader, og pomalidomid forventes derfor å være skadelig for ufødte barn.
- Pomalidomid er vist å gi fosterskader hos dyr og forventes å ha en tilsvarende effekt hos mennesker.
- Du må aldri dele Imnovid med noen andre.
- Du skal alltid returnere alle ubrukte kapsler til apoteket for trygg destruksjon så snart som mulig.
- Du skal ikke gi blod under behandlingen eller innen 7 dager etter avsluttet behandling, dette gjelder også ved avbrutt dosering.
- Informer legen din dersom du opplever bivirkninger mens du tar Imnovid.
- For ytterligere informasjon, se pakningsvedlegget.

### Sikkerhetsinformasjon

---

- Du må aldri ta Imnovid dersom:
  - Du er allergisk overfor Imnovid eller noen av de andre innholdstoffene i kapselen.
- Pomalidomid er strukturelt beslektet med thalidomid, som er kjent for å forårsake alvorlige livstruende fosterskader
- Imnovid forventes å være skadelig for ufødte barn.

## Hva du skal rådføre deg med legen din om før du bruker Imnovid®

---

- Dersom du tidligere har hatt en allergisk (overfølsomhets)reaksjon som utslett, kløe, hevelse, svimmelhet eller pusteproblemer, når du har tatt tilknyttede legemidler kalt "thalidomid" eller "lenalidomid"
- Dersom du tidligere har hatt en allergisk (overfølsomhets)reaksjon som utslett, kløe, hevelse, svimmelhet eller pusteproblemer overfor noen av de andre innholdstoffene i Imnovid kapsler. Rådfør deg med apoteket
- Dersom du har hatt hjerteinfarkt, har hjertesvikt, har pusteproblemer eller dersom du røyker, har høyt blodtrykk, høye kolesterolnivåer eller har diabetes
- Dersom du har hatt nyreproblemer
- Dersom du har hatt leverproblemer
- Dersom du har hatt trombose (blodpropp)
- Dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.

### Krav ved behandlingsslutt

---

**Etter at du har fullført din behandling med Imnovid, er det viktig at:**

- Du returnerer alle ubrukte Imnovid kapsler til apoteket
- Du ikke gir blod før om 7 dager.

## Graviditetsforebyggende program

---

- For å sikre at et ufødt barn ikke eksponeres for Imnovid<sup>®</sup>, kommer legen din til å fylle ut et pasientkort som bekrefter at du ikke er i stand til å bli gravid. For deg bør forskrivning av Imnovid begrenses til 12 ukers behandling, og fortsatt behandling krever en ny resept.

Du anses å være en kvinne som ikke er i stand til å bli gravid dersom du faller innenfor en av de følgende kategoriene:

- Du er minst 50 år gammel og det er minst ett år siden siste menstruasjon (dersom menstruasjonen har opphørt som følge av kreftbehandling eller under amming, er det fortsatt mulighet for at du kan bli gravid)
- Livmoren din er fjernet (hysterektomi)
- Egglederne dine og begge eggstokker er fjernet (bilateral salpingo-ooforektomi)
- Du har prematur eggstokksvikt, bekreftet av en spesialist i gynekologi
- Du har genotype XY, Turners-syndrom eller mangler livmor.

## Viktig sikkerhetsinformasjon for mannlige pasienter

### Sammendrag

---

- Imnovid<sup>®</sup> er handelsnavnet til pomalidomid.
- Pomalidomid er strukturelt beslektet med thalidomid, som er kjent for å forårsake alvorlige livstruende fosterskader, og pomalidomid forventes derfor å være skadelig for ufødte barn.
- Pomalidomid er vist å gi fosterskader hos dyr og forventes å ha en tilsvarende effekt hos mennesker.
- Be legen din informere deg om hvilke effektive prevensjonsmetoder din kvinnelige partner kan bruke.
- Dersom din kvinnelige partner er gravid eller i stand til å bli gravid, og hun ikke bruker effektiv prevensjon, må du bruke kondom hver gang du er heteroseksuelt aktiv.
- Du må aldri dele Imnovid med noen andre.
- Du skal alltid returnere alle ubrukte kapsler til apoteket for trygg destruksjon så snart som mulig.
- Du skal ikke gi blod under behandlingen eller innen 7 dager etter avsluttet behandling, dette gjelder også ved avbrutt dosering.
- Du skal ikke gi sæd eller sperm under behandlingen eller innen 7 dager etter avsluttet behandling, dette gjelder også ved avbrutt dosering.
- Informer legen din dersom du opplever bivirkninger mens du tar Imnovid.
- For ytterligere informasjon, se pakningsvedlegget.

## Sikkerhetsinformasjon

---

- Du må aldri ta Imnovid® dersom:
  - Du er allergisk overfor Imnovid eller noen av de andre innholdsstoffene i kapselen.
- Pomalidomid er strukturelt beslektet med thalidomid, som er kjent for å forårsake alvorlige livstruende fosterskader
- Imnovid forventes å være skadelig for ufødte barn
- Be legen din informere deg om hvilke effektive prevensjonsmetoder din kvinnelige partner kan bruk.

## Hva du skal rådføre deg med legen din om før du bruker Imnovid

---

- Dersom partneren din er gravid, eller du tror at partneren din kan være gravid eller dersom partneren din planlegger å bli gravid, da Imnovid kan være skadelig for ufødte barn
- Dersom du tidligere har hatt en allergisk (overfølsomhets)reaksjon som utslett, kløe, hevelse, svimmelhet eller pusteproblemer, når du har tatt tilknyttede legemidler kalt "thalidomid" eller "lenalidomid"
- Dersom du tidligere har hatt en allergisk (overfølsomhets)reaksjon som utslett, kløe, hevelse, svimmelhet eller pusteproblemer overfor noen av de andre innholdsstoffene i Imnovid kapsler. Rådfør deg med apoteket
- Dersom du har hatt hjerteinfarkt, har hjertesvikt, har pusteproblemer eller dersom du røyker, har høyt blodtrykk, høye kolesterolnivåer eller har diabetes
- Dersom du har hatt nyreproblemer
- Dersom du har hatt leverproblemer
- Dersom du har hatt trombose (blodpropp)
- Dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.

## Krav ved behandlingslutt

---

### Etter at du har fullført din behandling med Imnovid®, er det viktig at:

- Du returnerer alle ubrukte Imnovid kapsler til apoteket
- Du ikke gir blod før om 7 dager
- Du ikke gir sæd eller sperm før om 7 dager
- Dersom du har brukt en effektiv prevensjonsmetode, må du fortsette med dette i ytterligere 7 dager
- Dersom din kvinnelige partner har brukt en effektiv prevensjonsmetode, må hun fortsette med dette i ytterligere minst 4 uker.

## Graviditetsforebyggende program

---

- For å sikre at et ufødt barn ikke eksponeres for Imnovid, kommer legen din til å fylle ut et pasientkort som bekrefter at du har blitt informert om kravet om at partneren din IKKE må bli gravid under din behandling med Imnovid og i 7 dager etter at du sluttet med Imnovid. For deg bør forskrivning av Imnovid begrenses til 12 ukers behandling, og fortsatt behandling krever en ny resept.
- Du skal ikke gi blod eller sæd eller sperm under behandlingen, ved avbrutt dosering eller innen 7 dager etter avsluttet behandling.
- Imnovid overføres til mannens sæd. Dersom din kvinnelige partner er gravid eller i stand til å bli gravid, og hun ikke bruker effektiv prevensjon, må du bruke kondom hver gang du er heteroseksuelt aktiv, under behandlingen, ved avbrutt dosering og i 7 dager etter avsluttet behandling, selv om du er sterilisert ved vasektomi siden sædvæske likefullt kan inneholde pomalidomid selv ved fravær av sædceller.
- Dersom din kvinnelige partner har brukt en effektiv prevensjonsmetode, må hun fortsette med dette i ytterligere 4 uker.
- Dersom partneren din blir gravid mens du bruker eller inntil 7 dager etter at du sluttet å bruke Imnovid, skal du omgående informere legen som behandler deg, og partneren din skal også kontakte sin lege omgående.

## MERKNADER

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



**Celgene AS** | Balder Alle 2 | 2060 Gardermoen  
Tlf: 63 94 40 00 | Faks: 63 94 40 01 | E-post: [medinfo.no@celgene.com](mailto:medinfo.no@celgene.com) | [www.celgene.no](http://www.celgene.no)  
Drug Safety Nordic Tlf: +46 8 703 16 00 | Faks: +46 8 703 16 03 | E-post: [drugsafety-nordic@celgene.com](mailto:drugsafety-nordic@celgene.com)