

# Farmasøytmateriell

## Sjekkliste for farmasøyt – Veiledning ved utlevering av Isotretinoin Orifarm.

Isotretinoin Orifarm tilhører legemiddelgruppen retinoider, som forårsaker alvorlige fosterskader. Fostereksponeering for Isotretinoin Orifarm, selv i korte perioder, gir en høy risiko for medfødte misdannelser og spontanabort.

**Isotretinoin Orifarm er derfor strengt kontraindisert ved graviditet og hos fertile kvinner, med mindre alle vilkår i det graviditetsforebyggende programmet til Isotretinoin Orifarm er oppfylt.**

En negativ graviditetstest, forskrivning av resept og utlevering av Isotretinoin Orifarm bør ideelt sett skje på samme dag.

Dersom du får vite at en kvinne som behandles med Isotretinoin Orifarm har blitt gravid, skal hun få beskjed om at behandlingen må avsluttes umiddelbart, og straks henvises til forskrivende lege.

Dersom du får vite at en kvinnelig pasient har blitt gravid innen én måned etter seponering av Isotretinoin Orifarm, skal hun henvises til forskrivende lege.

*Påminnelsekort for pasienter* gis til pasienten av legen ved første forskrivning. Kortet finnes tilgjengelig hos Felleskatalogen.no for hvert enkelt produkt.

Se preparatomtalen for mer informasjon om Isotretinoin Orifarm. Denne finnes hos Felleskatalogen.no (nettside eller app) eller på legemiddelsok.no.

**Som farmasøyt skal du kun utlevere Isotretinoin Orifarm etter å ha undersøkt følgende informasjon:**

<b>For fertile kvinner:</b>	<b>Sjekket/gitt informasjon (X)</b>
For å sikre regelmessig oppfølging, inkludert graviditetstesting skal resepten på Isotretinoin Orifarm være begrenset til 30 dagers bruk. Resepten må hentes ut innen 7 dager.	
<b>Alle pasienter bør få beskjed om:</b>	
at de aldri må gi Isotretinoin Orifarm til en annen person.	
at de skal returnere ubrukte kapsler til apoteket ved avsluttet behandling.	
at de ikke må gi blod under Isotretinoin Orifarm-behandling og i én måned etter seponering, grunnet den potensielle risikoen for fosteret ved blodoverføring til en gravid mottaker.	