

**Viktig sikkerhetsinformasjon til helsepersonell**

**Jinarc® kan forårsake leverskade.** Testing av leverfunksjon skal utføres regelmessig (månedlig i de første 18 månedene, deretter hver 3. måned). Ved tegn på leverskade eller unormal økning av ALAT og ASAT skal behandling med Jinarc umiddelbart avsluttes.

**Jinarc® blokkerer virkningen av vasopressin i nyrene, og kan forårsake stort urinvolum og kraftig dehydrering.** Symptomer på dehydrering kan omfatte økt tørste, munn tørrhet, tretthet, lavere urinproduksjon, hodepine, tørr hud, kløe, økt hjerterytme og forvirring.

Besøk [www.felleskatalogen.no](http://www.felleskatalogen.no) for mer informasjon.

# Pasientkort

Sikkerhetsinformasjon til pasienter.

Vennligst husk alltid å ha dette kortet med deg.

Pasientens navn:

---

Dato for første foreskriving av Jinarc®:

---

Legens navn:

---

Sykehusets navn:

---

Sykehusets telefonnummer:

---

## Viktig sikkerhetsinformasjon for pasienter

### **Jinarc® kan påvirke måten leveren din fungerer på**

Rådfør deg med lege hvis du opplever symptomer på tretthet, nedsatt appetitt, magesmerter, feber, mørk urin, gulfarge i hud eller øyne (gulsott), kraftig dehydrering, kvalme, oppkast, kløe eller ledd- og muskelsmerter med feber.

### **Jinarc® kan forårsake kraftig dehydrering**

Drikk rikelig væske for å unngå dehydrering. Rådfør deg med lege hvis du ikke får i deg nok væske via munnen.