

Sikkerhetsinformasjon til pasienter.
Vennligst husk alltid å ha dette kortet med deg.

Pasientkort

Viktig sikkerhetsinformasjon til helsepersonell

Jinarc® kan forårsake leverskade. Testing av leverfunksjon skal utføres regelmessig (månedlig i de første 18 månedene, deretter hver 3. måned). Ved tegn på leverskade eller unormal økning av ALAT og ASAT skal behandling med Jinarc® umiddelbart avsluttes.

Jinarc® kan forårsake vesentlig økning av urinering som kan føre til kraftig dehydrering eller stort vanntap. Symptomer på dehydrering kan omfatte økt tørste, munntørrehet, tretthet, lavere urinproduksjon, hodepine, tørr hud, svimmelhet, økt hjerterytme, forvirring og dårlig hudelastisitet.

Besøk www.felleskatalogen.no for mer informasjon.

Pasientens navn:

Dato for første foreskriving av Jinarc®:

Legens navn:

Sykehusets navn:

Sykehusets telefonnummer:

Viktig sikkerhetsinformasjon for pasienter

Jinarc® kan påvirke måten leveren din fungerer på

Rådfør deg med lege hvis du opplever symptomer på tretthet, nedsatt appetitt, magesmerter, feber, mørk urin, gulfarge i hud eller øyne (gulsott), kraftig dehydrering, kvalme, oppkast, kløe eller ledd- og muskelsmerter med feber.

Jinarc® kan forårsake kraftig dehydrering

Drikk rikelig væske for å unngå dehydrering eller stort vanntap. Rådfør deg med lege hvis du ikke får i deg nok væske via munnen.