

Retningslinjer for bruk av

# KEYTRUDA<sup>®</sup>

(pembrolizumab)

---

**Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter**





# Introduksjon

---

Legen har forskrevet KEYTRUDA® (pembrolizumab) til behandling av kreftsykdommen din. Vennligst se pakningsvedlegget for å lese om hva KEYTRUDA® er og hva det brukes mot. Pakningsvedlegget kan søkes opp på [www.Felleskatalogen.no](http://www.Felleskatalogen.no)

Brosjyren vil forklare noen av bivirkningene som kan oppstå under eller etter behandling med KEYTRUDA®, og hvordan du skal se etter dem. I noen tilfeller kan symptomene komme senere og de kan forekomme etter siste dose. Du vil også lære hvorfor det er viktig å rapportere umiddelbart alle symptomer til legen din.

# Hva bør du vite om behandlingen din

**Behandling med KEYTRUDA® kan gi bivirkninger. Behandlingen fungerer ved å hjelpe immunforsvaret til å bekjempe kreftsykdommen din.**

## Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan KEYTRUDA® forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Du kan få noen alvorlige bivirkninger når du blir gitt KEYTRUDA®. Disse bivirkningene kan noen ganger være livstruende og føre til død. Disse bivirkningene kan forekomme når som helst under behandlingen, eller til og med etter at behandlingen er ferdig. Du kan oppleve mer enn en bivirkning samtidig. Det er svært viktig at du informerer legen din om alle symptomer du oppdager når du får KEYTRUDA®. Legen kan gi deg andre legemidler for å forhindre mer alvorlige komplikasjoner og redusere symptomene dine. Legen kan holde tilbake den neste dosen av KEYTRUDA® eller stoppe behandlingen med KEYTRUDA®.

# Informer legen din umiddelbart dersom du har noen av følgende symptomer

Bivirkning	Tegn og symptomer
Lungeproblemer <b>(betennelse i lungene)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kortpustethet</li><li>• Brystsmerter</li><li>• Hoste</li></ul>
Tarmproblemer <b>(betennelse i tarmene)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diaré eller oftere avføring enn vanlig</li><li>• Svart, tjæreaktig, klebrig avføring eller avføring med blod eller slim</li><li>• Kraftige magesmerter eller ømhet</li><li>• Kvalme eller oppkast</li></ul>
Leverproblemer <b>(betennelse i lever)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kvalme eller oppkast</li><li>• Mindre sultfølelse</li><li>• Smerter på høyre side av magen</li><li>• Gulfarging av hud eller det hvite i øynene</li><li>• Mørk urin</li><li>• Får lettere blødninger eller blåmerker enn normalt</li></ul>
Nyreproblemer <b>(nyrebetennelse)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Endring i mengde eller farge på urinen</li></ul>
Problemer med hormonkjertler <b>(spesielt skjoldbruskkjertel, hypofyse, binyrer)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rask hjerterytme</li><li>• Vekttap eller vektøkning</li><li>• Økt svette</li><li>• Håravfall</li><li>• Kuldefølelse</li><li>• Forstoppelse</li><li>• Dypere stemme</li><li>• Muskelverk</li><li>• Svimmelhet eller besvimelse</li><li>• Hodepine som ikke forsvinner eller uvanlig hodepine</li></ul>
Type 1 diabetes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Følelsen av å være mer sulten eller tørst enn vanlig</li><li>• Behov for hyppigere urinering</li><li>• Vekttap</li></ul>

Kontakt legen din dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt her.

# Se etter bivirkninger

## Det er viktig å være oppmerksom på symptomer

Informer legen din umiddelbart dersom du oppdager noen symptomer mens du bruker KEYTRUDA® (pembrolizumab). Vær klar over at bivirkninger kan forekomme etter at du har fått siste dose med KEYTRUDA®.

Visse legemidler, eksempelvis kortikosteroider, kan bli brukt for å forhindre mer alvorlige komplikasjoner og redusere symptomene dine. Legen din kan utsette eller avslutte behandlingen din dersom bivirkningene er for alvorlige.

Ikke forsøk å diagnostisere eller behandle bivirkninger selv.

## Hva du skal gjøre hvis symptomer oppstår når du er bortreist

Det er viktig at du kontakter legen din uansett når symptomer måtte oppstå. **Ha alltid med deg Pasientkortet for KEYTRUDA®** med kontaktinformasjon til legen din, slik at hun/han kan nås i nødstilfeller. Pasientkortet inneholder viktig informasjon om symptomer som umiddelbart må rapporteres til behandlende lege eller sykepleier når du er bortreist. Kortet gjør også andre leger oppmerksom på at du behandles med KEYTRUDA®.

**Ha alltid med deg  
Pasientkortet for  
KEYTRUDA®.**



## Husk på

**Kontakt legen din umiddelbart dersom du opplever noen bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Snakk med legen din dersom du har spørsmål om KEYTRUDA® eller hvordan det virker.**

**Oppdatert april 2020.**



MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, 3002 Drammen, tlf. 32 20 73 00, faks 32 20 73 10.  
Copyright © 2020 Merck Sharp & Dohme Corp., Whitehouse Station, NJ, USA. All rights reserved.  
NO-KEY-00105 04/20