

Sjekkliste for forskrivning av Lariam® (meflokin) kjemoprofylakse til dine pasienter

Følgende sjekkliste gir en kort veiledning om tilstander og legemidler som er kontraindisert ved meflokin kjemoprofylakse. Sjekklisten er laget for å hjelpe deg bestemme hvor egnet meflokin kjemoprofylakse er for pasienten og alle punktene bør sjekkes i nærvær av pasienten eller hans/hennes omsorgsyter. Dersom ett av spørsmålene 1-5 besvares med "**Ja**" er forskrivning av meflokin ikke hensiktsmessig for pasienten.

Fyll ut sjekklisten ved å krysse av for passende svar.

Kontraindikasjoner	Ja	Nei
1. Har pasienten kjent overfølsomhet overfor meflokin eller lignende substanser (f.eks. kinin, kinidin) eller hjelpestoffene?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Har, eller har pasienten noen gang hatt depresjon, generalisert angst, psykose, schizofreni, selvmordsforsøk, selvmordstanker, selvskadende adferd, eller annen psykisk lidelse eller kramper av en eller annen årsak?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Har pasienten tidligere hatt Blackwater fever (tropesykdom)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Har pasienten alvorlig nedsatt leverfunksjon?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Bruker pasienten halofantrin for tiden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dersom ett av spørsmålene 1-5 på sjekklisten besvares med "**Ja**", er forskrivning av Lariam® (meflokin) ikke hensiktsmessig for pasienten.