

Hva du bør vite om LEMTRADA (alemtuzumab)

Bivirkninger det er viktig å være på oppmerksom på:

Ta straks kontakt med nevrologen din for å rapportere disse symptomene, uansett om de er nye, forverrede eller tilbakevendende symptomer. Hvis du ikke får tak i legen din, må du kontakte legevakt øyeblikkelig. Vis dem dette kortet!

Immunologisk trombocytopeni – (ITP)

- > Små spredte røde, rosa eller lilla flekker på huden
- > Blåmerker som lett oppstår
- > Blødning fra sår som er vanskeligere å stoppe enn normalt
- > Kraftigere, lengre eller hyppigere menstruasjoner enn normalt.
- > Blødning mellom menstruasjoner eller kraftigere menstruasjoner.
- > Blødning fra tannkjøttet eller nesen som er nyoppstått eller som det tar lengre tid enn vanlig å stoppe
- > Opphosting av blod (kan også være tegn på nyreproblemer)

Nyreproblemer

- > Blod i urinen - urinen kan være rød eller tefarget
- > Hevelse i bena eller føttene

Alvorlige infeksjoner

- > Feber og/eller frysninger
- > Hovne kjertler
- > Kortpustethet, hoste, hvesing, brystmerter eller -tetthet, opphosting av blod

Bivirkninger kan oppstå lenge etter at du har fått en behandlingssyklus med LEMTRADA.

Det er svært viktig at du fortsetter med de månedlige kontrollene selv om du føler deg frisk.



Tidlig oppdagelse og diagnose kan bidra til best mulig utfall.



Du må fortsette å være oppmerksom på tegn og symptomer.



Tidlig oppdagelse og diagnose kan bidra til best mulig utfall.

Nevrologen som har forskrevet LEMTRADA kan kontaktes på telefonnummeret under. Andre leger eller helsepersonell som er involvert i min behandling kan også stå på listen.

Vennligst sørg for at legen(e) som er listet opp nedenfor får kopi av medisinske journaler, inkludert behandling og/eller testresultater, ved enhver medisinsk undersøkelse.

Pasientens navn: _____

Pasientens signatur: _____

	Navn	Telefon nr:
Nevrolog		
Fastlege/allmenlege		
MS-sykepleier		

Pasientkort

Vennligst ha dette kortet med deg bestandig og vis det til alt helsepersonell, inkludert legevakt for å informere dem om din LEMTRADA-behandling.

Jeg har blitt behandlet med LEMTRADA, en behandling mot multippel sklerose (MS) som påvirker immunsystemet. Jeg deltar i et oppfølgingsprogram med månedlige kontroller som skal vare i 4 år etter siste behandling.

Behandling med LEMTRADA kan gi økt risiko for:

Autoimmune sykdommer som:

- > Immunologisk trombocytopeni (ITP) som er en blødningssykdom
- > Sjeldne nyresykdommer (nefropati, inkludert antiglomerulær basalmembransykdom [anti-GBM-sykdom])
- > Thyreoideasykdommer (hypo-/hypertyreoidisme)
- > Alvorlige infeksjoner

Versjon: November 2018

Leger: Se preparatomtalen (SPC) for LEMTRADA for mer informasjon.