Sikkerhetsinformasjon

Etter krav fra Direktoratet for medisinske produkter

Pasientkort

▼Litfulo® (ritlecitinib)

▼Dette legemiddelet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning: **www.dmp.no/pasientmelding**

Versjon 4.0 - Oktober 2026

Ditt navn:

Legens navn (som har foreskrevet Litfulo):

Tlf.nr. til legen:

Dato du startet med Litfulo:

Sikkerhetsinformasjon til pasienter om Litfulo:

- Dette kortet inneholder viktig sikkerhetsinformasjon du bør kjenne til – før og under behandling med Litfulo.
- Du finner mer informasjon i pakningsvedlegget som følger med hver pakning med Litfulo eller på www.felleskatalogen.no.
- Snakk med legen din eller apotek hvis noe av informasjonen er uklar.

Du bør alltid ha med deg dette kortet. Vis det til helsepersonell som er involvert i behandlingen din – for eksempel på apoteket eller til legen på legevakten.

Hva Litfulo er og hva det brukes mot

Litfulo inneholder virkestoffet ritlecitinib. Det brukes til å behandle alvorlig alopecia areata hos voksne og ungdommer på 12 år og eldre. Alopecia areata er en sykdom der kroppens eget immunforsvar angriper hårsekkene, noe som fører til betennelse og gir hårtap på hodet, i ansiktet og/eller på andre deler av kroppen.

Du bør kjenne til enkelte bivirkninger og annen informasjon som er angitt nedenfor.
Snakk med legen din hvis du får noen bivirkninger.

Risiko for infeksjoner

Snakk med lege eller apotek før og under behandling med Litfulo dersom:

- Du har en infeksjon eller ofte får infeksjoner. Snakk med legen din dersom du får symptomer som feber, sår, føler deg mer trøtt enn vanlig eller får tannproblemer. Dette kan være tegn på infeksjon.

- Du har eller har hatt tuberkulose eller har vært i nærkontakt med noen som har tuberkulose, eller bor eller reiser i områder der tuberkulose er svært vanlig. Legen din vil teste deg for tuberkulose før du starter med Litfulo, og kan også teste deg på nytt under behandlingen.
- Du har hatt en herpesinfeksjon (f.eks. vannkopper eller helvetesild), fordi Litfulo kan føre til at infeksjonen kommer tilbake. Snakk med legen din dersom du får et smertefullt hudutslett med blemmer. Dette kan være et tegn på helvetesild.

Vaksiner

- Snakk med lege eller apotek hvis du nylig har tatt eller planlegger å ta en vaksine, fordi enkelte levende vaksiner (for eksempel enkelte vaksiner mot influensa, poliomyelitt, rotavirus, vannkopper, gulfeber, denguevirus, samt vaksine mot meslinger, røde hunder og kusma (MMR-vaksine)) ikke anbefales umiddelbart før og mens du bruker Litfulo.

Risiko for hudkreft

- Ikke-melanom hudkreft har blitt observert hos pasienter som bruker Litfulo. Legen din kan anbefale at du tar regelmessige hudundersøkelser under behandling med Litfulo. Si fra til legen dersom du oppdager nye hudforandringer under eller etter behandling, eller hvis eksisterende forandringer endrer utseende.

Risiko for blodpropp

Snakk med lege eller apotek før og under behandling med Litfulo dersom du:

- Tidligere har hatt blodpropp i beina (dyp venetrombose) eller lungene (lungeemboli), eller har økt risiko for å utvikle dette (for eksempel: dersom du nylig har gjennomgått en større operasjon, bruker hormonelle prevensjonsmidler eller hormonbehandling, eller dersom det er påvist en koagulasjonsforstyrrelse hos deg eller nære slektninger).

Legen din vil diskutere med deg om behandling med Litfulo er egnet for deg. Kontakt lege dersom du plutselig opplever kortpustethet eller får pustevansker, brystsmerter eller smerter i øvre del av ryggen, hevelse i beinet eller armen, smerter eller ømhet i beinet, eller rødhet eller misfarging av beinet eller armen. Dette kan være tegn på blodpropp.

Risiko for hjertesykdom

Snakk med lege eller apotek før og under behandling dersom du:

- har eller har hatt hjerteproblemer

Oppsøk lege umiddelbart dersom du får sterke brystsmerter eller trykk i brystet (som kan stråle ut til armene, kjeven, nakken eller ryggen), kortpustethet, kaldsvette, svimmelhet eller plutselig ørhet, da dette kan være tegn på hjerteinfarkt.

Risiko for nevrologiske symptomer

Snakk med legen din eller apotek før og under behandlingen hvis du har uforklarlige symptomer som skyldes et problem med nervesystemet mens du tar Litfulo.

Prevensjon og graviditet

Litfulo SKAL IKKE brukes under graviditet. Det finnes ingen eller begrensede data om bruk av Litfulo hos gravide kvinner.

Dersom du er kvinne i fertil alder, skal du bruke sikker prevensjon under behandling med Litfulo og i minst én måned etter den siste Litfulo-dosen. Snakk med legen din om egnede prevensjonsmetoder.
Informer legen din umiddelbart dersom du blir gravid eller tror at du kan ha blitt gravid under behandlingen, da Litfulo kan skade barnets utvikling.

Pfizer AS
Postboks 3, 1324 Lysaker
Tlf.: 67 52 61 00 | www.pfizer.no

Versjon 4.0 - Oktober 2026