

## OM DIN BEHANDLING

Du har fått forskrevet Lixiana, et antikoagulasjonsmiddel, som fortynner blodet og bidrar til å forebygge at du får blodpropper. Det er viktig at du tar medisinen din nøyaktig slik legen din har fortalt deg.

- Dersom du har glemt en dose, ta den umiddelbart og fortsett påfølgende dag som vanlig – ikke ta det doble av foreskrevet dose på én dag.
- Start ikke å bruke andre legemidler (inkludert reseptfrie) uten å rådføre deg med legen din.

- Slutt ikke å ta Lixiana uten å rådføre deg med legen din da dette kan øke risikoen for å få en blodpropp.
- Les pakningsvedlegget som ligger i hver pakning med Lixiana.

## NÅR DU SKAL OPPSØKE LEGEHJELP

### BLØDNINGSRISIKO

Å bruke en antikoagulasjonsmedisin som Lixiana kan øke blødningsrisikoen din. Det er derfor viktig å være oppmerksom på mulige tegn og symptomer på blødning, og kontakte legen din **umiddelbart** dersom du får noe av følgende:

- Blåmerker eller blødning under huden
- Blod i urinen
- Opphosting av blod
- Oppkast av blod eller noe som ser ut som malt kaffe

- Neseblødning eller kutt som bruker lang tid på å stoppe å blø
- Tjærefarget avføring
- Svimmelhet eller plutselig hodepine
- Uforklarlig tretthet
- Unormal skjedeblødning, inkludert kraftigere eller forlenget menstruasjon

Rådfør deg med legen din dersom du opplever noen uvanlige symptomer.

## PASIENTKORT

**Lixiana®**

film-drasjerte tabletter

**edoksaban**

Ha alltid med deg dette kortet.

Vis det til helsepersonell, farmasøyt, lege eller tannlege, før medisinske behandlinger eller prosedyrer.

## PASIENTINFORMASJON

Pasientnavn:

.....

Fødselsdato: .....

I en akutt situasjon, vennligst kontakt:

Navn: .....

Telefonnummer:

.....

## BEHANDLINGSINFORMASJON

(Fylles ut av legen)

Lixiana har blitt foreskrevet i en

dose én gang daglig på: ..... mg

Startet den:        /        (mm/åå)

Blodtype: .....

Andre legemidler/tilstander:

.....

.....

.....

.....

## FORSKRIVNINGSPASJON

For mer informasjon eller i en akutt situasjon, vennligst kontakt:

Legens navn:

.....

Telefonnummer, stempel:

.....

Legens signatur:

.....

## INFORMASJON TIL HELSEPERSONELL

- Lixiana er en oral antikoagulant faktor Xa-hemmer.
- Ved behov for en invasiv prosedyre skal Lixiana seponeres minst 24 timer på forhånd, og det skal utvises nødvendig forsiktighet.
- Lixiana kan øke blødningsrisikoen. Seponer behandlingen umiddelbart ved klinisk signifikant blødning.

- Koagulasjonstester som INR, protrombintid (PT) og aktivert partiell tromboplastintid (aPTT), er ikke anvendelige mål for effekten av Lixiana. En kalibrert anti-faktor Xa-test kan imidlertid gi informasjon til kliniske beslutninger.

Se preparatomtale (PO) for mer informasjon.



**MSD**

Tlf. 32 20 73 00  
msd.no



**Daiichi-Sankyo**

Product under license of Daiichi Sankyo Europe GmbH  
Copyright © 2016 Daiichi Sankyo.  
CARD-1192901-0000 08/16