


Sørg for at du velger riktig MabThera[®] formulering og styrke

SUBKUTAN INJEKSJON

INTRAVENØS INFUSJON

**MabThera 1600 mg
KUN TIL BRUK VED KLL***



Blå "flip-off" hette

**MabThera 1400 mg
KUN TIL BRUK VED NHL***




Rosa "flip-off" hette

Trekkes opp direkte fra hetteglasset og administreres som subkutan injeksjon



**MabThera 100 mg konsentrat til infusjonsvæske
MabThera 500 mg konsentrat til infusjonsvæske
Til bruk ved alle godkjente indikasjoner for MabThera**



Fortynnes med 0,9 % natriumklorid eller 5 % glukose og administreres som intravenøs infusjon






Se etter disse spesifikke kjennetegnene på hetteglasset til MabThera s.c før bruk:
Merket med rød skrift: "**Kun til subkutan bruk**", "**injeksjonsvæske, oppløsning**" og "**subkutan**"

Roche Norge AS
Brynsengfarete 6B
0667 Oslo
Telefon: 22 78 90 00

KLL = kronisk lymfatisk leukemi, NHL = non-Hodgkins lymfom
* Vennligst se preparatomtalen for ytterligere informasjon eller kontakt Roche Norge.

Bruk den avtagbare klistre-etiketten for å sikre at korrekt formulering og styrke blir administrert pasienten, som illustrert nedenfor

MabThera 1600 mg oppløsning til subkutan injeksjon KUN TIL BRUK VED KLL





1. Etiketten på hetteglasset med MabThera 1600 mg har en avtagbar del

2. Løsne den avtagbare delen

3. Fest denne delen på sprøyten

MabThera 1400 mg oppløsning til subkutan injeksjon KUN TIL BRUK VED NHL



1. Etiketten på hetteglasset med MabThera 1400 mg har en avtagbar del

2. Løsne den avtagbare delen

3. Fest denne delen på sprøyten