

Varselskort for pasienter

VIKTIG INFORMASJON OM MITOKSANTRON OG RISIKO FOR HJERTEPROBLEMER OG BLODKREFT (AML) VED BEHANDLING AV MULTIPPEL SKLEROSE

Mitoksantron øker risikoen for hjerte problemer og blodkreft (AML).

Det er svært viktig at du er klar over hva som kan føre til økt risiko for hjerte problemer og blodkreft (AML), hvilke tegn og symptomer du bør se etter samt hva du bør gjøre.

I hvilke situasjoner er risikoen for hjerte problemer høyest?

Risikoen for å utvikle hjerte problemer er høyest dersom du

- tidligere har fått behandling med legemidler mot kreft, kalt antracykliner eller antracenedioner
- har fått strålebehandling i brystområdet
- har eksisterende hjertesykdom
- har brukt eller bruker legemidler som kan påvirke hjertet

I hvilke situasjoner er risikoen for blodkreft (AML) høyest?

Risikoen for å utvikle blodkreft (AML) er høyest dersom du

- tidligere har fått behandling med legemidler mot kreft, kalt antracykliner eller antracenedioner
- har fått strålebehandling i brystområdet

Oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart dersom du opplever noen av følgende symptomer:

Hjerte problemer:

- kortpustethet
- hovne ankler eller føtter
- plutselig vektøkning
- raske hjerteslag eller hjertebank

Blodkreft (AML):

- uvanlig tretthet og svakhet
- økt forekomst av infeksjoner
- blåmerker og blødninger oppstår lett
- feber
- skjelettsmerter
- pusteproblemer
- uforklarlig vekttap
- nattesvette

Husk å snakke med legen før du starter behandling med mitoksantron dersom du:

- har fått mitoksantron før

- har hjerteproblemer
- har leverproblemer
- har nyreproblemer
- har lavt antall blodceller
- har en infeksjon
- har fått strålebehandling i brystområdet
- har andre medisinske tilstander

Les pakningsvedlegget som følger med legemidlet eller gå inn på www.legemiddelverket.no for ytterligere informasjon.

Hvis du mistenker at du har en bivirkning knyttet til bruken av mitoksantron, kan du melde fra til helsepersonell eller via det nasjonale meldesystemet.