

Pasientmateriell

Påminnelseskort for pasienter (inkludert avtaleplan)

Påminnelseskort for pasienter

Legens navn:

Telefon:

Neotigason må ikke tas under graviditet.

Neotigason kan gi alvorlig skade hos fosteret hvis en gravid kvinne tar det.

Hvis du blir gravid eller tror du kan være gravid, må du umiddelbart slutte å ta Neotigason og ta kontakt med lege

Les pakningsvedlegget nøye før du starter med behandlingen.

Snakk med legen din eller en farmasøyt dersom du har noen spørsmål eller bekymringer i forhold til å ta Neotigason.

Hvis det er mulig at du kan bli gravid, må du gjøre følgende

- **Du må ikke bli gravid** mens du bruker Neotigason. Dette gjelder både under behandlingen og i 3 år etter avsluttet behandling.
- **Du må bruke minst én svært sikker prevensjonsmetode (som f.eks. spiral eller implantat), eller bruke to prevensjonsmetoder som virker på ulik måte (som f.eks. p-piller i tillegg til kondom) før, under og i 3 år etter avsluttet behandling.**
- **Du må møte opp hos legen for regelmessige oppfølgingskonsultasjoner og regelmessige graviditetstester:**
 - Før du starter behandlingen må du ta en graviditetstest som må være negativ.
 - Under behandlingen skal du testes regelmessig for graviditet, hver måned. Det skal også tas en siste graviditetstest 1-3 måneder i en periode på 3 år etter avsluttet behandling.

Påminnelse for menn og kvinner

Dette legemidlet har blitt forskrevet kun til deg. **Ikke del det med noen, og returner eventuelle ubrukte kapsler tilbake til apoteket.**

Avtaleplan for pasienten

Denne tabellen kan brukes til å føre oversikt over legeavtalene dine og resultatet av graviditetstester:

Legens navn:

Telefon:

Dato for avtalen	Benyttet prevensjonsmetode	Resultater av graviditetstest
		Positiv Negativ Dato:
		Positiv Negativ Dato:
		Positiv Negativ Dato:
		Positiv Negativ Dato:
		Positiv Negativ Dato:
		Positiv Negativ Dato:
		Positiv Negativ Dato: