

SJEKKLISTE FOR EGENADMINISTRERING AV NPLATE®

Bekreft at pasienten din er...

En voksen pasient	✓
Interessert i og egnet for hjemmeadministrering	✓
På en stabil dose av Nplate® <ul style="list-style-type: none">Med tanke på egenadministrering betyr en stabil dose av Nplate® at det ikke har vært behov for å justere pasientens Nplate®-dose på minst fire uker. Pasienter som trenger justering av dosen, kan ikke gå tilbake til egenadministrering før dosen er stabilisert – det vil si at det ikke har vært nødvendig å justere Nplate®-dosen på minst fire uker	✓
Villig til å gjennomføre en opplæringsperiode <ul style="list-style-type: none">Informer pasientene om at hjemmeadministrering vil medføre en periode med opplæring, og at de må vise at de er i stand til å egenadministrere	✓

Forsikre deg at pasienten returnerer hjem med...

Riktig dose skrevet og tegnet i egenadministreringsdagboken	✓
Rekonstitueringspakke(n) med Nplate® (Kontroller at de ikke ved en feil har tatt med seg demonstrasjonssettet med placebo)	✓
Alt pasientmateriell i opplæringspakken for hjemmeadministrering	✓
Kontaktopplysninger til helsepersonell (skal skrives bakerst i <i>egenadministreringsdagboken</i> , i avsnittet "I tilfelle du trenger hjelp ...")	✓
En dato da pasienten skal komme tilbake for kontroll etter de første fire ukene med egenadministrering. Ved denne kontrollen skal trombocyttdverdiene kontrolleres, og pasienten skal på nytt rekonstituere og administrere Nplate® under tilsyn. Kun pasienter som viser evne til å rekonstituere og egenadministrere Nplate®, skal få lov til å fortsette med å gjøre dette	✓

Hvis du har spørsmål vedrørende administrasjon av og bivirkninger forbundet med Nplate®, kan du se i preparatomtalen, som finnes på Felleskatalogens nettside på følgende lenke:

www.felleskatalogen.no

Alt sikkerhetsmateriale, også pasientmaterialet, er tilgjengelig på:

www.felleskatalogen.no