

# OPDIVO® (nivolumab)

Dette kortet inneholder viktig informasjon.

Ha alltid med deg dette kortet, og vis frem til alt helsepersonell at du behandles med OPDIVO® eller OPDIVO® i kombinasjon med YERVOY™

Det er viktig å gi beskjed til legen omgående hvis du har noen av følgende symptomer eller andre symptomer

**LUNGER<sup>1</sup>**  
pustevansker, hoste

**TARM OG MAGE<sup>1</sup>**  
diaré (vandig, løs eller bløt avføring), blod eller slim i avføringen, mørk avføring, smerte eller ømhet i magen eller mageregionen

**LEVER<sup>1</sup>**  
guldfarging av øyne eller huden (gulsott), smerter på høyre side av mageregionen, tretthet

**NYRER<sup>1</sup>**  
redusert mengde urin

**DIABETES/DIABETISK KETOACIDOSE<sup>1</sup>**  
overdreven tørste, økt appetitt med vekttap, tretthet, svakhet, døsighet, depresjon, irritabilitet, generell uvelhet, økt mengde urin

**HUD<sup>1</sup>**  
hudreaksjoner som hudutslett med eller uten kløe, blemmer i huden og/eller hudavskalling (kan være dødelig), sår, tørr hud, knuter i huden

**HORMONPRODUSERENDE KJERTLER<sup>1</sup>**  
hodepine, tåkesyn eller dobbeltsyn, utmattelse, tretthet, vektendring, endringer i oppførsel (f.eks. redusert seksualdrift, irritabilitet eller glemsomhet)

**HJERTET<sup>1</sup>**  
brystsmerter, uregelmessig hjerterytme, hjertebank

**MUSKLER<sup>1</sup>**  
muskelsmerter, stivhet, svakhet, forvirring, redusert mengde urin, mørk urin alvorlig utmattelse

**ANDRE<sup>1</sup>**  
smerter eller rødhet i øye, tåkesyn eller andre synsproblemer; smerter i øvre del av magen, nedsatt appetitt, kvalme eller oppkast; fordøyelsesbesvær eller halsbrann; prikking eller nummenhet i armer og bein eller vanskeligheter med å gå, feber, hovne lymfeknuter; tegn og symptomer på betennelse i hjernen, som kan inkludere hodepine, feber, kramper, stiv nakke, tretthet, forvirring, svakhet eller døsighet

Ytterligere informasjon finnes i pakningsvedlegget for OPDIVO® på [www.felleskatalogen.no](http://www.felleskatalogen.no), [www.ema.europa.eu](http://www.ema.europa.eu) eller ring Bristol-Myers Squibb Medisinsk Informasjon på 23 12 06 37

## VIKTIG

- Tidlig håndtering av bivirkninger av legen din reduserer sannsynligheten for at behandlingen med OPDIVO® eller OPDIVO® i kombinasjon med YERVOY™ (ipilimumab) må stoppes midlertidig eller permanent.
- Lette symptomer kan raskt forverres hvis de ikke behandles.<sup>1</sup>
- Du skal ikke forsøke å behandle disse symptomene på egenhånd.
- Rapportert umiddelbart nevnte eller andre symptomer til legen din.
- Tegn og symptomer kan være forsinket og oppstå uker eller måneder etter din siste injeksjon.<sup>1</sup>
- Ha alltid med deg dette pasientkortet, vis det frem til enhver helsepersonell du oppsøker, og fortell at du behandles med OPDIVO® eller OPDIVO® i kombinasjon med YERVOY™.

## FØR OPPSTART MED OPDIVO® GI BESKJED TIL LEGEN DIN HVIS DU:

- Vet at du er allergisk mot OPDIVO® eller andre legemidler eller hjelpestoffer.
- har en autoimmun sykdom.
- har melanom i øyet.
- tidligere har opplevd bivirkninger med et annet legemiddel, som for eksempel YERVOY™.
- har blitt fortalt at kreften har spredt seg til hjernen din.
- har brukt legemidler som nedsetter immunsystemet.
- har gjennomgått en transplantasjon (OPDIVO® kan forårsake avstøtning av transplanterte organer t. ex. nyre, lever, hjerte, hornhinnen eller hud).
- har gjennomgått en beinmarg- eller stamcelletransplantasjon fra en annen person (allogen)
- har hatt en betennelse i lungene.
- er gravid eller planlegger å bli gravid, eller ammer.
- bruker eller har brukt andre legemidler.
- er på en saltfattig diett.

## Kontaktinformasjon til min lege

NAVN PÅ LEGE

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

TELEFONNUMMER I ARBEIDSTIDEN

.....  
.....  
.....

TELEFONNUMMER UTENFOR ARBEIDSTIDEN

.....  
.....  
.....

## Min kontaktinformasjon til min lege

MITT NAVN OG TELEFONNUMMER

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

VED NØDSTILFELLE, VENNLIGST KONTAKT

.....  
.....  
.....  
.....  
.....



## VIKTIG INFORMASJON TIL HELSEPERSONELL

- Denne pasienten er under behandling med **OPDIVO®** eller **OPDIVO®** i kombinasjon med **YERVOY™**
- Immunrelaterte bivirkninger kan oppstå når som helst under behandlingen, eller måneder etter avsluttet behandling
- Tidlig diagnose og egnet håndtering er avgjørende for

å minimere livstruende komplikasjoner. Spesifikke retningslinjer for håndtering av immunrelaterte bivirkninger med **OPDIVO®** er tilgjengelig.

- Konsultasjon med en onkolog eller annen medisinsk spesialist kan være til hjelp ved organ-spesifikk immunrelatert bivirkning.

1. OPDIVO® pakningsvedlegg

Helsepersonell, se godkjent preparatomtale for **OPDIVO®** på [www.legemiddelverket.no](http://www.legemiddelverket.no) eller kontakt Bristol-Myers Squibb Medisinsk informasjon på 23 12 06 37 for ytterligere informasjon.

© 2018 Bristol-Myers Squibb Company. All rights reserved.  
NOV 2018 1506N 018NP03304