

Pasientkort

Side 1 (front)

For behandling av pulmonal arteriell hypertensjon

Dette kortet inneholder viktig sikkerhetsinformasjon som du må kjenne til når du behandles med Opsumit. Ha alltid dette kortet med deg, og vis det til alle leger som er involvert i din behandling.

Opsumit 10 mg
macitentan
filmdrasjerte tabletter

NO

Side 2

Det er viktig at du umiddelbart rapporterer til forskrivende lege graviditet eller eventuelle bivirkninger som kan forekomme under behandling med Opsumit.

Behandlingssenter: _____

Forskrivende leges navn: _____

Forskrivende leges telefonnummer: _____

Side 3 (innside, venstre)

Graviditet

Opsumit kan skade et foster under utvikling. Du skal derfor ikke ta Opsumit dersom du er gravid, og du må heller ikke bli gravid mens du tar Opsumit. Dersom du lider av pulmonal arteriell hypertensjon, kan dessuten graviditet gjøre sykdomssymptomene mye verre.

Prevensjon

Du må bruke en sikker form for prevensjon mens du tar Opsumit. Ta opp alle spørsmål du måtte ha, med legen din.

Side 4 (innside, midten)

Du må ta en graviditetstest før behandlingen med Opsumit igangsettes og månedlig under behandlingen, også om du tror du ikke er gravid.

I likhet med andre legemidler fra denne klassen, kan Opsumit forårsake anemi (reduert antall røde blodceller) og påvirke leveren. Legen din vil ta en blodprøve før du starter behandlingen med Opsumit og under behandlingen for å undersøke:

- om du har anemi (reduert antall røde blodceller)
- om leveren din fungerer skikkelig

Side 5 (innside, høyre)

Tegn på at leveren din ikke fungerer skikkelig, omfatter:

- kvalme
- oppkast
- feber
- smerter i magen (buken)
- gulsott (guldfarging av huden eller det hvite i øynene)
- mørk urin
- kløe i huden
- uvanlig tretthet eller utmattelse
- influensalignende syndrom (ledd- og muskelsmerter med feber)

Informér legen din umiddelbart dersom du oppdager noen av disse tegnene.

Side 6 (bakside)

Anbefalt dose av Opsumit er én 10 mg tablett én gang daglig. Svelg tablettene hel med et glass vann. Ikke tygg eller del tablettene. Du kan ta Opsumit med eller uten mat.

Dersom du glemmer å ta Opsumit, skal du ta en dose så snart du kommer på det og fortsette å ta tablettene til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.

Les pakningsvedlegget grundig for mer informasjon om Opsumit. Kontakt lege eller apotek dersom du har spørsmål om behandlingen.

©2013 Actelion Pharmaceuticals Ltd
Opsumit er et registrert varemerke tilhørende Actelion Pharmaceuticals Ltd